

欽定四庫全書

子部

儒門事親卷十二



南京中医药大学图书馆版权所有

儒門事親

卷之四

金 張從正 撰

淨碾破以蒂卷定連紙
紙用麤羅子羅過另放
盧去苗及心加減用之
或一兩或半兩或一

右各為麤末每服約半兩以蘤汁三茶盞先用二盞煎三五沸去蘤汁次入一盞煎至三沸却將原二盞同一處熬二沸去滓澄清放溫徐徐服之不必盡劑以吐為度

芡蒂散

芡蒂

七十
五箇

赤小豆

七十
五箇

人參

半兩
去蘤

甘草

半兩或二
錢五分

右為細末每服一錢或半錢或二錢量虛實加減用

之空心薤汁調下服之

稀涎散

猪牙皂角

不蛀者去支弦
秤一兩炙用之

碌礬

藜蘆

半兩

右為細末每服半錢或一二錢幹開牙關漿水調下
灌之

蔚金散

蔚金

滑石

川芎

各半兩

右為細末每服一二錢量虛實加減以薤汁調下空

心服之

茶調散

亦一名

二仙散

芡蒂不以多少好茶中停

右為細末每服二錢薑汁調下空心用之

獨聖散

芡蒂不以多少

右為細末每服一錢或二錢薑汁調下服之脇痛加

全蝎頭痛加蔚金

碧雲散 治小兒驚風有涎

膽礬

兩半

銅青

分一

粉霜

錢一

輕粉

分一

右研為細末每服一字薄荷湯調下用之如中風用漿水調服

常山散

常山

兩二

甘草

兩二半

右為細末水煎服之空心

青黛散

猪牙皂角乙箇

玄胡索乙箇

青黛少許

右為細末鼻內灌之其涎自出

汗劑

防風通聖散

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 薄荷

麻黃去根不去節

連翹

芒硝已上各半兩

石膏

黃芩 桔梗已上各二兩

滑石三錢 甘草二兩 荆芥

白朮 山梔子已上各乙兩

右為麤末每服五七錢水一大盞生薑三片煎至七分去滓熱服如涎嗽加半夏五錢生薑製過

雙解散

通聖散與益元散相合中停水一鍾生薑豈豉葱

白同煎

浮萍散 治癩風

浮萍

乙兩

荆芥

川芎

甘草

麻黃

去根

已上各一兩或加當歸芍藥

右為麤末每服一兩水二盞煎至七分去滓溫服汗出則愈

升麻湯

升麻去土

葛根

芍藥

甘草炒已上各一兩

右為麤末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服

不計時候

麻黃湯

麻黃乙兩去根

官桂七錢

甘草三錢干炙

杏仁二十箇去皮

尖麩炒
黃色用

右為麤末每服三錢水一中盞煎至七分去滓溫服
汗出自解

桂枝湯

桂枝 乙兩

茯苓 半兩

芍藥 乙兩

甘草 七錢

右為麤末每服三錢水一盞生薑棗一同煎去滓溫服

下劑

導水丸

大黃

二兩

黃芩

二兩

滑石

四兩

黑牽牛

四兩另取頭末用

加甘遂一兩去濕熱腰痛泄水濕腫滿久病則

加

加白芥子一兩去遍身走注疼痛

加朴硝一兩退熱散腫毒止痛久毒宜加

加郁李仁一兩散結滯通關節潤腸胃行滯氣

通血脈

樟柳根一兩去腰腿沉重

右為細末滴水丸梧桐子大每服五十丸或加至百丸臨卧溫水下

禹功散

黑牽牛頭末

四兩

茴香

乙兩炒

或加木香

乙兩

右為細末以生薑自然汁調一二錢臨卧服

通經散

陳皮

去白

當歸

各乙兩

甘遂

以麪包不令透水煮百餘翻取出用冷水

浸過去
麵培乾

右為細末每服三錢溫湯調下臨卧服

神祐丸

甘遂
依前製用

大戟
培浸煮醋乾用

芫花
醋浸煮各半兩

黑牽牛
乙兩

大黃
乙兩

右為細末滴水丸小荳大每服五七十九臨卧溫水

下

琥珀丸

右為前神祐丸加琥珀一兩是也

益胃散

甘遂

依前製過用

右為細末每服三錢以獾猪腰子細批破以鹽椒等物淹透爛切摻藥在內以荷葉裏燒熟溫淡酒調服

大承氣湯

大黃

半兩

厚朴

乙兩

枳實

一枚
麤炒

芒硝

半兩

右為麤末每服三五錢水一盞煎至七分去滓服以

意加減

小承氣湯

大黃 厚朴已上各乙兩 枳實_{乙枚}

右為麤末同煎服

調胃承氣湯

大黃 甘草_炙 朴硝已上各半兩

右為麤末每服五七錢水一盞煎三五沸去滓溫服

食後

桃仁承氣湯

桃仁

去皮尖乙
十二個

官桂

甘草

芒硝

已上各半兩

右剉如麻豈大每服三五錢水一大盞煎至七分去滓溫服

玉井散

芫荽根

二兩

甘遂

乙兩製用

右為細末以麝香湯調下三錢臨卧服

水煮桃紅丸

黑牽牛頭末

半兩

苾芢末

二錢

雄黃

乙錢水飛過用之

乾胭脂

少許

右以黃水調麵為丸以水煮令浮熟取出冷水拔過

射香湯下

無憂散

黃蓍

木通

桑白皮

陳皮已上各乙兩

胡椒

白朮

木香

各半兩

牽牛頭末

四兩