

欽定四庫全書

子部

蘭臺軌範卷六



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院院使臣張榮基

洗馬臣王坦修覆勘

欽定四庫全書

蘭臺軌範

欽定四庫全書

素素

欽定四庫全書

蘭臺軌範

吳江徐大椿撰

夫百病之始生也皆
不節則傷臟風雨則傷
異類願聞其會岐伯曰

欽定四庫全書

蘭臺軌範

三部之氣各不同或起於陰或起於陽請言其方喜怒
不節則傷臟臟傷則病起於陰也清濕襲虛則病起於
下風雨襲虛則病起於上是謂三部至於其淫泆不可
勝數 黃帝曰積之始生至其已成奈何岐伯曰積之
始生得寒乃生四字乃成積之總訣厥乃成積也黃帝曰其成積
奈何岐伯曰厥氣生足惋惋生脛寒脛寒則血氣凝滯
血氣凝滯則寒氣上入於腸胃入於腸胃則腹脹腹脹
則腸外之汁沫迫聚不得散日以成積卒然多飲食則

腸滿起居不節用力過度則絡脈傷陽絡傷則血外溢

血外溢則衄血陰絡傷則血內溢血乃溢則後血

衄為陽經

之血宜涼後血為陰經之血宜溫

腸胃之絡傷則血溢於腸外腸外有

寒汁沫與血相搏則并合凝聚不得散而積成矣

凡積未有

不因血而成者

卒然外中於寒若內傷於憂怒則氣上逆氣上

逆則六輸不通溫氣不行凝血蘊裏而不散津液瀦滲

著而不去而積皆成矣六元正紀大論大積大聚不

可犯也衰其大半而止過則死骨空論任脈為病男

子內結七疝女子帶下瘕聚

息積 素奇病論帝曰病脇下滿氣逆二三歲不已是

為何病岐伯曰病名曰息積此不妨於食不可灸刺積

為導引服藥藥不能獨治也

積最宜
外治

伏梁 靈邪氣臟腑病形篇心脈微緩為伏梁在心下

上下行時唾血 素腹中論帝曰人有身體髀股脣皆

腫環臍而痛是為何病岐伯曰病名伏梁此風根也其

氣溢於大腸而著於育育之原在臍下故環臍而痛也

不可動之動之為水溺瀦之病

難經

病有積有聚何以別之然積者陰氣也聚者陽氣也故
陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰
聚故積者五臟所生聚者六腑所成也積者陰氣也其
始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所
窮處聚者陽氣也其始發無根本上下無所留止其痛
無常處故以是別知積聚也 五臟之積各有名乎以

何月何日得之然肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯
有頭足心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下脾
之積名曰痞氣在胃脘腹大如盤肺之積名曰息賁在
右脇下覆大如杯腎之積名曰賁豚發於少腹上至心
下若豚狀或上或下無時

金匱

師曰病有奔豚有吐膿有驚怖有火邪此四部病皆從
驚發得之師曰奔豚病從少腹起上衝咽喉發作欲死

復還止皆從驚恐得之 夫瘦人繞臍痛必有風冷穀
氣不行而反下之其氣必衝不衝心下則痞 問曰病
有積有聚有滯氣何謂也師曰積者臟病也終不移聚
者腑病也發作有時展轉痛移為可治滯氣者脇下痛
按之則愈復發為滯氣積聚皆有形滯氣則無形而有氣耳病者腹滿按
之不痛為虛痛者為實可下之古黃未下者下之黃自
去 腹滿時減復如故此為寒當與溫藥 脈緊如轉
索無常者有宿食也 薤不可共牛肉作羹食之成瘕

病非亦然 醋合酪食之令人血瘕

病源

瘕瘕 皆由寒溫不調飲食不化與臟氣相搏結所生也其病不動者直名為瘕若病雖有結瘕而可推移者名為瘕瘕瘕者假也謂虛假可動也

鼈瘕 謂腹內有瘕結如鼈之形狀有食鼈觸冷不消生瘕者有食諸雜物得冷不消變化而作者

蟲瘕 人有多蟲而性好嚙之所嚙既多腑臟虛弱不

能消之變化生癥患者見蟲必嚙之不能禁止時從下部出亦能斃人

米癥 人有好啞米轉久彌嗜啞之若不得米則胸中清水出米不消化遂生癥結其人常思米不能飲食久則斃

腹內有人聲 有人腹內忽有人聲或學人語而相答此乃不幸致生災變非關經絡臟腑冷熱虛實所為也

服雷丸
可愈

髮癥 有人因飲食內悞有頭髮隨食成癥胸喉間如有虫上下來去者是也

蛟龍病 三月八日蛟龍子生在芹菜上人食芹菜入腹變成蛟龍其病之狀發則如癰

魚癥 有人胃氣虛弱者食生魚因為冷氣所搏不能消之結成魚癥揣之有形狀如魚也

蛇癥 人有食蛇不消因腹内生蛇癥也亦有蛇之精液誤入飲食內食之其狀常若饑而食則不下喉食至

胸內即吐出其病在腹摸揣亦有蛇狀謂蛇瘕也

酒瘕 人有飲酒多而食穀少積久漸瘦遂常思酒不得則吐多睡不復能食是胃中有虫使之然名為酒瘕也

腹內有毛 人因飲食內誤有毛隨食入腹則漸漸羸瘦但此病不說別有證狀常自言因食毛以知之

積聚瘕痞方

奔豚湯

金匱

奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱此主之

甘草

川芎

當歸各二兩半夏四兩黃芩二兩

生葛

五兩

芍藥

二兩

生薑

四兩

甘李根白皮

一升

右九味以水二斗煮取五升溫服一升日三夜一服

茯苓桂枝甘草大棗湯

金匱

發汗後臍下悸者欲作賁

豚此湯主之

桂枝

四兩

茯苓

半斤

甘草

二兩

大棗

十五枚

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮

取三升去渣溫服一升日三服

桂枝加桂湯

金匱

發汗後燒針令其汗針處被寒核起

而赤者必發背

小腹上至心灸其核上各一

壯與此湯

此灸法不循
穴道亦甚易

即桂枝湯加桂二兩

備急丸

金匱

治寒氣冷食稽留胃中心腹滿痛大便不

通

大黃

乾薑

各二兩

巴豆

一兩去皮
研如脂

右先搗大黃乾薑為末內巴豆合搗千杵和蜜丸如

豆大藏蜜器中勿洩氣候用每服三四丸煖水或酒

下

又主中惡心腹脹滿卒痛如錐刺氣急口噤如卒死者捧頭起灌令下咽須臾當差不差更與三丸當腹中鳴即吐利便差若口噤者須化從鼻孔用葦管吹

入自下於咽

此溫下之法 口噤不能服藥者亦是一法

貪食食多不消心腹堅滿痛治之方

千金

鹽一升水三升

右二味煮令鹽消分三服當吐出食便差

蛟龍病方

金匱

治春秋二時龍精帶入芥菜中人偶食

之為病發時手背腹滿痛不可忍

硬糖

二三升

日兩度服之吐出如蜥蜴三五枚差

療犬肉傷

金匱

治食犬肉不消心下堅或腹脹口乾大

渴心急發熱妄語如狂或洞下

杏仁

一升合皮熱研用

沸湯三升和汁分三服痢下肉片大

驗