

脾胃科进修班讲义

(共16年)

祖国正骨学

中医外科学)

叶氏正骨学)

苏氏正骨学)

<1>

外生病症的致病原因分内因、外因三种。

内因：为六欲七情所伤。

六欲：耳听淫声，眼观邪色，鼻闻过臭，舌贪滋味，心思过劳，意念妄生。

七情：喜怒忧思悲恐惊。

(二) 外因：由于风寒暑湿燥火六淫所伤。

(三) 不内外因：由于饮食不节，起居不慎，过饮醇酒，则生火，消烧阴液，过饮茶水，则生湿停饮，过食五辛，则损气血，伤肌失饱，则伤脾胃，凡此皆饮食之致病也。

昼日过劳，挑经负重，跌扑碰撞等，皆能损其身形，夜不静息，强力入房，亦伤精气，凡此皆起居之致病也。

起于膏粱厚味者，多令人荣卫不化，火毒内结。

起于藜藿薄食者，多令人胃气不充，气血亏少，以上皆属于不内外因也。

人之身体分为血脉肉筋骨。

1. 如红肿高大，患于血脉之间者名痛属阳。
2. 色白漫肿，发于筋骨之间者名疽，属阴。
3. 浅一点患于皮里肉外者名叫痈毒。
4. 再浅点仅发于皮肤之上的，名叫疮疖。
5. 疔疮都是生在指、趾、头舌肌肉结实、皮肤较厚之处，颜色分为红黄紫白黑，形小而根深，如钉钉之状，所以叫做疔。
6. 根盘特别大的，穿孔多至数十或数百者，叫做疔，也就

是病的最大者，如脑发或背发等。

7. 巖症与石疽，虽症状相似，但性质大不相同：岩症很少治好，石疽，虽难治，还可以治疗。

8. 瘰疬生于头部，连到颈部、颌骨、腋窝等处，小的叫瘰，大的叫疔，长的叫马刀扶壁，未破的也叫做疔子颈，已破的为鼠串疮。

9. 生在臂部的，名腐臂疽，俗称吐串，皮肉内腐化，肉质变坏成乾酪状，破溃之后，则腐水如浆。

10. 漫肿无头，皮色不变走窜无定，此处开刀别处复起的，叫做流注。

外科病依症的颜色、肿势、深浅一般分为阳症和阴症两大类。

凡痈疽阳盛的，初起红肿色赤疼痛，则易溃易敛，顺而易治，为阳症。

阴盛者，初起色黯不红，塌陷不肿，木硬不疼，则难溃难敛，逆而难治，是为阴症。

半阴半阳者，漫肿无头不高，微痛不甚，微微不热，色不甚红，此症属险，若能随症施不失其宜，则转险为顺，否则逆矣。

五善者：五善之症也，诸疮见之为顺，则易治。

七恶者：七恶之症也，诸疮见之为逆，则难治。凡患痈疽者，五善为顺，七恶为逆，见三善者生，见四恶者死。临症之时，须详察色脉，法：温凉补汗攻，更要辨别寒热阴阳虚实寒热。

根据外科金生集上说：外症的阴阳虚实，须认定红白二色，红的是痈，白的是疽，红痈是阳实之症，因气血热而毒滞，白疽是阴虚之症，因气虚而毒凝。

又说：“疔的根盘，大喻经过寸者，而色红高肿的叫做肿，病起发于寸寸的，若大仅数分的，叫做小疔，如根盘散漫平塌印陷的，俾叫做疽。疽发于五脏。

阳 疔

阳疔初起焮赤疼痛，根束盘消高肿，七日或痛时或止，十四次疮内逐渐生肌，瘡随肌减精神爽，偶脱新生气血充，嫩肉如红，颜色鲜润似榴红，此疔七恶无犯，五善俱备，是为纯阳之疔。

阴 疔

阴疔初起如鼠屎之疙瘩，不红不肿，僵硬不痛，不欲热，疮根散漫色暗平塌，此属纯阴之疔，故不溃腐，空仓无肌，疮下生长如甲叶不脱，孔子结子，如花舍子，紫黑肌清臭秽，若见七恶等症，俱为难治之疔。

辨 善 恶

一种疾病的发生与发展，有顺有逆，表现在局部和全身，五善七恶，包括了局部症状，和全身症状，是历代医家在诊断方面的经验积累，大抵五善见三为吉，七恶见四为危。

五 善

1. 心善：精神爽快，言语意识清楚，舌苔光润，不烦不燥，睡眠安静。
2. 肝善：身体轻便，指甲红润，二便正常。
3. 脾善：饮食知味，口唇滋润，肤色黄润，无秽臭气。
4. 肺善：不咳不喘，无痰，呼吸均匀，语言响亮，皮肤光泽。
5. 肾善：午后不热，口齿不干，小便清且白，夜卧安静。

七 恶

1. 恶：神昏，烦躁，舌燥，疮色紫黑，言语呢喃。

2. 恶：身筋强硬，动转不灵活，目不能正视，疮流血水，惊悸伤肝。

3. 恶：形体消瘦，轮廓削陷，根盘坚硬，上清臭秽，之食脾败难医。

4. 恶：皮肤枯槁，痰多气喘，鼻孔塌动，肺绝必归。

5. 恶：亡渴时引饮，咽喉似燎烟，肾之形容惨黑，本缩死之原。

6. 恶：凸凹四肢浮肘，肠鸣呕逆痰，火腰滑泻，脏腑已败。

7. 恶：疮形倒陷，如刺鳗鱼一般，时流脓水，四肢厥逆寒。

外科症状按其病程可分为两阶段，由初发现作肿至未溃破前，称为肿疡期；从破以后至发口以前时，叫溃瘍期，在这前后两个阶段中，其主要的症状：为肿、痛、脓、痒。

(一) 辨肿

1. 虚肿：漫肿。

2. 实肿：高肿。

3. 空肿：木硬，色紫黯青。

4. 火肿：色红，皮光，焮热僵硬。

5. 湿肿：皮肉壅隆，深则按之如烂绵，浅则起亮水泡，破流黄水。

6. 风肿：皮肤拘紧不红，其势宣浮，微热微痛。

7. 痰肿：软如棉，硬如馒，不红不热。

8. 郁结伤肝作肿，不红不热，坚硬正右棱，状如岩凸。

9. 气肿：以手按之，皮紧而内软，迁喜则消，迁怒则长，无红无热，皮色如常。

10. 跌扑瘀血作肿：暴肿火热，肿肿不热。

11. 产后，闷挫瘀血作肿：瘀血久滞于经络，忽发则不硬不热微红，若已成脓将溃，其色必紫。

辨痛

痛由不通，有种种不一。有轻痛、重痛、虚痛、实痛、寒痛、热痛、脉痛、瘀血凝结作痛、心口痛、气痛等。

1. 轻痛：肌肉皮肤作痛属此。
2. 重痛：痛澈筋骨属深。
3. 虚痛：覆被则甚，不欲见人，喜人揉按，暂时可安。
4. 实痛：食饱则甚，以眠反增，累人揉按，痛不可言。
5. 寒痛：痛处定而不移，色不变，过暖则喜。
6. 热痛：面色焮赤，过冷则甚。
7. 脉痛：脉弦且数，形势鼓长，按之而反起。
8. 瘀血凝结作痛：初起急而作痛，微热微胀，将溃则色紫微痛，既溃则不痛。
9. 风痛：走注甚速。
10. 气痛：流注不定，如痛唯起。

辨脉

痛而未成，宜内消之法，且已形成，即用内托之法。因此辨脉之有无与浅深。

按之坚硬者，无成之象。

按之小者，无成，热者有脓。

按之大软者，内脉已熟。

按之半软半硬者，尚未全成。

按之指空而硬者，尚早，不硬者反迟，其气血必虚。

深按之而空虚者，内是稀黄水。

深按之而凝涩者，内是坏肉。

按之实而有痛者，内必是血。

按之虚而不痛者，内必是气。

按之即痛者，其脉浅。

重按方痛者，其脉深。

薄皮刺起者，其脉深。

皮色不变，不高，其脉必沉。

痛疮云脉，先宜云：白稠脉，次示桃红脉，再示淡黄水。

胖人宜于脉多，瘦人宜少，平人宜中，是肉不腐，瘦人宜少，是肉收坏，皆非吉也。

气实者，多稠黄脉。

气虚者，多稀白脉。

半虚半实者，多稠白脉。

脉如粉液，污水谓之败浆，为不足之症。

汗后脉弱者可行。

脉示石牙热不退者三服。

辨 疥

痒属风，才各有因，风肿痒，皮肤作痒者，为风然在清，皮若作痒者，轻则为汗，甚则由痒口冒风，故突起疥疮，形如小虫，抓破之后，津水者是脾湿，津血者是脾燥，若将疥作痒者，缘初起时肌肉结滞，气窄未及至将敛气血渐充，则养新肉故痒也，然必痒若虫行方称疥疾，他如疥癬作痒，皆属风浮，勿视为一类也。

内消法：

“汗之则疮已”所以内消法，有表证的，用表散如荆防妙毒散，醒消丸等皆是汗法的内消法。惟脉证候实者斯可用之，若症俱虚，便宜兼补，发渴便秘，须息疏行，不可概就表散一剂，痛疽皆因气血凝结，火毒太盛所致，故以凉然解毒，苦寒药为要，更宜详看部位，属何经络即用引经药，以治之。以中痛自消，凡肉自平矣。

内托法：

凡痛疽肿势已成，不能突起，亦难溃入，或坚肿不赤而疼，或不疼，脉少清稀，口不合，皆气血虚也，宜补其气血，调和营卫为主，祛毒为佐，加以辛香之药，行其郁滞加以温热，祛其风寒，气血充足，新肉自然会生长。如托裡排脓汤，托裡消毒散，神功内托散，十全大补汤等。全是补法温法的内托方法。这些方法，可以保证毒不内陷。

疔按痛，壅也，凡饮食厚味醇酒火燥之毒过壅在胃，则血络受热而发为疔。故其症属阳，其病属肌。其肿高，其色赤，其痛甚，其皮薄而泽，其脉已死，疮口易收，其来速，而愈亦速。按此症是急性的疔疮，颇有世无烂久之疔的说法。

疽：中医外科所说的疽，疽者，阻也，气血为毒所阻滞不行，其发较缓，难溃难敛；主因为忧思郁结而起，如精神遭受挫折，或不加意声郁结在内，易发此症。

按古人所称为疽，虽以阴症佔多数，亦非全属不红不肿的慢性症，例如：胸疽、疽发背，一般亦列为阳症。实际它的性质，仍是属于急性症。但是治法无论患生何部，都必须分顺逆。按它的性质属于那一种的类型而施治。

1. 顺症

初起如粟粒白泡，嫩红而硬，疮头收束，疼痛不大，微有寒热，至八九天，疮头渐有脓液，至半月，腐肉脱落，流出黄白色稠厚的脓，四周肿势渐消，疼痛即止，寒热已退，口不渴，心不烦，饮食知味，二便调和，在眠安睡如常，此为顺症，容易治疗而无危险。

2. 逆症

初起先发红痒，不知疼痛，痒甚，已而患部沉重，米老白头，肉肿胀不肿，坚硬慢慢由浅红色而深红，由深红变成紫黑色，形如筛状，大块组织形成坏死，此症最不可畏。古人云

外大如豆，内大如拳，外大如拳，内大如盘，言其外小而内实大也。溃破而无脓，腐肉坚硬不脱，触之惟见鲜血，患者日夜呼号，说疼痛不可忍，但一碰着患处并不知痛，身热夜剧，头目四肢浮肿，大便闭结，小便短赤，或淫利无度遗尿直视，神露神短，舌干烦躁，食不知味，甚则耳聋，神昏谵语，此为难治之症，危险之极，虽称之为疽，但是按它的性质仍是属于急性症的一种。

治法：

1. 初起未溃，在肿块时期用内消法。

(一)内服药：仙方活命饮，神效卫生汤。有裡症时服，内疏黄连汤，疔疮丸（卢成球传）

有寒症服荆防败毒散，醒消丸，败毒汤，蟾酥丸，六四妙汤等。

(二)外敷药，抑阳散。

2. 种疡期已过，尚未破者，用收托法。

(一)内服药：托里消毒散，托里透肌汤，托里散，代力散。

(二)外用药：用强性腐蚀性剂开口排脓（但是不可用的过早给患者增加痛苦）万应灵丹，白降丹，降丹白灵药。

3. 已破者，内服药：

(一)内服药 托里排脓汤，四君子汤，四物汤，珍汤，十全大补汤，补中益气汤，八味地黄丸。

(二)腐肉不脱，新肉生迟内服药，三才灵药，红升丹，五色灵药。

(三)腐肉脱净生肌药，及外敷药：

如生肌散，生肌玉红膏等。

处方：

仙方活命饮：

运应症，治一切痛疽，赤肿焮痛，初起消肿，已成即溃功

效：散瘀、消肿、化脓、生肌。

皂刺三个 炙山甲三个 大贝母三个 白芷小半 防风小半
生甘草节一个 归尾三个 乳没各小半 天花粉三个 银花三个
陈皮一个 赤芍药五分 右十三位好酒煎服，恣饮尽醉。此方
随症增减，初起不高肿，根盘平塌，散漫不收，过候不送，肌
稀不腐，是正气内亏，不能做毒外泄，而逆内陷险象，宜用内
托法下上方中叠加黄芪五小，如疔疮，加紫河车草三个，毒在
内加大黄下之。该方中之花粉，最好改为枯萎、银花连藤叶用
均须重用，以助药力。

杂论：一切的疮痍、痛疽无非由于经络中血结痰滞、热毒
蕴蒸而成，方中以山甲攻坚，皂刺达毒所，白芷、防风、陈皮
通经理气，所疏其邪，乳香止痛和血没药破血散结，赤芍归尾
以驱血热破之，以破其结，佐以贝母金银花甘草，一以豁痰
解郁，一以解毒和血，其为坚溃止痛，故能于肿而未入者可散，
肿而有入者可消，已溃者可敛，实为疮痍之圣药，外科之首方，
但兼卫强而中气不足者，可用，若脾胃素弱，荣卫不调者，则
用托裡消毒散之法。

2. 托裡消毒散

治痛疽疔毒、疔毒，对一切恶疮诸症，功效 宣热散风，
行瘀活血，消肿解毒，疏通脏腑，乃表裡两实之剂，功效甚速。
皂刺一小 山甲炒六分 羌活六分 防风 白芷各六分 当归
尾 银花各一个 连翘六分 天花粉一小 乳香五分 沉香六分
石决明六分 甘草节一个 红花六分 大黄二小 酒拌炒，右十
五味水二碗煎八分病在上部先饮酒一杯后服药。病在下部先服
药后饮酒一杯以行药力，如气虚便利者，则不用大黄。

3. 内疎黄连湯

治痛疽疔毒在裡，火熱收狂多熱，二便秘澀，煩燥不寐，舌干口渴，飲冷等症，六脈沉數有力者，以除裡熱。

处方：

山梔子一升 連召一升 薄荷二升 甘草五分 黃芩一升 或透一升 桔梗一升 大黃二升 當歸一升 白芍炒一升 木香一升 檳榔一升 右水二茶盅煎八分食前服加蜜二匙亦可。

4. 荆防敗毒散

治風熱相搏邪氣在表，發生瘡瘍，寒熱作痛。功效：祛風散熱，清血解毒。

处方：

羌活、獨活、柴胡、桔梗、川芎、枳殼(白炒)茯苓各一升 人參、甘草各五分 荆芥、防風各一升 薑三片 水二煎藥八分，食遠服寒甚加蔥三枚。

5. 敗毒湯

治紅腫成痛，初起立消。

當歸身、銀花、連召、赤芍、黃芩、花粉各二升 生甘草節一升 水酒各半煎好以醒消丸送下立消，惟疔毒忌用酒煎。

6. 醒消丸

治一切痛瘍疔毒立能消腫止痛。

乳香、沒藥去油各一兩 射香一兩半 明雄黃五小 各研極細石黃米飯一兩 右乳沒雄三味各研碎津再加射香共細同黃米飯搗爛入末再搗為丸如菜服子大晒干忌火，每服三小熱陳酒送下，醉蓋依汗，酒醒腫消痛息。

7. 大四妙湯

生黃芪五升 大當歸一兩 銀花一兩 生甘草一升 右水沖服自可移深居淺、轉重作輕，如已成氣血瘀者，不能穿潰者，加白芷山甲皂刺各二升，一伏時自潰，如已潰後即宜刪去，皂刺、山甲如初起嫩痛口渴，加天花粉，凡痛疽用此方增減法臨時酌用，通

火症银花每加至六两四两，生黄芪加至两许，当归加至二两，甘草加至三小，但见疮色不起，取水清稀，即加白芷转阴为阳，化毒成肌，如乳白乳吹即加蒲公英一两立消，百发百中非常有效，如通身有游热疮痒者勿用，毒在上部加川芎二小，毒在中部加桔梗二小，在下部加牛膝二小，泄泻加苍白朮各二小，呕吐恶心加陈皮半下各一，不思饮食加白朮三小，陈、一、小、气虚加党参、生芪各五小，

阴疽肉白色淡，无论冬夏加陈皮、麻黄各六分，肉桂炮姜各小半，排脓加白芷三小。

此方治一切无名肿毒，无论阴疽阳疽疔毒，能益气托血解毒托裡破后能排脓去腐生肌长肉愈科之要药，并后生痛毒者更妙。

8. 抑阳散： 治痛毒红肿、焮热疼痛。

天龙粉三两 姜黄、白芷 赤芍各一两四味，各研细末再共研极细，用陈醋调敷患处。

9. 托裡消毒散：

治痛疽已成，不得内消者，宜用此药以托之，未成者可消已成者即溃，腐易脱新肉易生，此时不可内消泄气，寒凉等药致伤脾胃。

处方：

人参 川芎 白芍 黄芪 当归 银花 茯苓 白芷 生甘草 皂刺 桔梗各一 水煎服 脾弱者去白芷倍人参。

10. 托裡透脓汤：

治将溃肌 尚未破者，服此药，易脓易溃。

人参 白朮（土炒）山甲炒研白芷各一，升麻五分，甘草芍五分 当归二小 皂刺小半 生黄芪三小 青皮炒五分 水三盅煎一盅，病在上部先饮酒，病在中部为内兑酒半盅热服，病

在下部先服药后饮酒。

11. 透脓散：

治痈疽诸毒内已酝酿，而未穿破者，服之即溃破垂云。

当归 银花各五分 生黄芪四个 小甲 白芷 川芎 皂刺 并
藜子各一个 酒水三盞煎至一盞，在上者先饮酒一杯心服药，
在下先服药后饮酒一杯，疮上宜覆暖有的无并藜子银花在法。

12. 代刀散：

治痈疽已成未溃破者。

皂角刺 煨黄莲 炒各一刃 乳香 生甘草 苍术各五入 乌服三
个 酒水煎服。

13. 托裡排脓汤。

治已溃破须早回排去消肿新肉易生。

当归 白芍酒炒 人参 白朮土炒 茯苓 连翘 银花 浙贝母
各一个 生黄芪二个 陈皮八分 肉桂一分 甘草四个 生姜一
片 酒水三盞煎一盞 食远温服，毒在脚上者加桔梗 一个，在下
部者，加牛膝八分 在顶上者加白芷五分。

14. 十全大补汤。

治外症气血两虚，及溃而不斂，寒热作痛。

人参 地黃 黄芪各小半 白朮 当归 白芍 肉桂各一个 川
芎 白茯苓 甘草各八分 生姜三片 大枣三枚 酒水煎服 若
气血不足的人结肿尚未成肌的 加枳壳 香附 连翘 服之可以
消散。

15. 补中益气汤。

治痞痛元气不足，内伤劳倦，食少气短，病后内陷，空肿等
症。 功效：补中益气。

黄芪 人参各一个 炙甘草一个 当归一个 橘皮七分 升麻
柴胡各三分 白朮五分（土炒） 生姜三片 大枣二枚 清水煎

去滓，空腹食远，稍热服。

16. 味地黄丸：

治命门火衰，脾肾两虚，及一切外症不能清溃收斂者。

熟地黄八两 干山药 山萸肉各四两 白茯苓 牡丹皮 泽泻
各三两 肉桂一个 附子一两（泡去皮脐）研为极细末，炼蜜为
丸如梧桐子大，每服三十丸分四次温酒下。

神功内托散：

治痛疽脑顶诸疮等症，日久不肿不高不能腐溃，脉细身凉
宜服此温补托裡之剂，以助气血

人参小半 白茯苓一个 土炒白朮一个 甘草炙五分 川芎一个
归身二个 炒白芍一个 黄芪一个 制附子一个 陈皮一个
木香研五分 山甲炒八 右十二味煨姜三片 大枣二枚 水
二茶盅煎服。

疔疮丸：

巴豆去膜三个 明雄三个 煨大黄三个 研细末 白糊为丸
如梧桐子大。轻者五六丸 重者八九丸 极重者大痛等或走
黄（全身传药症）可服123丸 白开水送下 使患者大泻三五
次可愈，饮凉白开水泻止。

三升灵药（升丹）

处方：水银一两 明矾 火硝各一两二小 用小铁锅一个将硝
汞研细不见湿为度入锅内用石盖之，盐泥封固。

升炼法：用炭火先文后武三炷足。

此药比降丹少燥，按法配剂，可化腐生肌，用于阳性的疮
症颇效。可配成甲乙丙丁四种。

甲种药 灵药二两 轻粉三个 血竭花二个 乳香二个 冰片
一个 射香一分 共为细末。

乙种药：灵药二两 轻粉三个 血竭花四个 乳香三个 冰片

三小 冰片二小 射香一分 共为细面。

丙种药 灵药二钱 轻粉二小 血竭四小 乳香 没药 儿茶 龙骨各四小 冰片二小 射香一分五厘 共为极细面。

丁种药 灵药二钱 轻粉六小 血竭花八小 乳香八小 没药八小 儿茶八小 龙骨八小 冰片四小 射香二分 共为极细面。

生肌加象皮四小 毒水多加龙骨。

此方用于疮口无毒之时，恐其毒不尽，可用此药收功，又可服用，治梅毒每用五分量为丸如赤豆大空心服之，泻下清水穢物等二三付即痊，可加射香少许，患肉为丸如赤豆大，每付五六丸。

骨结核在祖国医学外科书上，虽然没有这个名词，但是有些外科症状和性质近乎相似。

例如瘍科心得集载有“附骨痠者，生于大腿之侧骨上，为纯阴无阳之症，小儿三五岁时，先天不足，三阴亏损，又或因有外伤，致使气不得升，血不能行，凝滞经络，隐微痛，遂发此瘍，初起三日一寒热，或五日一寒热，形容瘦损，腿足难以屈伸，有时疼痛，有时不疼，骨痠慢肿，朝轻暮重，久则渐渐微软，似乎有取，及刺破后，取水清稀，或有豆腐花块，随之而去，肘能不消，元气日衰，身体缩小，而显鸡胸，龟背之态，唇舌干焦，二便枯秘，或脾败便泄，饮食少纳，渐成童癆而毙”。

又云：“大人亦有之，男则係房劳不禁，忿怒过度，肾水干涸而生，女则由真阴不足，经枯血闭而发，暂时腿痛足软，腿脚痠楚，渐渐腿股肿胀”。

附骨疽

生大腿内侧和外侧，不论内外，总属附骨而生，故名，或咬骨疽或贴骨疽，环跳疽等。原因：乃阴寒入骨症，皆由体虚之人，及秋露卧，寒湿内袭，故附骨症的起发，皆由血凝气滞。“或房慾之后，盖覆单薄，寒风乘隙入裡，初起寒热交作，状似风邪，随后臂腿筋骨作痛，不热不红，痛至彻骨，甚者曲伸不能转侧，日久阴变为阳，寒化为热，热甚则腐肉化为脓，此疽已成也。”外形漫肿无头，皮色如常，渐渐透红一点，似肉内已成。

按附骨疽：“又名虎飞尸，望连周期，展转数少，冷毒朽骨，出尽自痒，其不痒者，至子终身有之，此皆失乎初也”。骨者肾之余，肾虚则骨冷，骨冷所以痛，所谓骨疽，皆起于肾，肾气虚德，寒邪易入，则骨冷而患成疽，毒聚附骨，而外发形症，盖此疽的根原起于肾。

此疽又名缩脚疽：皮色不异，触硬作痛。

治法：外用白芥子捣粉，白酒酿调涂。

又大戟、甘遂各等份末，白蜜调敷。

内服阳和汤每日一服，服消为止，消后再服。

子龙丸，或小金丹，以杜患根，大忌开刀，开则定成缩脚痲疾。

恶核痰核：

此症六者叫恶核，小者叫痰核，与名疽初起相同，係寒凝甚结，毒根最深，极难软熟，未溃前忌贴凉膏，忌投凉药。

内服阳和汤，西黄丸，可消，大忌开刀，开则翻花起肛，用大蟾破腹刺数孔，连朵盖患核毒软肛内服温补消花毒痰之药，犀黄丸仍可收功。

骨结核：

是一种发展最慢极难治疗的一种慢性疾病，患者大多数是儿童和青年人，老年人佔少数。

好发部位：

脊椎、胸骨、腰膝四肢骨節间，惟头部少见。

原因：

根据临床主诉，骨结核患者，总的说来，要有以下几种原因

- ①曾有肺结核的病史。
- ②有的局部曾受过轻度外伤。
- ③障理寒痰凝结。

骨结核的症状：分以下几个阶段。

在未发病前，有的局部长时间疼痛，骨质肿胀，形成冷脓肿，产生穿道。

骨结核发展的情况：

此病发生前，罹患部，隐々作痛，起始是偶发性的，继则加剧，如患在四肢关节等处，运动障碍，及至时更为明显，特别是过度的劳累，或暴怒时疼痛要加重，早期治疗如无效，持续期而无望，可延长1-3年不等，后来在痛的范围内，或略下部位处，出现小的脓疱。（脓疱出现后内里疼痛即减轻或消失）此脓疱初起即有波动，软而不痛，用指按压有的能够消失，少时即复原，逐渐扩大，漫肿色暗不热不红亦不疼痛，触诊：用指轻按不疼，重按光滑，或脓疱的边缘处使硬的部份，分界线处，则疼痛难忍，在脓肿的，好坏组织相隔处，可摸到略坡形而凹陷处，即脓腔的内壁，此硬壁是由肌肉硬化而形成包围病灶的四週，使被破坏的血管断端闭塞，阻止血液流脓腔，及防止脓水浸入血液内，如患者，身体虚弱，食慾不佳，倦怠乏力，抵抗力薄弱，如听其自溃，可延长数月或一年不破，脓疱初溃破，所排除之脓液厚薄，与患者体质有关，如七恶不犯，五善俱备，身体比较好，则排除大量的稀稠厚的黄色的脓，继则流出淡红色的稀脓，以后淡红色稀脓逐渐减少，而变为稠厚的脓，即好的现象，如患者