

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷二十七



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

薛氏醫案

婦人良法

中國醫方論

名為風者則其氣必虛而中風者主長養萬物否則或中腑或中臟或中血

明 薛已 訂

脉經絡其症或肢體不遂或手足偏枯或痰涎壅塞或口眼歪斜或牙關緊急或腰背反張若眼開口閉涎流失音者難治如眼閉口開鼾睡遺尿者死中風中氣皆用蘇合香丸中氣用三生飲若作風治百無一生

愚按中風者即內經所謂偏枯風痲風懿風痺是也而有中腑中臟中血脉之分焉夫中腑者為在表中臟者為在裏中血脉者為在中在表者宜微汗在裏者宜微下在中者宜調榮中腑者多著四肢如手足

拘急不仁惡風寒此數者病淺皆易治用加減續命
湯之類中臟者多滯九竅如眼瞤者中于肝舌不能
言者中于心唇緩便秘者中于脾鼻塞者中于肺耳
聾者中于腎此數者病深多難治中血脉者外無六
經之證內無便溺之阻肢不能舉口不能言用大秦
朮湯主之中腑者多兼中臟如左關脉浮弦面目青
左脇偏痛筋脉拘急日瞶頭目眩手足不收坐踞不
得此中膽兼中肝也用犀角散之類如左寸脉浮洪

面舌赤汗多惡風心神顛倒言語蹇澁舌強口乾忪悸恍惚此中小腸兼中心也用麻黃散之類如右關脉浮緩或浮大面唇黃汗多惡風口喎語澁身重怠惰嗜卧肌膚不仁皮肉瞤動腹膨不食此中胃兼中脾也用防風散之類如右寸脉浮濡而短面色白鼻流清涕多喘胸中胃悶短氣自汗聲嘶四肢痿弱此中大腸兼中肺也用五味子湯之類如左尺脉浮滑面目黧黑腰脊痛引小腹不能俛仰兩耳虛鳴骨節

疼痛足痿善恐此中膀胱兼中腎也用獨活散之類
此皆言真中風也而有氣血之分焉蓋氣虛而中者
由元氣虛而賊風襲之則右手足不仁用六君子湯
加釣藤薑汁竹瀝血虛而中者由陰血虛而賊風襲
之則左手足不仁用四物湯加釣藤竹瀝薑汁氣血
俱虛而中者則左右手足皆不仁也用八珍湯加釣
藤薑汁竹瀝其與中風相類者則有中寒中濕中火
中氣食厥勞傷房勞等症如中於寒者謂冬月卒中

寒氣昏冒口噤肢攣惡寒脉浮緊用麻黃桂枝理中
湯之類中於暑者謂夏月卒冒炎暑昏冒痿厥吐瀉
喘滿用十味香薷飲之類中於濕者丹溪所謂東南
之人多因濕土生痰痰生熱熱生風也用清燥湯之
類加竹瀝薑汁中於火者河間所謂非肝木之風內
中六淫之邪外侵良由五志過極火盛水衰熱氣拂
鬱昏冒而卒仆也用六味丸四君子獨參湯之類內
有恚怒傷肝火動上炎者用柴胡湯之類中於氣者

由七情過極氣厥昏冒或牙關緊急用蘇合香丸之
類誤作風治者死食厥者過於飲食胃氣自傷不能
運化故昏冒也用六君子加木香勞傷者過於勞役
耗損元氣脾胃虛衰不任風寒故昏冒也用補中益
氣湯房勞者因腎虛精耗氣不歸源故昏冒也用六
味丸此皆類中風者也夫內經主於風河間主於火
東垣主於氣丹溪主於濕愚之斯論僭補前人之闕
也若夫地之南北人之虛實固有不同其男子女人

大畧相似當與後論叅看通變治之

附治驗

靳閣老夫人先胸脇脹痛後四肢不收自汗如水小便自遺大便不實口緊目瞶飲食頗進十餘日矣或以為中臟公甚憂余曰非也若風既中臟真氣既脫惡症既見禍在反掌焉能延之乃候其色面目俱赤而面或青診其脉左三部洪數惟肝尤甚余曰胸乳脹痛肝經血虛肝氣否塞也四肢不收肝經血虛不

能養筋也自汗不止肝經風熱津液妄泄也小便自遺肝經熱甚陰挺失職也大便不實肝木熾盛尅脾土也遂用犀角散四劑諸症頓愈又用加味逍遙散調理而安後因鬱怒前症復作兼發熱嘔吐飲食少思月經不止此木盛尅土而脾不能攝血也用加味歸脾湯為主佐以加味逍遙散調補肝脾之氣清和肝脾之血而愈後每遇怒或睡中手足抽搐復用前藥即愈

大叅朱雲溪母於九月內忽仆地痰昧不省人事唇
口喎斜左目緊小或用痰血之劑其勢稍緩至次年
四月初其病復作仍進前藥勢亦漸緩至六月終病
乃大作小便自遺或謂風中於臟以為不治余診之
左關弦洪而數此屬肝火血燥也遂用六味丸加五
味麥門芎歸一劑而飲食頓進小便頓調隨用補中
益氣加茯苓山梔釣藤丹皮而安至十月復以傷食
腹痛作瀉左目仍小兩關尺脉弦洪鼓指予以六君

加木香吳茱升麻柴胡一劑而痛瀉俱緩復以六君
加肉果故紙一劑諸脉頓平痛瀉俱止余謂左關弦
洪由肝火血燥故左目緊小右關弦洪由肝邪乘脾
故唇口喎斜腹痛作瀉二尺鼓指由元氣下陷設以
目緊口喎誤作風中投以風藥以腹痛泄瀉誤作積
滯投以峻劑復耗元氣為害甚矣後以陽虛惡寒圍
火過熱致痰喘誤服寒劑而卒

一婦人因怒仆地語言蹇澁口眼喎斜四肢拘急汗

出遺尿六脉洪大肝脉尤甚者由肝火熾盛蓋肝主小便因熱甚而自遺也用加味逍遙散加釣藤及六味丸尋愈

一老婦兩臂不遂語言蹇澁服祛風之藥反致筋攣骨痛余謂此肝火血虛所致用八珍湯補氣血用地黃丸補腎水佐以排風湯年餘而愈

一婦人經行口眼歪斜痰涎壅盛此血虛而肝火動用加味逍遙散加牡丹皮治之尋愈後因飲食停滯

日吐痰涎此脾氣虛不能攝涎歸經也用六君子二十餘劑而安

一婦人因怒口眼歪斜痰涎上湧口噤發搐此脾肺氣虛而肝木旺用六君子加木香釣藤柴胡治之漸愈又用加味歸脾湯調理而安

一產婦勤於女工忽仆地牙關緊急痰喘氣粗四肢不遂此氣血虛而發瘕朝用補中益氣湯加茯苓半夏夕用八珍湯加半夏各三十餘劑不應此血氣之

未復藥之未及也仍用前二湯又五十餘劑尋愈

一婦人素有內熱月經不調經行後四肢不能伸卧床半載或用風濕痰火之劑不效其脉浮緩按之則濡名曰痺症屬風寒所乘用加味逍遙散加肉桂防風四劑頓愈更以八珍湯調理兩月餘而痊

一婦人素經行後期因勞怒四肢不能屈名曰痺症此血虛而風熱所乘先用八珍湯加鈞藤柴胡漸愈更佐以加味逍遙散調理而痊

一婦人四肢攣屈煩痛自汗小便短少畏見風寒脉浮弦緩此氣血虛而風寒濕熱相搏先用東垣清燥湯漸愈再用加味逍遙散及八珍湯加牡丹皮而痊一婦人素有火忽然昏瞶瘈瘲抽搐善伸數欠四肢筋攣痰涎上升此肺金燥甚血液衰少而然也用清燥湯六味丸兼服尋愈

一婦人肢節作痛不能轉側惡見風寒自汗盜汗小便短少雖夏亦不必表其脉浮緊此風寒客於太陽