

689

外科 針灸科 婦科 兒科

訂參人介周
四卷



院學醫國北華

H2.033

820

1:

臨
床
治
驗
錄

周
介
人
輯
注

北
平
華
北
國
醫
學
院



34726

平 北
 堂 魁 聚
 局 書 義 講 訂 裝
 星 魁



※ 字 印 皮 書 ※
 街 中 寺 光 永 外 宣
 號 九 十 東 路 頭 北

臨床治驗錄 目錄序

李理齋藏

此篇根據証候學。擬將唐宋以後迄近代之學派治案。擇其有裨實用。爲四年級諸生參考之資者也。只以卷帙浩繁又爲時間所限。尙無系統可云爾。

抑肝散

螻蛄

心風與熾燥

針灸治驗

主証與兼証

變基(不見科)

神經衰弱之灸法

臨床治驗錄

周介人

抑肝散加陳皮半夏運用之治驗例

友人鈴木氏，男子四十三歲，訴腹中動氣。下腹緊滿。感_{肩凝}。背_張，胃障害等。亘年餘，然對於業務上無防礙。氏之腹診上，有應特記者。即左側腹直筋著明拘攣。按之時，由左臍傍邊，向心下，及大動氣，湧如應手。

初診當時因主訴左側乳下部疼痛，與便秘。故按肝積血痛治療，與以疏肝湯，加大黃下之。約十日而愈。（疏肝湯方，柴胡，當歸，桃仁，枳殼，青皮，川芎，白芍，黃連，吳萸，紅花。）以後未服藥。然較一月前，於前記諸證外，咽中有懸物，咯而不出。嚥而不降。常覺難堪不快。此所謂梅核氣與以半夏厚朴湯，服藥數日，咽中不利感，愈大半。（半夏厚朴湯，半夏，厚朴，茯苓，生姜，蘇葉）後不久，以上諸證再發。余感大責。於是涉獵諸書。俾廣得適方。偶閱淺井南溟先生選腹證抄本。其腹狀與鈴木氏極彷彿。初由腹診上試之得一機會。是書所揭之腹狀併註如下。

一例、凡由臍左近邊。迄心下。爲動氣盛。屬肝虛痰火甚症。北山氏當以抑肝散，加陳皮半夏治愈者。達數百人。

二例、又有臍左方悉有動氣者。痰甚也。屬肝虛。宜抑肝散，導痰湯合方。

遂從是書所論腹狀治療。正適想第一例。投與抑肝散加陳皮，半夏。或有少許便閉之氣味。因此每兼用薏苡仁散，（薏仁山歸來等爲主劑含大黃輕粉驅梅劑，）服藥七日，患者自覺症狀大輕快。據云從來投諸方，例認得自覺症候輕快，彼顯著膨大之左腹大動氣。亦無微動。依此方劑，實可驚者，即其得靜也。此後腹壁軟弱而陷沒，然豐滿之肉狀態。於腹時感抵抗。脈自服前藥亦沉微，但力大。咽中不利。腹中動氣。下腹緊滿等諸證，俱消散，氣分甚好。

此處兼用薏苡仁散，因該氏既往有梅毒。咽中不利。亦或應歸諸梅毒所致。對於腹狀知抑肝散加陳皮半夏之偉效，同方試用舊患，新患，時收無效。今舉例數則。披瀝同方運用之私見。及集先輩之口訣。

第二例。森田氏夫人四十五歲，全身倦怠。頭重。上衝。眩暈，頭項強急，已五年以上。又

常心悸。動輒發生強迫觀念。連年鬱鬱不樂。以上諸証。於行經時。尤爲著明。月經時異常。長有下血。三年來兩眼流淚。有時兩眼朦朧不能讀書。夜半睡眠中。突然引兩足。驚醒時明明自覺心中動氣。但不由恐怖起來。體格爲削瘦型。青年時曾患肺炎加答兒。夫人之腹狀。想到恰爲前揭抑肝散腹症。即由臍下經左臍旁至心下。蜿蜒如蛇之彎曲動行。腹壁軟弱。呈特有之觸感。兩腹直筋萎削。按之則僅左側大動氣應手。夫人已服加味逍遙散。十全大補湯。補中益氣。加四物湯。桃核承氣湯之類。然結果自覺症候一進一退。腹症依然如舊態。鈴木氏之治驗後。初投抑肝散加陳皮半夏。夫人因有梅毒既往症。便秘甚。故兼用加味瀉肝丸。(方中含輕粉)同方服十五日。經過頗佳。後又與十日藥量。並令其服藥後來院。

患者服藥完後來院。顏色、頰肉、表情等。皆比前活潑。依患者所言。服藥後諸自覺症狀殆無。脈有力。已往之慄則恐怖。及覺難堪疲勞。今頗願自發的動作。腹力蹶張狀。彼之大動氣鎮靜。與鈴木氏同。森田夫人之脈稍弦。舌常有白胎。兩月來經行尋常。精神恢復。使子輩做體操等等。皆爲不思議之事。

第三例，清宮夫人較森田夫人症狀激烈。年四十三歲。二年前訴胃腸障害。屢受治療。清宮夫人於數年前。亦曾患肺炎加答兒。本症約於六月前發生。即頭重，（感絞頭樣）眩暈，耳鳴，眼朦朧。有時不能看字等。與森田夫人相同。步行時眩暈。足不着地。想時似落穴中樣。如見聞任何感動精神事。立即心悸。往往發生腦貧血而顛倒。故恐其發生腦貧血。不能單獨外出。又有多怒症。如逢道人，其着衣不正而發怒。以上諸症於行經前後。尤着明。此點與森田夫人同。尤嫌惡乘車。於電車中，心悸亢進或腦貧血。更易引起。清宮夫人每見刀類時，常想自己何不用此自殺。於是忽然發生腦貧血。又自己想豈不是狂人嗎。此時生極度恐怖。夫人爲上流家庭。故凡可能療法皆受過。從來西醫診斷，大抵爲神經衰弱症。或臟躁症。結果無效。最近於某大醫院血液檢查結果。瓦氏反應爲強陽性。即爲腦梅毒之初期。注射六〇六然注射時全身症候惡化。該西醫云爲一時的反應。強限注射十針。不能再耐忍。遂發熱臥床，度苦悶日子。以後面目漸漸削瘦。體格亦削瘦。所見與森田夫人同。腹症如前脈沉微。舌白胎。即與以抑肝散加陳皮半夏。兼用桃核承氣丸。

迨服藥五日。不用伴人單獨來院。一瞥顏色，如別人活氣。步行亦確實。患者首先得意說。

能單獨外出。同方服藥三日。諸證消散。身中一派活氣湧起。後同方連用五月。每年冬季易罹感冒。今年並未感染。身體漸肥滿。

第四例，是合平男四十歲。數年前患梅毒。約自三年前訴後頭部壓重之感。肩凝背張。腰痛。胃腸障害。食思殆無。苦不眠。記憶力減退。頭內朦朧。自云成爲廢人。西醫診斷爲神經衰弱。或腦梅毒。發病後注射六〇六達六十次以上。諸症並無微動。遂赴京於某醫院受馬拉里亞療法。(梅毒療法之一種)巨月餘。前記諸證益甚。腹診心下稍滿。不及前記三例顯明。然由臍旁至心下觸動氣。腹壁軟弱。脈沉微。舌無異狀。因臍下有仁之候。故與以抑肝散加陳皮半夏。兼用六味丸。共服十四日。本病主症消解。以後食慾振。頭重輕減。後再服二次。休止服藥。其後經過不明。

一、對於右所記神經症候。同方確有效果。

二、抑肝散加陳皮半夏之藥理。及對於同症病理。

按抑肝散之原方。爲明氏發明。載於保嬰撮要。啞科急驚門。其處方。當歸。白芍。茯苓。鉤藤(各一錢)川芎(八分)柴胡。甘草(各五分)加陳皮(八分)半夏(一錢)一見極爲平凡處方

。將右各味混合。用量一匁四分（合中國四錢），每食前一時服。一日三包。煎法一包用一合半水煎至一合。溫服。至於本方何以奉此偉效。尙未得達神滿意得之域。

按抑肝散原文。主治因爲肝經虛熱。或發熱咬牙。或驚悸寒熱。或木乘土。嘔吐。痰涎。腹脹。食少。睡臥不安等。原來小兒急癇（即癇癇）。或對小兒腦膜炎。應用之處方。

今用抑肝散加陳皮半夏。因前記腹症。爲痰火甚。痰涎多。等應用之意義也。即抑肝散。加陳皮半夏。能補肝木之虛。冷痰火。去痰涎也。其藥理說明。今借和田東廓翁方意解。即「抑肝散用於多怒不眠性急等症之甚者。多怒不眠性急等。爲肝氣亢極之徵。肝氣亢極。則肝火熾盛。肝血亦隨損耗。故以當歸潤肝血。以川芎疏肝血。以柴胡。鉤藤。甘草等緩肝氣。如右之肝氣亢極。胸膈引上。故腸胃之水飲。亦不下降而引上。（即胃內蓄水成爲痰涎。發生胸痞。食思不振等）有疎肝。緩肝。潤肝之藥。兩脇心下和。水飲亦易下降。故以白朮茯苓利小水。此藥專潤肝氣。以緩爲主。故余常合芍藥甘草湯用之。又按此方當歸川芎專潤血。即皮膚枯燥。亦有潤意。

由上述大意了解。即因肝火熾。肝血損耗。肝虛結果發生多怒。不眠。性急不安。頭重等神

經症狀。胸膈鈞上。故成上衝眩暈，肩凝等，心下痞，而發生食思不振，痰飲等。此時以抑肝散加陳皮半夏緩肝，潤肝，疎肝，去痰涎，振起其機能之意義也。

茲又何故招來肝火亢極，肝血虛損，肝虛，其病理如何。已如前所記載矣。有抑肝散加陳皮半夏應用之腹症患者，多百發百中。有梅毒之既往症。以余之私見，呈此情形腹狀，原因爲梅毒。亦爲招來肝虛之遠因。小兒急痢。所謂多因胎毒。多爲先天性梅毒兒。亦確論也。

考中醫論小兒病原因，大半歸諸胎毒。小兒肝毒多少。全在由母胎承傳。非生理血液之關係。母胎有梅毒者。則小兒肝臟，自有解毒作用。故胎毒多之小兒。初因解毒作用。肝臟腫大。漢方腹診上，對於肝經發生病變。吾人名曰肝毒。按此種小兒，而今稱膿病質。或神經質也。

按肝臟有解毒作用。彼瓦氏反應之際。最必要者爲免疫元。試由遺傳胎兒肝臟中，取出免疫元即明矣。又被人仆擊打傷時，發生振盪死，此因打擊時，人體內產生一種毒素，若肝臟盛時。可使成爲無毒。然毒量多時，解毒力弱故致死。反之，肝臟發生脂肪變性。其作用衰之

人。雖毒量少。亦容易發生振盪死。

肝臟除解毒作用外。其重要任務。爲使葡萄糖。變爲肝糖。而固定之。然肝臟對於全身營養狀態。有如何關係。前記應用抑肝散之人。悉爲羸瘦型者。肝毒多。照病性小兒。無不瘦者。不拘與以美食。反增食毒。而身體不肥。即如前例清宮夫人瓦氏反應呈陽性。且因注射六〇六。反惡化狂亂。此何故歟。此豈能僅以一時反應而默認。肝於積極的解毒作用旺盛之時。漢方尙有用肝臟瀉劑。以測病毒之驅除。一旦肝臟虛弱。則不僅不用瀉劑。必用補肝之藥。此時用六〇六。正如鞭打瀕死之馬。爲無情之處置。可不愼歟。

又考中醫古來視肝臟有一個靈力。魂宿處也。抑肝散之患者。受診斷或爲神經衰弱。或躁病。或腦梅毒等。而爲精神狀態者明發生障礙。漢方之靈的病理。即說明精神病理學。如前述古人以肝爲魂居處。肝因悲哀則傷魂。魂傷則狂亂而不精（靈樞本神篇）。又魂從神而往來（靈樞本神篇）。或可按現代皆從腦。而解往來活動。又云魂陽神。爲氣之神也。則抑肝散症所稱神經衰弱。躁症。照漢方無形病理。皆可云爲因肝虛。魂即氣神狂亂。此講其治療方法。理由之所在也。

凡關於肝臟之位置。五臟論云肝在左。如西醫或一般定說。視爲妄言。然於類經明確記載滑氏曰。肝臟其治在左。其臟在右。膈及右腎之前。胃並附着右第九椎。肝臟在右而治左。即當治之標準爲左。此非實爲驚人卓見乎？抑肝散其當治可云左側。肝虛動氣盛。示以補肝之法。前述鈴木氏最初應用之疎肝散。於萬病回春註云。左脇下痛。屬肝積血。由此等證明肝之在左。或非流言也。按類經爲明天啟四年所著。經曰。肝生于左。是就生理推論。非部位之謂。詳靈素生理學。

抑肝散先人之口訣

和田東廓。與淺田栗園。皆常用抑肝散。茲因前者由方意解。後者由勿誤方函引用。但此等爲對於抑肝散本方之口訣。方意解。詳述抑肝散藥理。且勿誤方函口訣之議。論以和田解釋爲基準。更附加淺田經驗。歸納二者意見。認爲極好參考之資。

按此方爲四逆散之變方。凡屬肝部筋脈強急者治之。四逆散。則主治腹中任脈拘急。而衝胸膈之下者。此方主治由左腹拘急。而四肢筋脈變急者。東廓之經驗。此方尙治大人半身不遂。及不寐症。由心下任脈變急動悸。氣聚心下而有痞之氣味。以手按之則不見。問病人必云

此方係攝六氣
外傳而傳
因道數年
公四逆散之方
有不合

症。遺遂散即本方僅二味不同。其效用亦異也。此處應着眼。

又一方。於勿誤方函中。有關於沉香天麻湯口訣。稟園註。沉香天麻湯治癰。較抑肝散症重者主之。沉香天麻湯。尙用於男子久下血。腎水過耗。心虛。婦人產後經血不下。或久痢。膿血下多。或患痔膿血久出後。用四物入珍等補益之方無效時。用本方有再造之神效。

沉香天麻湯方 沉香 益智 川烏頭(各一錢) 防風 天麻 半夏 附子(炮各三錢) 羌活(一錢半) 炙甘草 當歸 殭蠶(各錢半) 獨活(四錢)

此方附子烏頭量大。用時須注意。余用時多使冷服。未出何變動。

抑肝散加陳皮半夏症屬肝虛。同時多伴脾胃虛而來。以現代醫學解之。即肝膽有疾患時。一般胃液分泌減弱也。此即古人所謂肝胃不和之理。

結論

西醫診斷。多爲神經衰弱。躁症。腦梅毒。脈多沉微。舌多因心下痞。胃內蓄水。有薄白胎而不渴。腹症。兩腹直筋萎弱。腹筋全體陷沒。呈一種特有筋支障。由左側臍旁至心下。觸有大動氣。往年或經過失血。或梅毒。則即可應用抑肝散加陳皮半夏。一方併用歸脾湯。

六君子湯，且應考慮體力與以驅梅藥。

如右之症狀皆備者。固可與以抑肝散加陳皮半夏，但亦不限全備，例如，余應用頑固妊娠嘔吐，而得意外奇效。此點爲運用之微妙處，中醫對此點甚多也。

臨床治驗錄

周介人

蟻瘡

女子薄吾病甚。衆醫皆以爲寒熱篤。當死不治。臣意診其脈曰。蟻瘡。蟻瘡爲病。腹大。上膚黃蠱。循之戚戚然。飲以芫花一撮。即出蟻可數升。病已。三十日如故。病蟻。得之於寒濕。寒濕氣。宛篤不發。化爲蠱。所以知薄吾病者。切其脈。循其尺。其尺索刺蠱。而毛髮奉美。是蟲氣也。其色澤者。中藏無邪氣。及重病。

按衆醫以寒熱篤。爲不治。必誤認爲中藏重症也。倉公決其爲蟲。固也。然蟲之爲病亦多矣。察其膚蠱。知爲蟻蟲。察其髮美。知內無重病。此則宜深思也。按人種學。種族雖異。而髮之分類。可分四項。一繖毛。如巴比亞人是。一直毛。如中國人是。一波狀毛。如德國人是。一叢毛。如涅姑諸人是。髮最粗者。爲西藏人。髮最細者。爲芬蘭人。至髮之色澤。亦各不同。要皆基於色素分量。色素在表皮下稀少者。與歐人之髮色多。及中國人之髮毛相等者。皆因色素而異。德國某醫。以體軀年齡相等之少年。人頭四顆。合而考之。約計紅色共