

增補壽世保元

上海廣益書局石印
卷之三

●痰飲

脉雙弦者寒飲也。其脉偏弦者飲也。肺飲不弦但喘短氣。又云脉浮而細滑湯飲。脉弦數有寒飲。春夏難治。脉沉而弦者懸飲內痰。其人短氣四肢麻木走痛脉沉者有留飲。左右手關前脉浮弦大而實。膈上有稠痰也。宜吐之。病人百藥不効。關上脉伏而大者痰也。眼胞及眼下如炭烟熏黑者亦痰也。久得滿脈痰飲膠固脉道阻滯也。卒難得開必費調理。

痰者病名也。生于脾胃然脾胃氣盛飲食易化何痰之有。或食後因之氣滯勞碌驚恐風邪致飲食之精華不能傳化而成痰飲。痰有流乎經絡皮膚者有鬱于臟腑者。節者游溢遍身無所不至。痰氣既盛客必勝主。或奪于脾之大絡也。氣則候然扑地。此痰厥也。升于肺者則喘急咳嗽迷于心者則怔忡恍惚走于肝則眩暈不仁。脅肋脹滿。關于腎則治而多痰涎流于中脘則嘔瀉而作寒熱。注于胸則嘔膈不利。肩腋骨痛入于腸澆澆有聲。散于胸背則掀觸一點疼痛。或寒于手足或背痺一邊散則有聲聚則不利。一身上下變沉百病治當各從所因。是以虛宜補之火宜降之氣宜順之鬱宜開之食宜導之風寒濕熱宜發散清燥以除之。故曰治病必求其本。

一論有 濕痰 熱痰 風痰 老痰 寒痰 食積痰 宜後方加減 二陳湯 陳皮 去白 半夏 湯泡 白茯苓 去皮

錢一 甘草 五分 右剉一劑生薑三片水煎溫服

一濕痰感者身軟而重如蒼术白术。一熱痰加黃連黃芩。痰因火盛逆上降火為先加白术。黃芩較石膏黃連。一眩暈

嘈雜者火動其痰也亦加山梔黃連黃芩。一風痰加天麻枳壳南星白附子。蠶蠶牙皂之類氣虛者加竹瀝實者加荆

瀝俱用薑汁。一老痰用海石半夏瓜蒌香附連翹之類五倍子佐此藥。七治頑痰宜丸藥喉中有物咯不出咽不下此

痰結也用藥化之加鹹藥較堅之類宜瓜蒌杏仁海石桔梗連翹香附。少佐朴硝薑汁煉蜜和丸。噉服之脉滑者卒難得

開必費調理氣實痰熱結者吐難得出或成塊吐咯不出氣滯者難治。一寒痰痰塞胸中倍加半夏甚者加麻黃細辛

烏頭之類痰厥頭痛亦加半夏。一食積痰加神曲麥芽山查炒黃連枳實以消之甚者必用攻之宜丸藥兼血虛者用

補血藥送下。中焦有痰者，食積也。胃氣亦賴所養，卒不便虛。若攻之盡，則虛矣。噫氣吞酸，此係食積而鬱，有熱火氣動。上加黃芩、南星。一血虛有痰，加天門冬。知母、犀角、仁香、附米、竹瀝、姜汁。帶血者，更加黃芩、白芍、桑白皮。血滯不行，中焦有飲者，取竹瀝、加生薑汁、韭汁、飲三五盞。必胸中煩燥，不宜後愈。一氣虛有痰，加人參、白朮。脾虛者，宜補中氣。以運痰降下。加白朮、芍藥、神曲、麥芽。兼用升麻、提氣、內傷夾痰，加人參、黃芪、白朮之類。姜汁傳送。或加竹瀝尤妙。一痰在膈上，必用吐法。瀉之不去，膠固稠濁者，必用吐。脈浮者，宜吐。痰在經絡間，非吐不可。吐中就有發散之義。凡用吐藥，宜升提其氣，便吐。加防風、川芎、桔梗、桑芽、生薑、薑汁之類。或瓜蒂散。凡吐用布緊勒肚子，不通風處行之。一痰在腸胃間，可下而愈。枳實、甘遂、巴豆、大黃、芒硝之類。凡痰用利藥過多，脾氣易虛，則痰易生而多。一痰在膈下，非白芥子不能達。一痰在皮裏膜外，非姜汁竹瀝不可。及在四肢，非竹瀝不關。在經絡中，亦用竹瀝必佐以生薑、韭汁。膈間有痰，或癰疽，或健忘，或風痰，俱用竹瀝。與荆瀝同功。氣虛者，食用竹瀝。氣實能食用荆瀝。一凡人身上中下有塊，是痰也。問其平日好食何物，吐下後方用藥。

一凡人頭面頸項身中有結核，不痛不紅，不作膿者，皆痰注也。宜隨處用藥消之。一凡痰之為物，無處不到。為隨氣升降故也。

一論竹瀝太治熱痰，及能養血清熱。有痰廢不省人事，幾死者，得竹瀝灌之，速與。誠起死回生妙藥也。用水竹半盞，竹截長二尺許，小者每段劈作二片，大者劈作四片，入井水浸一時許，以薄磚二塊排定，將竹片架于磚上，兩頭露二寸許，下以烈火迫之。兩頭以盆盛瀝，每六分中加姜汁一分服之。痰熱甚者，止可加半分耳。用以竹瀝加入湯藥內服之，尤妙。取荆瀝亦治熱，亦照此法取之。

一論痰屬濕，乃津液所化。因風寒濕熱之感，或七情飲食所傷，以致氣逆液濁，變為痰飲。故曰痰因火動，降火為先。火因氣逆，順氣為要。加減二陳湯。橘紅去白，半夏錢半，白茯苓去皮，貝母一錢，枳實炒一，白朮去蘆二分，生薑片連翹五分，黃芩酒炒，防風祛濕，天花粉七分，香附便炒，甘草三分，右剉生薑三片，水煎溫服。

一論熱痰在胸膈間，不化吐咯不出，寒熱氣滿，悶作痛者，名曰痰結。開結化痰湯。陳皮，半夏製，茯苓，桔梗，枳壳，貝母，瓜蒌仁，黃連，黃芩，梔子，蘇子，桑皮，朴硝，杏仁，甘草。右剉水煎，入薑汁，磨米香服。

一論通身四肢骨節走注疼痛牽引胸背亦作寒熱喘咳煩悶或作腫塊痛難轉側或四肢麻痺不仁或背心一點如冰冷

脉來沉滑乃是濕痰流注經絡關節不利故也清濕化痰湯南星泡半夏製陳皮去茯苓去蒼朮炒

羌活酒芍白芥子白芷甘草右剉水煎入竹瀝薑汁磨木香溫服骨體痛甚及有腫塊作痛者名曰痰塊

加乳香沒藥海石朴硝頭頂痛加川芎威靈仙手臂腫痛加薄桂引南星至痛處

一論內傷七情痰迷心竅神不守舍神出舍空空則痰生以致增寒壯熱頭痛昏沉迷悶上氣喘急口出涎沫證類傷寒兼

治中風痰厥氣厥不省人事者清熱導痰湯人參白朮去茯苓去陳皮去半夏製南星製枳實煨

桔梗黃連黃芩瓜蒌仁甘草右剉生薑煎入竹瀝薑汁同服家傳清氣化痰丸製造甚得法化痰清火

開膈順氣消痞降脹醇酒消食殊効天南星兩大半夏兩二位先用米泔水各浸三五日以透為度洗淨切片以

碗一個盛貼晒乾先薑汁次皂汁又次鬱汁又取硝水晒乾一用生薑汁浸一日夕晒乾一用皂角煎水去渣浸一

旦夕曬乾一用白礬一兩煎水浸一日夕晒乾一用朴硝一兩煮水浸一日夕多晒乾青皮去穢陳皮去穢枳

壳去穢枳實煨白朮去茯苓去蘇子炒白芥子炒蘿蔔子炒看附鹽水瓜蒌仁乾葛桔梗去穢枳

杏仁去穢黃芩煨神曲炒麥芽炒山查去白豆蔻去前胡薑甘草各一右為細末用前浸四味藥

水加竹瀝一碗泡蒸餅為丸如梧子大每服五七十丸或茶或薑湯送下

一論健脾胃清火化痰頑痰能乾結痰能開疎風養血清上焦之火除胸膈之痰清頭目止眩暈千金化痰丸膽星兩

半夏薑汁同煮陳皮去白白茯苓去海石大兩天花粉二片苓酒炒黃柏酒炒

知母酒炒當歸酒炒天麻三兩防風去蘆白附子兩甘草二兩大黃酒茶丸白朮炒二兩氣虛加

人參錢右為細末神曲二兩打糊為丸如梧子大每服七八十丸茶水送下

一秤金一名金珠化痰丸治痰嗽如神又次痰嗽用半夏十斤米泔水浸十日換水三次取出切作兩半晒乾用白礬五

斤水一桶入鉄鍋化開將半夏入礬水內浸二十日取出切作四瓣曬乾用生薑十斤另研取汁再入半夏浸二十日取

出晒乾為細末聽用粉草十斤去皮為粗入鍋內添水煮數沸取出以布濾去渣將淨水仍入鍋內熬成膏子和成劑每

病重者用藥二錢半輕者二錢金箔十張和一大丸與病人噙化忌房事此藥神効不可輕忽

曾補壽世保元卷三

一治痰疔方 梨汁一 生薑汁一 蜜一 南薄荷末三 右和勻重湯煮十餘沸任意食降痰驗如神馬

一論痰飲為病或狂或眩暈等症無不奏効 白丸子 中州傳明岐傳 川南星四 半夏十 白附子五 小川烏三

右俱切片春七夏三秋八冬十日水浸一日一換日晒夜露南星半夏放磁器內少加薑汁人浸去麻桂次將煎藥磨

又將絹巾濾去渣澄白粉晒乾白米糊為丸如梧子大每服五六十丸薑湯滾水任下其藥放舌上不麻為度方妙 鈞

痰仙方 曹府秘方 礪砂錢 白礬半生半 磁青上細礪器打下 瓜蒂分 青蒙石煎紅浸薑 右共研細末每

用二厘薄荷濃湯調入鼻內即愈

一人氣短有痰小便赤澀足眼作痛尺脉浮大按之則滑此腎氣丸補飲也用四物送六味丸不月而康仲景先生云氣虛

有飲用腎氣丸補而逐之誠開後學之蒙瞶濟無窮之天柱腎氣丸即六味丸也○一儒者體肥善飲仲秋痰喘用二陳

苓連益甚加桑皮杏仁盜汗氣促加知母枳壳不時發熱余以為脾肺虛寒用八味丸以補土母補中益氣以安中氣而

愈○一婦人因怒吐痰胸滿作痛服四物二陳苓連枳壳之類不應更加祛風之劑半身不遂筋漸攣縮四肢痿軟日晡

益甚肉熱口乾形體倦怠余以為鬱怒傷脾肝氣血復損而然遂用逍遙散補中益氣湯六味地黃丸調治喜其謹疾年

餘悉愈形體康健 補中益氣湯見內 六味丸 八味丸俱見 益補

◎咳嗽 脉咳嗽所因浮風緊寒數熱細濕房勞滑瀉右關濡者飲食傷脾左關弦短疲極肝衰浮短肺傷法當咳嗽五臟之嗽各視

本部浮緊虛寒沉數實熱洪滑多痰弦滑少血形盛脉細不足以息沉小伏匿皆是死脉惟有浮大而嗽者生

夫痰謂有聲肺氣傷而不清嗽謂有痰脾濕動而生痰咳嗽者因傷肺氣而動脾濕也病本須分六氣五臟之殊而其要皆

主于肺蓋肺主氣而聲出也戴云因風寒者鼻塞聲重惡寒者是也因火者有聲痰小而赤者是也因勞者盜汗出兼痰

者多作惡熱肺脹者動則喘滿氣急息重痰者嗽動便有痰聲痰出嗽止五者大概耳亦當明其是右也治法須分新久

虛實新病風寒則散之大熱則清之痰涎則化之濕熱則瀉之久病便屬虛虛屬鬱氣虛則補氣血虛則補血兼鬱則開鬱

滋之潤之飲之降之則治虛之法也 一論四時感冒發熱頭痛咳嗽聲重涕唾稠粘中脘痞滿嘔吐痰水寬中快嘔不致傷脾此藥大解肌熱將欲成勞痰嗽喘

熟地効用 參蘇飲 紫蘇葉 前胡 桔梗 枳殼 乾葛 陳皮 半夏湯 白茯苓 甘草 人參

五 木香 熟地 右判一劑 姜棗煎服 若天寒感冒惡寒無汗咳嗽喘急或傷風無汗鼻塞聲重如麻黃錢一杏仁

錢 金沸草錢以汗散之 若初感冒肺多有熱加杏仁桑皮黃芩為梅 胸滿痰多加瓜蒌仁 氣促喘嗽加知母貝

母肺寒咳嗽加五味乾薑 心下痞悶煩熱嘈雜惡心或停酒不散加薑炒黃連枳實乾葛陳皮倍用之 鼻衄加烏梅

麥門冬白茅根 心盛發熱加些胡黃芩 頭痛加川芎細辛 咳嗽吐血加升麻牡丹皮生地黃 肺熱咳嗽久不愈

加知母貝母麥門冬 見血加阿膠生地黃烏梅赤芍牡丹皮 吐血痰嗽加四物湯白茯苓補心湯 妊娠傷寒去半

夏加香附

一論上氣喘逆咽喉不利痰滯咳嗽口舌乾渴 三母清順湯 天門冬 去心 麥門冬 去心 知母 蜜湯浸 貝母 甘草

錢 人參 當歸身錢 枯芩錢 元參錢 山梔子錢 桔梗錢 天花粉錢 薄荷 生甘草 右判水

煎服 清熱宣嗽化痰定喘丸 橘紅錢 青黛錢 貝母錢 胆星兩 天花粉錢 桑白皮錢 杏仁 去皮 桔梗

錢 黃芩錢 前胡錢 甘草錢 右為細末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸淡薑湯化下

一論痰嗽服前方不効者多屬氣血虛弱四肢沉困宜八物湯加黃柏知母貝母門冬五味瓜蒌紫蘇陳皮等分姜棗煎服

一論咳嗽早間吐痰甚多夜間喘急不寐然早間多痰乃脾虛飲食所化夜間喘急乃肺虛陰火上冲以後方服之 補中

益氣湯 內傷依本方加麥門冬五味子 六味地黃丸 補益依本方加麥門冬五味子

一論傷風寒鼻流清涕寒禁噴嚏此脾肺氣虛不能實腠理以補中益氣湯主之

一論咳嗽面白鼻流清涕此脾肺虛而兼外邪補中益氣湯加茯苓半夏五味而愈

一論咳嗽吐痰失音聲啞此元氣虛弱而致也 補中益氣湯加黃柏知母天門冬麥門冬五味杏仁黃芩瓜蒌仁

一論咳嗽吐痰手足時冷此脾肺虛寒以補中益氣湯加泡薑半夏

一論聲音不出用新槐花不拘多少瓦上燉火炒焦置懷中補中時時將一二粒口中咀嚼咽之使喉中常有味久自出聲

一治語言不出用真蘇子錢 訶子錢 杏仁 百藥煎 右為末每服二錢熱酒調服

一治久嗽語音不出 訶子去核 杏仁 泡去皮 通草二錢 右判每服四錢煨姜五片水煎食後溫服

一論年老人日久咳嗽不能臥者多年不愈用猪板油四兩蜂窠四兩米糖四兩右三味熬化成膏時時刻刻挑一匙口中

噙化三五日其嗽即止

一論久年咳嗽吐痰銀杏膏陳細茶四兩厚四兩白果肉四兩一半去紅膜搗爛核桃肉四兩蜂蜜半斤右藥入鍋內

煉成膏不拘時服

一治久嗽不瘥并虛勞喘嗽紫苑去土款冬花各二兩百部錢五錢右為末每服三錢生薑三片烏梅一個煎湯調下食

後臨臥各一服

一論久嗽并連嗽四五十聲者用連皮生薑自然汁一斗加白蜜三茶匙同于茶碗內煎一滾溫服三四次即止

一切咳嗽上氣者一道士專賣此藥不拘新久皆效乾姜桂心紫色羊皮桂心去皮小兒英泡去皮子肥右三味並另搗下篩

了各秤分兩和合後更搗師一遍煉白蜜搜和久搗一二千杵為丸如梧桐子大每服三九不限食之先後嗽發即服日

進三五服忌食蒜油膩麪物

一論年久近日咳嗽喘急等症神吸散國子博士顏心吾傳鵝管石大煨好醋淬七次一錢餘糧石大煨醋一錢官桂

分三粉草分三枯白礬分五石膏分五款冬花分五右為細末每服三分二厘準秤至夜食後靜坐片時將藥放紙

上以竹筒五寸長直插喉內用力吸藥嗽亦不怕吸藥令盡為度以細茶一口漱而咽之忌雞魚羊鵝一切動風發物并

生冷諸物惟食白煮猪肉雞子戒三七日宜用公猪肺一副加肉半斤梔子一歲一個炒成炭桑白皮不拘多少用之

全炒至熟爛去藥至五更病人不要開口言語令人將湯肺喂之病人嚼吃任用餘者過時再食効

一論久嗽痰喘百藥不効并年久不瘥者或能飲酒人久嗽尤効清金膏曲草令孔桂甯傳天門冬去心麥門冬

去心貝母四兩杏仁四兩半夏姜製右五味切片水熬去渣取其汁入白葛粉末四兩蜜一斤共煎汁入罈內

重湯煮一日成膏取出每日無時頻服之

一小時唾痰涎內熱作渴肢體倦怠勞而足熱用清氣化痰甚余曰此腎水泛而為痰法當補腎不信另進痰痰凡一服

吐瀉不止飲食不入頭暈眼閉始信余用六君子湯數劑胃氣漸復却用六味丸月餘諸症悉愈

一咳嗽氣喘鼻流涕余用參蘇飲劑以散寒邪更用補中益氣以資腠理而愈後因勞怒仍作自用前飲益甚加

黃連枳實腹脹不食小便短少。陳思前症愈劇小便不通。余曰腹脹不食胃虛也。小便短少肺腎虛也。悉因攻伐所致。投以六君子加黃芪炮姜五味。二劑諸症頓退。再用補中益氣加炮姜五味。數劑全愈。

●喘急

一治咳嗽秘方。款冬花錢三石膏錢二。研砂七。甘草錢三。右為末吹入喉內。用細茶漱下即好。

脈滑而手足溫者生。脈沉澀而四肢寒者死。數者亦死。為其形損故也。肺受邪則喘。手太陰肺專主外感。無汗而喘屬表。

凡久喘未發。扶正氣為要。已發攻邪為主。大槩喘急甚者不可使用苦藥。火氣盛故也。

一論外邪在表無汗而喘者。五虎湯。麻黃錢三杏仁三錢。石膏錢五甘草錢。細茶錢。有痰加二陳湯。右劉。

一劑生薑蔥水煎熱服。加桑白皮一錢尤良。

一論在裏邪實不便脈實而喘者。三乙承氣湯。大黃芒硝厚朴枳實甘草加水香。檳榔。右劉生薑三片水煎熱服。

一論痰盛而喘者。此治痰喘不能臥人扶而坐數日。一服而安。千緡道痰湯。南星錢一。半夏七箇。水四分。赤茯苓錢一。枳殼錢一。皮一錢。炙甘草一寸。右劉生薑一指。火水煎服。

一論七情鬱上氣而喘者。用四磨湯。人參檳榔沉香烏藥。右四味各用水磨汁。合一處溫服之。三子湯。

治氣喘如神。蘇子白芥子蘿蔔子水煎服立愈。

一論腹脹氣喘坐臥不得者。宜服沉香散。沉香半錢木香半錢。枳殼錢三。蘿蔔子錢三。右劉一劑。生薑三片。水煎溫服。

一論喘急因內傷元氣。氣不接續而喘者。宜用補中益氣湯。方見。

一論陰虛火動。火炎上攻而喘者。宜此清離滋坎湯。方見。一用六味丸。加黃柏知母亦効。

一論虛陽上攻。氣不升降。上盛下虛。痰涎壅盛。喘促短氣。咳嗽而喘者。蘇子降氣湯。蘇子錢一。陳皮厚朴姜汁炒。

前胡肉桂各二。半夏姜汁炒。當歸錢三。甘草錢。右劉生薑煎服。

曾補壽世保元

卷三

喘急

喘急

一論一人痰嗽氣喘宜服三子養親湯白芥子研八分蘿蔔子研八分蘇子研八分南星水炮八分半夏水炮八分陳皮水炮八分

六枳實炒六分片苓法炒八分赤茯苓去皮八分甘草二分右對一劑生薑三片水煎溫服

一人體肥善飽仲秋痰喘用二陳苓連益甚如桑皮杏仁盜汗氣促加貝母枳壳不時發熱予以為脾肺虛寒用八味丸以補上母補中益氣湯接補中氣八味丸見補湯

哮喘

脉大抵脉浮而滑易治微細而濡難治

天哮喘以聲響鳴喉中如水雞聲者是也專主手痰宜用吐法亦有虛而不可吐者治之有以紫金丹導痰小胃丹劫之而愈者有以六味地黃丸補中益氣湯兼進而愈者必須量虛實而治之也千金定喘湯治哮喘喘如神麻黃龍

桑白皮蜜炙三錢杏仁一錢五分蘇子二錢白果炒二十個款冬花三錢黃芩一錢五分半夏甘草甘草錢右對白水煎

食遠服諸病原來有藥方唯愁喘喘最難當麻黃桑杏尋蘇子白果冬花更久良甘草黃芩同半夏水

煎百沸不須姜病人遇此仙方藥服後方知定喘湯

一論人素有喘急遇寒暄不寧發則不已哮喘夜不能睡者用此蘇沉九寶湯紫蘇薄荷麻黃杏仁去皮桑

白皮大腹皮官桂甘草右對用生薑三片烏梅一個水二碗煎至八分食後服即効且住服惟慎勞碌戒厚味

節慾日間常服些順氣化痰丸夜卧時服抑火潤下丸如除根須修合六味地黃丸加黃柏知母人參紫苑五味子百合各

二兩浮小麥粉熟蜜四兩打糊為丸每服百丸空心柿餅湯送下餅隨食之二母丸治哮喘知母去皮毛貝母

去心百藥煎一兩右為細末將烏梅肉煮熟搗爛為丸如梧子大每服三十丸臨卧或食後連皮姜湯送下

一論喘氣哮喘上喘不休或是盜戲水創肺竅俗謂之喘氣病用此秘方小薊草一把用猪精肉四兩入水同煨令熟

食肉并湯立已其草三月生七八月有四稜葉葉大秋有花子

一論凡遇天氣欲作雨者便發喘喘其至坐卧不得飲食不進此乃肺竅中積有冷痰乘天陰寒氣從背自鼻而入則肺脹

作聲此病有苦至終身者亦有子母相作者每發即服不過七八次覺痰腥臭吐出白色是絕其根也用此方紫金丹

白矾一錢枯白礬三錢淡豆豉出江西者二兩水浸去皮蒸右搗作丸如桑豆大但覺舉發用冷茶送下七丸甚

另研如泥散加一位和合

者九以不喘為愈再不必多增丸數慎之小兒服一二丸導痰小胃丹方見治哮喘經年不愈宜久久服之斷根

一論哮喘氣急而不得息者宜用均氣八仙湯麻黃錢杏仁錢石膏錢桔梗錢黃芩錢知母錢貝母錢

用北細辛三錢生甘草錢右剉一劑水煎溫服

一治上氣喘急經年咳嗽動輒久不愈遇發即服服三五次永不復發奪命丹人言錢白礬錢白附子錢南星

錢半夏錢五右先用人言與白礬一處于石器內火煨紅出火黃色為度切不可犯鐵器卻和半夏南星白附子末

生薑汁煮烱糊為丸黍米大朱砂為衣每服七丸小兒三丸井水化下忌食熱物哮喘靈秘丹上方異人傳胆南

星雨大半夏二兩用白礬五錢牙兒五赤茯苓二兩黃芩二兩大貝母二兩沉香一兩青礬石五錢天竺黃

錢珍珠三錢豆錢同煨一夜不見白星烏犀角錢白礬一兩礬砂一兩風化硝鈎花蕊石五錢孩兒茶五錢款冬

花雨鉛白霜錢右為細末煉蜜為丸如梧子大每服三十九臨臥淡姜湯下外製六味地黃丸空心服百發百中

真仙方也

一治素患哮喘之疾發則喘急痰嗽上壅不時舉發令慎勞役戒厚味節飲早服六味丸加黃柏知母人參紫苑五味百

合各二兩浮小麥粉蜜四兩打糊為丸每服百九空心柿餅湯下解隨食之夜卧時服後方各一料而愈千金定喘丸

南星半夏各四兩用生薑牙兒各三兩煎湯浸星半一宿切片再加白貝母枳實麩炒黃連炒黃芩酒連

翹法白附子天麻殭蠶炒桔梗瓜蒌各一錦紋大黃酒拌九蒸青礬石用硝礬如金沉香錢右為

細末竹瀝姜汁和為丸如彈子大每服一丸臨卧口嚥化下或丸如黍米大姜湯下亦可

一人哮喘十數年發則上氣喘促咳嗽吐痰自汗四肢發冷六脉沉細此氣虛脾弱黃芪蜜水人參白朮去白朮

苓桂半夏杏仁五味子麥門冬天門冬法陳皮甘草右剉姜棗煎服

一人自幼患哮喘之病每逢寒即發發則上氣喘急咳嗽痰涎上壅年久不已成痼疾百藥罔効予製此方一料全愈清

上補下丸懷生地黃炒鍋內酒拌南棗酒蒸去懷山藥白茯苓去皮牡丹皮兩五錢澤瀉一兩連五

五味子五錢天門冬去心麥門冬去心一枳實兩錢貝母五錢桔梗兩錢黃連兩錢杏仁錢

一兩半夏兩錢五錢枳實兩錢一瓜蒌仁去油一甘草錢右為細末煉蜜為丸如梧子大每服三錢空心

五錢半夏兩錢五錢枳實兩錢一瓜蒌仁去油一甘草錢右為細末煉蜜為丸如梧子大每服三錢空心

曾甫壽世系

淡姜湯送下

○瘧疾

脉弦數滑實皆順沉細虛浮為逆○瘧脉自弦微則為虛代散則死

瘧病皆因先傷于暑後感于風客于榮衛之間腠理不密復遇風寒閉而不出舍于腸胃之外與榮衛並行晝行于陽夜行于陰並則病作離則病止併于陽則熱併于陰則寒淺則日作深則間日在氣則早在血則是按本經曰瘧脉自弦弦數者多自熱弦遲者多寒弦短者傷食弦滑者多痰弦而緊者宜下浮大者宜吐弦遲者宜溫此治瘧之大法其病熱多寒少心煩少睡者屬心名曰溫瘧用柴姜湯但寒少熱腰痠足冷者屬腎名曰寒瘧用桂附二陳湯先寒而後大熱咳嗽者屬肺名曰癰瘧用參蘇飲熱長寒短筋脉拘束者屬肝名曰風瘧用小柴胡湯加烏藥香附寒熱相傳嘔吐痰沫者屬脾名曰食瘧用消脾飲瘧愈之後陰陽兩虛夢遺咳嗽不善保養遂成癆瘵若能清心養體節食避風如此調治無不愈矣

一論瘧疾無汗要發汗散邪為主大凡瘧疾初起宜服此發散出汗立愈用此方 散邪方 川芎 白芷 麻黃 白芍 防風 荆芥 紫蘇 羌活 甘草 右劉生姜三斤葱白三根水煎露一宿次早溫服○有痰加陳皮有濕加蒼朮○夾食加香附

一論瘧疾有汗要無汗正氣為主宜用 正氣湯 柴胡 前胡 川芎 白芷 半夏 麥門冬 檳榔 草果 青皮 茯苓 桂枝 甘草 右劉姜蜜煎預先熱服

一論瘧疾不論先寒後熱先熱後寒諸瘧通用 清脾飲 青皮 蘇 厚朴 薑 白朮 蘇 半夏 柴胡 黃芩 茯苓 草果 甘草 右劉生姜五片水煎溫服

一論諸瘧寒熱交作陰陽不分口乾發渴小便赤澀或作吐瀉用 加減柴姜湯 柴胡 黃芩 半夏 蘇 澤瀉 蒼朮 厚朴 檳榔 草果 烏梅 甘草 右劉姜蜜煎服

一論五臟氣虛喜忘不節致陰陽相勝結聚涎飲與衛氣相搏發為瘧疾并治諸瘧 四獸湯 人參 白朮 蘇 白茯苓 苓朮 橘紅 半夏 草果仁 烏梅 甘草 生薑 棗子 右劉以鹽少許淹食項用皮紙裹甚厚以水

濕之慢火炮令香熟焙乾每服一兩水一碗煎半碗溫服水熱前連進數服神效

一論平素不足兼以勞役內傷極感寒暑以致瘧疾寒熱交作肢體倦怠乏力少氣或瘧發經年不愈則氣血皆虛瘧邪深入名曰瘧疾此方主之加味補中益氣湯黃芪蜜炒人參蜜炒白朮蜜炒陳皮蜜炒當歸蜜炒柴胡

錢一升麻蜜炒白芍蜜炒黃芩錢半夏蜜炒甘草蜜炒右對姜棗煎空心服有汗加桂枝五分倍黃芪熱盛倍柴胡黃芩湯加麥門冬天花粉

一治傷暑發瘧宜服香薷散香薷錢厚朴蜜炒扁豆錢一烏梅錢右水煎臨熟入姜汁一匙溫服

一論熱瘧火盛舌卷焦黑鼻如烟色六脉弦洪而緊此乃陽毒犯源先以青布扎脅數重新汲水浸之搭于胸上須臾再易如此三次熱勢稍退即服此藥龍虎湯柴胡蜜炒黃芩蜜炒半夏蜜炒石膏蜜炒知母錢黃連蜜炒黃柏蜜炒梔子蜜炒粳米蜜炒右對姜棗煎服

一治瘧瘧大熱煩燥宜用地龍飲子生地龍蜜炒三條入生姜汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調和服如熱加龍腦少許

一治虛弱之人患瘧初感寒者宜五積散依本方用姜棗煎服方見中寒

一論體虛之人患瘧寒多欠不愈者不可用截藥宜用分利順元散川烏蜜炒附子蜜炒南星蜜炒木香蜜炒右對每服四錢生薑十片棗七枚水一碗煎七分當發早晨連進三服半生半熟能分解陰陽也

一論諸瘧不問寒後熱或先熱後寒或寒熱交作或連日并發或間日一發頭眩惡心煩渴引飲氣息喘急苦咽乾諸藥不效者宜服此散常山飲子常山錢草果蜜炒知母錢良姜錢一烏梅錢甘草錢一右對

一兩一劑棗五個未發時前連進二服

一論瘧疾夜發者乃陰經有邪此散血中之風寒也宜此麻黃桂枝湯麻黃蜜炒桂枝錢黃芩錢桃仁蜜炒甘草錢三右對水煎服桃仁散血煖肝之藥

一久瘧腹中有癰用水磨沉香下雄黃解毒丸打下黑血如泥極具是其驗也方見通治

一海外高僧傳于周少峰治瘧疾不問新久虛實寒熱諸般鬼瘧邪瘧溫瘧瘧瘧一服立愈其效如神番木鱉蜜炒子去壳

色炒至黑
即愈

雄黃錢一 硃砂錢一 甘草錢一 磨共為細末 每服四分 其瘡將發 預先吃飯一碗 將藥水酒調服 被蓋固

一治瘡先寒後熱 熱多寒少 或單熱不寒者 桂枝錢五 石膏兩一 知母一兩 黃芩一兩 右剉水煎服

一治瘡疾服藥轉加寒熱者 知太陽陽明少陽三陽合病也 小柴胡湯加石膏知母桂枝水煎服

一治久瘡不能食 胸中鬱鬱欲吐而不吐 以此吐之 雄黃 甜瓜蒂 赤小豆等 右為末 每服五分 溫水調下 以吐為度

一論久瘡積成癰癤 在胸膈之間 諸藥不愈者 宜 瘡瘡飲 蒼朮 蘇合 草果 去 桔梗 青皮 陳皮 良姜 錢五

白芷 白茯苓 半夏 湯泡 桔壳 錢炒 桂心 蘇葉 乾姜 炮 川芎 錢 甘草 錢二 右每服一兩 水煎入鹽

少許 空心服

一治久瘡腹中痞塊 用 阿魏丸 鱉甲 醋炙 三棱 醋浸 莪朮 醋浸 香附子 米泔浸各 陳皮 真阿魏 右為末

醋糊為丸 梧桐子大 每服三十丸 淡姜湯送下

一論瘡疾一日一發 或二日一發 或三五日一發 或經三兩月 或半年一載 或誤用止截太過 久不能愈者 此元氣脾胃太

虛 以補中益氣湯 內傷 依本方加常山 檳榔 知母 貝母 一二劑自効 已愈後去四味 只用本方調理 多服自然正氣

盛 邪氣自退矣

一論患瘡寒熱用截之劑 反發熱 寒飲食少 思神思昏倦 脉或浮洪 或微細 此陽氣虛寒 以補中益氣湯 內傷 依本方加

參 芪 歸 朮 各用三錢 甘草一錢 五分 加炒乾姜 炮附子 各一錢 一劑寒熱止 數劑元氣復

一論經年久瘡 氣血俱虛 而三日五日一發者 以十全大補湯 內傷 依本方蓋邪氣在陽分 淺而易治 邪氣在陰分 深而

難治 宜多服為良

一治三年久瘡不瘥 用揀參 乾生薑 各五錢 酒調服 汗出立止

一凡瘡後形體骨立 發熱惡寒 食少體虛 補中益氣 內參 芪 歸 朮 各加二錢 甘草一錢 五分 炮姜二錢 一劑而寒熱止 數

劑而元氣復

一婦人瘧久不已發後口乾倦甚用七味白朮散加麥門冬五味作大劑煎與溫飲再發稍用補中益氣加茯苓半夏十餘劑而愈凡截瘧余常以參朮各一兩生薑四兩煨煨熟煎服即止或以大劑補中益氣加煨姜尤効生薑一味亦効一凡久瘧多屬元氣虛寒蓋氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火下流則寒熱交作或吐涎不食戰慄泄瀉手足厥冷皆脾胃虛弱且補益氣諸症悉愈若手足厥冷加大附子一婦人久患瘧瘧作則經不行形虛脉大頭痛懶食大便泄瀉小便淋瀝口乾唇裂內熱腹脹蓋因久瘧正氣已虛陰火獨旺以益氣湯治之尋愈惟不時頭疼加蔓荊子而止又兼服六味丸而經行

○痢疾

脉宜微小不宜浮滑大不宜弦急身寒則生身熱則死

痢者名之滯下是也多由感受風寒暑濕之氣及飲食不節有傷脾胃宿積鬱結而成也其症大便窘迫裏急後重數至圓而不能使腹中疼痛所下或白或赤或赤白相雜或下鮮血或如豆汁或如魚腦膿血相雜或如屋漏水此為感之有輕重積之有淺深也其濕熱滯積于血分則赤積于氣分則白赤血兼下氣血俱受邪也雖有赤白二色終無寒熱之分通作濕熱治之但分新久更量元氣用藥凡痢初起元氣未虛必須下之下後未愈隨症調之痢稍久者不可下胃氣故也痢多屬熱亦有虛與寒者虛者宜補寒者宜溫年老及虛弱人不宜下大便秘了而不了者血虛也數至圓而不便者氣虛也○丹溪曰痢亦屬血自小腸來白屬氣自大腸來

○下痢

下如魚腦半生半死○下若屋漏水者必亡○下若塵腐色者必死○下純黑者死○下如竹筒直出者死○下純紅者難治身熱脉大者必死是亦大堅言之耳小便絕不通為胃絕○鎮國將軍凡治痢之總司也○錦紋好大黃一斤切薄片分作四處聽用○一分用川黃連去毛一兩切片水浸汁拌大黃同炒乾為度○一分用吳茱萸去梗一兩用水泡出汁大黃同炒乾為度○一分用人乳汁浸拌大黃炒乾為度○一分用童便浸大黃炒乾為度○右四分共合一處為細末酒打米糊為丸如梧桐子大將一半三蒸三晒將一分晒乾各包聽用○如白痢用吳茱萸煎湯送下三十九丸半生半熟○如赤痢用黃連煎湯送下三十九丸半生半熟○如赤白痢用吳茱萸黃連煎湯送下三十九丸半生半熟

一論赤白痢疾初起積滯不行裏急後重頻登圜而去小腹脹等症宜先用此下之香連化滯湯當歸尾錢白芍半錢黃連一錢黃芩一錢黃柏一錢枳殼一錢五分檳榔錢木香錢大黃三錢人參半錢滑石二錢甘草分右對水煎空心熱服

一論下痢白多不拘新久或用前藥下後未愈者用此和之白木和中湯當歸酒洗白芍土炒白木去蘆土炒白茯苓

一論下痢紅多不拘新久或用前藥下後未愈者用此調之當歸調血湯當歸二錢川芎錢白芍錢黃連錢

黃芩錢桃仁去皮另研一錢升麻五分右對一劑水煎空心服如白痢加吳茱萸炒一錢芩連酒炒赤白痢加白木扶

芩陳皮香附各一錢

一治赤痢血痢痛不可忍又治血痔其效如神病雖垂殆一服即愈逐瘀湯阿膠炒枳殼錢扶苓扶神白芷

川芎赤芍生地黄義木通五靈脂炒生甘草錢桃仁去皮大黃右對一劑水一鍾半入蜜三

匙再煎溫服

一治素有積熱下痢白膿腹痛膨脹晝夜無度漸至大便閉結小便不通此三焦有實熱也服此即愈或下痢純紅或赤白

相雜皆效清臟解毒湯黃連黃芩黃柏梔子大黃連翹滑石木通車前子海金沙枳實

義木右對水煎空心服

一治脾泄瀉痢疾屬氣虛宜此加味六君子湯人參白朮去蘆白茯苓去皮黃芪錢一懷山藥錢砂仁研一

甘草五右對一劑水煎三枚水煎空心溫服如腹痛加炒黑乾姜木香各五分烏梅二箇

一論下痢赤白膿血相雜腹痛裏急後重晝夜無度日久不愈不能起床不思飲食疲倦之甚或服寒涼峻利之過者宜加

減補中益氣湯方見內傷依本方去柴胡加白芍炒澤瀉木香砂仁白豆蔻地榆御米壳醋炒三分

一論曾經服推滯藥過多又服攻劫殺伐等他醫而不效者以致形氣極弱去無休息積久惡候出者並與救之養臟復

元湯人參錢三白朮去蘆錢半白茯苓去皮白豆蔻去殼研乾姜炒錢一粟壳去蘆炒製附子五烏梅仁

木香一錢甘草炒五右對一劑北棗三枚水煎空心溫服渣再煎服謹節飲食

一論噤口痢其症有冷有熱有冷熱不調皆須先發散表裏如手心熱目赤是熱宜敗毒散加陳米煎服如手心冷及純下白痢者是寒宜用蓮肉不去心為末用米飲調服三錢。敗毒散方見又治疫痢發熱合境皆然者神效加白芍黃連尤效。

一治虛弱之人噤口痢飲食不下 參苓白朮散方見 依本方加石蓮肉石菖蒲各一兩或有氣加木香五錢 右共為末每服二錢東湯調下。噤口痢粃米湯下。休息痢砂糖湯下。

一治下痢諸藥不效者以醋酒半盞姜汁半盞倉米湯半盞三味合一處入陳乾松菜一撮揉爛一併食之胃口立開如口不開用欬助撥開牙齒灌下立已。

一治噤口藥食俱不受用 田螺數枚連壳搗爛入麝少許調勻填滿臍內引熱下降服藥再不吐矣。

一治噤口痢食不下 老倉米炒香熟為末淮鹽炙熨每米分三四匙鹽少許白滾水下。

一治下痢噤口點眼方 黃芩江傳 用首胎真炙乾每一錢加雄黃一分胡黃連四分片腦少許共為細末羅點兩眼角。

一治下痢噤口胡養恒傳 用雞一隻去毛真切片入罐內用胡椒末五錢入水同炊用皮紙重重密封待熟用簪子刺孔令患痢人鼻孔聞之即立時思食。

一治下痢噤口 傳明坡傳 用首胎真磁器收入水銀養住入麝少許點眼角即能食。

一治下痢噤口飲食不下多是胃氣熱甚用黃連錢人參五錢甘草各一錢一方加石蓮肉各二右用水煎終日呷之如吐再強飲但得一呷下咽便好。又方以秤槌燒紅用好醋淋令病人開口吸氣吞之即效。

一治痢疾發飽益元散用人參白朮煎湯調下頻復即止。

一治久痢休息不止百方不效用黃連末木香末十分之一豬臟頭去油入藥水煮爛搗為丸如梧子大每服五丸空心米湯下。

一人年老久痢不止肌瘦如柴晝夜苦楚命已垂危用人參一兩水煎服之鼻有微汗而甦後用十全大補湯調理愈。

一人下痢小腹急痛大便欲去不去此脾胃氣虛而不墮也用桶中蒸氣送八味丸二劑而愈此等症候因利藥致損元氣腫脹肢體而死者不可枚舉。

一人停食患痢腹痛下墜或用疎導之劑兩足腫脹食少體倦煩熱作渴脉洪數按之微細予以六君子加姜桂各三錢吳茱萸五味各一錢煎熟冷服之即睡覺而諸症退再劑全安此假熱而治以假寒也

一人嘔吐不食腹痛後重自用大黃等藥一劑腹痛益甚自汗發熱昏憒脉大予用參朮各一兩炙甘草炮乾姜各三錢升麻一錢水煎一服而愈又用補中益氣湯加炮乾姜二劑而愈

一人痢後兩足浮腫胸腹脹滿小便短少用分利之劑偏身腫脹氣喘予白兩足浮腫脾氣下陷也胸腹脹滿脾虛作痞也小便短少肺不能生腎也身腫氣喘而脾能生肺也用補中益氣湯加大附子而愈半載後因飲食勞倦兩足浮腫小便短少仍腹前藥頓愈

一人下血服犀角地黃湯等藥其血愈多形體消瘦發熱之食裏急後重脾氣下陷余用補中益氣加炮姜一劑而愈一人患痢後重自知醫用芍藥湯後重益甚飲食少思腹裏肢冷予以為脾胃虧損用六君子湯加木香炮姜三劑而愈

●泄瀉

脉多沉傷于風則浮傷于寒則沉細傷于暑則沉微傷于濕則沉緩澀而腹脹脉弦者死又云脉緩時微小者生浮大數者死

夫泄瀉屬溫屬氣虛有火有痰有食積有寒有脾泄有腎泄凡瀉水腹不痛者濕也飲食入胃不住完穀不化者氣虛也腹痛瀉水如熱湯痛一陣瀉一陣者大也或瀉或不瀉或多或少者痰也腹痛甚而泄瀉瀉後痛減者食積也肚腹痛四肢冷者寒也常常泄瀉者脾泄也五更泄者腎泄也宜分別而治也大概泄瀉因食傷其脾者居多以胃苓湯加減主之

一論中暑傷濕停飲食夾脾胃不和腹痛泄瀉作渴小便不利水穀不化陰陽不分者濕也胃苓湯主方蒼朮

厚朴

炒姜汁

陳皮

猪苓

澤瀉

白朮

去蘆炒

白茯苓

一錢

白芍

炒一錢

肉桂

甘草

三分

劑主姜三片棗二枚水煎溫服泄瀉稍久加升麻防風有熱者加酒炒黃連有寒者加炒乾姜暴泄水瀉加滑石

食積加山楂神曲有痰加半夏烏梅氣虛加人參白朮氣喘加木香久瀉加乾姜肉蔻暴痢赤白相雜腹痛裏急後重去桂加檳榔木香黃連水煎服

一論泄瀉飲食入胃不住完穀不化者氣虛也益氣健脾湯人參白朮去蘆白茯苓陳皮白芍炒蒼朮