

吳又可先生原本

醫門普度

天德堂梓

原序

夫溫疫之爲病非風非寒非暑非濕乃天地間別有一種
異氣所感其傳有九此治疫緊要關節奈何自古迄今從
未有發明者仲景雖有傷寒論然其法始自太陽或傳陽
明或傳少陽或三陽竟自傳裏蓋爲外感風寒而設故其
傳法與溫疫自是迥別嗣後論之者紛紛不止數十家皆
以傷寒爲辭其於溫疫證則甚畧之是以業醫者所記所
誦連篇累牘俱係傷寒及其臨證悉是溫疫求其真傷寒
百無一二不知屠龍之藝雖成而無所施未免指鹿爲馬
矣余初接諸家咸謂春夏秋皆是溫病而傷寒必在冬時

然歷年較之溫疫四時皆有及究傷寒每至嚴寒雖有頭
疼身痛惡寒無汗發熱總似太陽證至六七日失治未嘗
傳經每用發散之劑一汗而解間有不藥亦自解者並未
嘗因失汗以致發黃譫語狂亂胎刺等證此皆感冒膚淺
之病非真傷寒也傷寒感冒均係風寒不無輕重之殊究
竟感冒居多傷寒希有況溫疫與傷寒感受有霄壤之隔
今鹿馬攸分益見傷寒世所絕少仲景以傷寒爲急病倉
卒失治多致傷生因立論以濟天下後世用心可謂仁矣
然傷寒與溫疫均急病也以病之少者尙諄諄告世至於
溫疫多於傷寒百倍安忍反置勿論或謂溫疫之症仲景

原別有方論歷年既久兵火湮沒卽傷寒論乃稱散亡之
餘王叔和立方造論謬稱全書溫疫之論未必不由散亡
也明矣崇禎辛巳疫氣流行山東浙省南北兩直感者尤
多至五六月益甚或至闔門傳染始發之際時師誤以傷
寒法治之未嘗覓其不始也或病家誤聽七日當自愈不
爾十四日必瘳因而失治有不及期而死者或有妄用峻
劑攻補失叙而死者或遇醫家見解不到心疑胆怯以急
病用緩藥雖不卽受其害然遷延而致死比比皆是感之
輕者尙獲僥倖感之重者更加失治枉死不可勝紀嗟乎
守古法不合今病以今病簡古書原無明論是以投劑不

效醫者徬皇無措病者日近危篤病愈急投藥愈亂不死
於病乃死於醫不死於醫乃死於聖經之遺亡也吁千載
以來何生民不幸如此余雖固陋靜心窮理格其所感之
氣所入之門所受之處及其傳變之體平日所用歷驗方
法詳述於左以俟高明者正之

時

崇禎壬午仲秋洞庭吳有性書於淡漠齋

重訂醫門普度溫疫論凡例

一是編議論精詳治法大條實發前人所未逮
公評語多執已見易滋後學疑惑微友龔君育和力
爲矯之遂使原文炳如日星洵吳先生功臣也

一是編論溫疫與治傷寒不同上卷有原病及辨明傷
寒時疫數條下卷有雜氣論及正名傷寒正誤諸家
溫疫論正誤又劉宏璧集補方及各家治案俱宜潛
玩今卷帙較繁分劉宏璧以下爲末卷共三卷

一治疫以脈証爲憑大約証以頭暈足軟胸悶胎刺日
晡病甚夜卧不安先凜也惡寒後發熱不惡寒及兼

三陽表証三陰裏証者是脉以數實有力右關更甚
或初不甚顯迨投達原飲然後見數實者是蓋疫本
熱邪猶賊膜原猶窩穢榔草菓猶捕快手厚朴猶刑
具知苓猶產出若硝黃則驅之走矣白芍甘草一謹
守門戶一調停衆人此又可先生立方之妙惟龔君
洞悉淵微故以方濟人卽以言闡理其言如布帛粟
菽尤堪輔翼前賢

一近人多誤讀傷寒脉緊句以緊爲數蓋緣傷寒論有
云緊無常也卽誤以無常爲至數之多不知緊與𦵏
類𦵏訓不移則有常緊訓無常則移動矣二三至而

緊者是遲而緊七八至而緊者是數而緊知緊不可
以混數斯知溫疫不可以混傷寒矣

一傷寒論有云數則爲虛此語原未盡善今人一見病
瘦脈數卽妄投耆朮附桂害人不少未始非爲虛一
語誤之也夫數未必卽虛也數而有力爲實數而無
力乃虛耳知數之未卽虛斯不爲前人所誤

一右尺脈與右關毗連右門洪數兼實右尺脈未有不
洪數者今人一遇是脈卽疑火不歸原投桂附以引
歸之抑思疫爲病熱桂附辛熱之劑是猶以火濟火
勢甚燎原曷其有極達原飲之用知母實爲穩當讀

者詳之

一是書得龔論曲暢其旨毫無疑義其夾虛夾實之人
又有攻補兼施之妙所謂百變而不失其宗者是也
同人咸勸付梓以公諸世且與輸資焉書成因付各
捐姓名於左

道光壬辰八月李硯莊謹識

重訂醫門普度溫疫論卷上目次

原病

溫疫初起

傳變不常

急證急攻

表裏分傳

熱邪散漫

內壅不汗

下後脈浮

下後脈復沉

邪氣復聚

下後身反熱

下後脈反數

因證數攻

病愈結存

下格

注意逐邪勿拘結糞

畜血

發黃

邪在胸膈

辨明傷寒時疫

發斑戰汗合論

戰汗

自汗

狂汗

盜汗

發斑

數下亡陰

解後且養陰忌投參朮

用參宜忌有前和後害之不同

下後間服緩劑

下後反痞

下後反嘔

奪液無汗

補瀉兼施

藥煩

停藥

虛煩似狂

神虛謔語

奪氣不語

老少異治

妄投破氣藥論

妄投補劑論

妄投寒涼藥論

大便

小便

前後虛實

脈厥

脈證不應

體厥

乘除

明吳又可先生溫疫論醫門普度卷上

孔毓禮

以立

評

昭陵

龔紹林加評

黎水楊大任

占儀

全校

李硯莊重訂

陳元

節菴

原病

病疫之由。昔以爲非其時有其氣。春應溫而反寒。夏應熱而反涼。秋應涼而反熱。冬應寒而反溫。得非時之氣。長幼病似以爲疫。余論其不然。夫寒熱溫涼。乃四時之常。因風雨陰晴。稍爲損益。如秋晴多熱。春雨多寒。亦天地之常事。未必爲疫也。傷寒與中暑。感天地之常氣。疫者。感天地之

厲氣在歲有多寡在方隅有厚薄在四時有盛衰此氣之
來無論老少強弱觸者卽病邪自口鼻入舍於伏膺之內
日惟自口鼻而入所以感疫者或重似傷寒或輕若虛
勞初起總是胸膈緊悶故凡遇病人脈數有力胸膈不
快或重似傷寒不可發散以虛其表或輕似虛勞不可
溫補以固其邪照後方加減用之萬治萬效

其邪去表不遠附近於胃乃表裏之分界卽鍼經所謂橫
連膜原是也邪在膜原正當經胃交關之所故爲半表半
裏其熱淫之氣如浮越於太陽則有頭項痛腰痛如折浮
越於陽明則有目痛眉稜骨痛鼻乾浮越於少陽則有脇

痛耳聾寒熱嘔而口苦。大概邪越太陽居多。陽明次之。少陽又其次也。邪之所着。有天受。有傳染。所感雖殊。其病則一。凡人口鼻之氣。通乎天氣。本氣充滿。邪不易入。適逢虧欠。外邪因而乘之。昔有三人。冒霧早行。空腹者死。飲酒者病。飽食者不病。疫邪所著。又何異耶。若其年氣爲厲。不論強弱。觸之卽病。則又不拘於此矣。其感之深者。中而卽發。感之淺者。邪不勝正。未能頓發。或遇飢飽勞碌。憂思氣怒。正氣被傷。邪氣始得張溢。營衛運行之機。乃爲之阻。

龔曰。深者一中卽發。爲害猶小。何者。初發如傷寒狀。醫縱昧爲疫。猶作傷寒治之。表劑不見效。至用三承氣時。亦

或獲愈。蓋治傷寒。與治疫邪。傳到胃。同一治也。至感之淺者。初不見甚病。及遇飢飽勞碌。憂思氣怒。或五心潮熱。或日晡熱甚。或足膝無力。或頭腰背疼。或心疼氣痛。或脇痛腰疼。或咳嗽吐血。或協熱下利。病者不知先感有疫。止述目前病狀。醫者不知先感有疫。止據現在病症。妄擬投劑。愈治愈劇。雖不卽死。必成痼疾。其爲害無底矣。急宜畱心此編。

由是人身之陽氣。因而屈曲。故爲病熱。其始也。格陽於內。不及於表。故先凜凜惡寒。甚則四肢厥逆。陽氣漸積。鬱極而通。則厥回而中外皆熱。至此但熱而不惡寒者。因其陽

氣之周也。此際應有汗。或反無汗者。邪結有輕重也。即使有汗。乃肌表之汗。若外感在經之邪。一汗而解。今邪在半表半裏。表雖有汗。徒損真氣。邪氣深伏。何能得解。必俟伏邪已潰。表氣潛行於內。乃作大戰。精氣自內。由膜原以達表。振戰止而復熱。此時表裏相通。故大汗淋漓。衣被濕透。邪從汗解。此名戰汗。當卽脉靜身涼。神清氣爽。劃然而愈。日此際應有汗句。非謂用藥表汗也。當此之際。其病將愈。應有汗。蓋溫疫汗解在後。傷寒汗解在前也。

然有自汗而解者。但出表爲順。卽不藥亦自愈也。伏邪未潰。所有之汗止。得衛氣暫通。熱雖暫減。逾時復熱。午後潮