

傳科全書

女科下

女科下卷目錄 共三十九條四十一症四十二方二法

妊娠

惡阻 順肝益氣湯

浮腫 加減補中益氣湯

少腹疼 安奠三天湯

口乾咽疼 潤燥安胎湯

吐瀉腹疼 援土固胎湯

子懸脇疼 解鬱湯

跌損 救損安胎湯

胎漏 助氣補漏湯

子鳴 扶氣止啼湯

腰腹疼渴汗燥狂即子狂 息焚安胎湯

中惡 消惡安胎湯

多怒墮胎利氣洩火湯

小產

行房不慎 固氣填精湯

跌閃 理氣散瘀湯

大便乾結 加減四物湯

畏寒腹疼 黃芪補氣湯

大怒 引氣歸血湯

難產

血虛 送子丹

交骨不開 降子湯

脚手先下 轉天湯

氣逆 舒氣湯

子死產門 救母湯

子死腹中 療兒散

正產

胞衣不下 逆胞湯 補中益氣湯

氣虛血暈 補氣解暈湯

血暈不語 刺眉心穴法 獨參湯
當歸補血湯

敗血攻心暈 安心湯

腸下 補氣升腸湯 草麻仁提法

產後

少腹疼 血瘀散結定疼湯 血虛腸寧湯

氣喘 救脫活母湯

惡寒身顫 十全大補湯

惡心嘔吐 溫腎止嘔湯

血崩 救敗求生湯

手傷胞胎淋漓不止 完胞湯

四肢浮腫 轉氣湯

內線出 兩收湯

肝痿 收膜湯

氣血兩虛乳汁不下 通乳丹

鬱結乳汁不通 通肝生乳湯

女科下卷

陽曲傅青主徵君手著

妊娠惡阻 三十九

婦人懷妊之後。惡心嘔吐。思酸解渴。見食憎惡。困倦欲卧。人皆曰妊娠惡阻也。誰知肝血太燥乎。夫婦人受妊。本於腎氣之旺也。腎旺是以攝精。然腎一受精而成。娠則腎水生胎。不暇化潤於五臟。而肝為腎之子。日食母氣以舒。一日無津液之養。則肝氣迫索。而腎水不能應。則肝益急。肝急則火動而逆也。肝氣既逆。是以嘔吐惡心之症生焉。嘔

亦有肝鬱氣滯
胸膈膨悶見食

不惡不能多食
雖係妊娠而非
惡阻宜分別治
之後另有方

吐縱不至太甚。而其傷氣則一也。氣既受傷。則肝血愈耗。世人用四物湯治胎前諸症者。正以其能生肝之血也。然補肝以生血。未為不佳。但生血而不知生氣。則脾胃衰微。不勝頻嘔。山恐氣虛。則血不易生也。故於平肝補血之中。加以健脾開胃之品。以生陽氣。則氣能生血。尤益胎氣耳。或疑氣逆而用補氣之藥。不益助其逆乎。不知妊娠惡阻。其逆不甚。且逆是因虛而逆。非因邪而逆也。因邪而逆者。助其氣則逆增。因虛而逆者。補其氣則逆轉。況補氣於補血之中。則陰足以制陽。又何慮其增逆乎。宜用順肝益氣。

湯

方極效但蘇子一兩疑是一錢

之誤然因初上

牙生人真賦最

壯或非用一兩

不效今當下元

用一錢可也

疏肝化滯湯全

當歸酒洗六錢

白芍酒炒三錢

党參去芦三錢

白扁豆去皮四

錢雲苓二錢香

附炒黑二錢砂

仁炒研錢半條

苓炒焦八分神

人參一兩

當歸一兩

酒洗

蘇子一兩

炒研

白朮三錢

土炒

茯苓二錢

熟地

五錢九蒸

白芍三錢

酒炒

麥冬三錢

去心

陳皮三分

砂仁一粒

炒研

神麴

一錢炒

水煎服

一劑輕

二劑平

三劑全

愈此方

平肝

則肝逆

除

補腎

則肝燥

息補氣

則血易

生凡胎

病而少

帶惡阻

者

俱以此

方投之

無不安

最有益

於胎婦

其功更

勝於四

物焉

物焉

妊娠浮腫四十

曲炒焦錢半廣
皮八分薄荷下

妊婦有至五個月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍
身頭面俱腫人以為濕氣使然也誰知是脾肺氣虛乎夫
妊娠雖有按月養胎之分其實不可拘於月數總以健脾
補肺為大綱蓋脾統血肺主氣胎非血不陰非氣不生脾
健則血旺而陰胎肺清而氣旺而生子苟肺衰則氣餒氣
餒則不能運氣於皮膚矣脾虛則血少血少則不能運血
於肢體矣氣與血兩虛脾與肺失職所以飲食難消精微
不化勢必至氣血下陷不能升舉而濕邪即乘其所虛之
處積而成浮腫症非由脾肺之氣血虛而然耶治法當清

白朮一味今多以蒼朮充之於白朮偽者更多白朮補胎蒼朮打胎用者宜審若恐其偽以白扁豆山藥代之較妥

其脾之血與肺之氣不必祛濕而濕自無不去之理方用加減補中益氣湯。

人參

五錢

黃芪

三錢 生用

柴胡

一錢

甘草

一分

當歸

三錢 酒洗

白朮

五錢 土炒

茯苓

一兩

升麻

三分

陳皮

三分

水煎服四劑即愈。十劑不再犯。夫補中益氣湯之立法也。原是升提脾肺之氣。似乎益氣而不補血。然而血非氣不生。是補氣即所以生血。觀當歸補血湯用黃芪為君。則較著彰明矣。况濕氣乘脾肺之虛而相犯。未便大補其血。恐陰太盛而招陰也。只補氣而助以利濕之品。

則氣升而水尤易散。血亦隨之而生矣。然則何以重用
茯苓而至一兩。不幾以利濕為君乎。嗟。濕症而不以
此藥為君。將以何者為君乎。况重用茯苓於補氣之中。
雖曰滲濕。而仍是健脾清肺之意。且凡利水之品。多是
耗氣之藥。而茯苓與參朮合。實補多於利。所以重用之。
以分濕邪。即以補氣血耳。

妊娠少腹疼 四十一

妊娠小腹作疼。胎動不安。如有下墮之狀。人只知帶脈無
力也。誰知是脾腎之虧乎。夫胞胎雖繫於帶脈。而帶脈實

關於脾腎。脾腎虧損。則帶脈無功。胞胎即無以勝任矣。況人之脾腎虧損者。非飲食之過傷。即色慾之太甚。脾腎虧則帶脈急。胞胎所以有下墜之狀也。然則胞胎之系。通於心與腎。而不通於脾。補腎可也。何故補脾。然脾為後天。腎為先天。脾非先天之氣。不能化。腎非後天之氣。不能生。補腎而不補脾。則腎之精。何以遽生也。是補後天之脾。正所以補先天之腎也。補先生二天之脾與腎。正所以固胞胎之氣與血。脾腎可不均補乎。方用安奠二天湯。

人參一兩。無力者以黨參代之。

人參一兩。

熟地一兩。

白朮一兩。

山藥五錢。

山萸五錢。

去核。

去核。

去核。

去核。

去核。

無上黨參者以
嫩黃芪代之

女科

炙草一錢

杜仲三錢

炒黑枸杞

二錢

扁豆五錢炒

去皮

水煎服一劑而疼止。二劑而胎安矣。夫胎動乃脾腎雙虧之症。非大用參朮熟地補陰補陽之品。斷不能挽回。於頃刻。世人往往畏用參朮。或少用以冀建功。所以寡效。此方正妙在多用也。

妊娠口乾咽痛 四十二

妊娠至三四個月。自覺口乾舌燥。咽喉微痛。無津以潤。以至胎動不安。甚則血流如經水。人以為火動之極也。誰知是水虧之甚乎。夫胎也者。本精與血之相結而成。逐月養

胎。古人每分經絡。其實均不離腎水之養。故腎水足而胎安。腎水虧而胎動。雖然。腎水又何能動胎。必腎經之火動而胎始不安耳。然而火之有餘。仍是水之不足。所以火炎而胎必動。補水則胎自安亦。既濟之義也。惟是腎水不能遽生。必須滋補肺金。潤則能生水。而水有逢源之樂矣。水既有本。則源泉混混矣。而火又何難制乎。再少加以清熱之品。則胎自無不安矣。方用潤燥安胎湯。

熟地

一兩

生地

三錢

山萸肉

五錢

麥冬

五錢

五味

二錢

炒

阿膠

二錢

蛤粉炒

黃芩

一錢

益母

二錢

方極妙用之立
應萬不可因
痛而加豆根射
子等藥亦不可

因過潤而加雲

苓

水煎服一劑而燥息。再二劑而胎安。連服十劑而胎不再動矣。此方專填腎中之精而兼補肺。然補肺仍是補腎之意。故腎經不乾燥。則火不能灼胎。焉有不安之理乎。

妊娠吐瀉腹疼 四十三

妊婦上吐下瀉。胎動欲墮。腹疼難忍。急不可緩。此脾胃虛極而然也。夫脾胃之氣虛。則胞胎無力。必有崩墜之虞。況又上吐下瀉。則脾與胃之氣。因吐瀉而愈虛。欲胞胎之無恙也得乎。然胞胎疼痛而究不至下墜者。何也。全賴腎氣。

白朮多傷肉桂
更無佳者用者
若有真偽固妙
如無真偽白朮
以白扁豆代之
肉桂以破故紙

之固也。胞胎繫於腎而連於心。腎氣固則交於心。其氣通
於胞胎。此胞胎之所以欲墜而不得也。且腎氣能固。則陰
火必來生脾。心氣能通。則心火必來援胃。脾胃雖虛而未
絕。則胞胎雖動而不墮。可不急救其脾胃乎。然脾胃當將
絕而未絕之時。只救脾胃而難遽生。更宜補其心腎之火。
使之生土。則兩相接續。胎自固而安矣。方用接土固胎湯。

人參

一兩

白朮

二兩

山藥

一兩

肉桂

二錢

製附子

五分

續斷

三錢

杜仲

三錢

山萸

一兩

枸杞

三錢

兔絲子

三錢

錢酒

砂仁

三粒

炙草

一錢

炒

研