

壽世保元

卷之七

婦人科

婦人之病有可治有不可治者。皆由其心性喜惡所關也。聞有德性柔良。舉止端重。克盡婦道。奉敬翁姑。相夫教子。凡內助理家。女工井臼。桑麻之事。无不盡善者。必无疾病。雖或有之。亦易為治也。有等逆妬險惡。罔尊夫。卑。惟其衣食自私。全無宗祀之念。犯有七法。助无一能。天教病入膏肓。雖虛扁亦難治療。予因痛識此病。借立醫方。以為勸戒。其真胎前產後等病。各自有方。開具於後。

婦人總論

夫婦人乃眾陰所集。常與溫居。榮衛和平。諸病无由而生。榮衛虛弱。則百病生焉。經云。二七而天癸至。任脉通。太衝脉盛。月事以時。上下交感。則有子矣。其天癸者。天一生水也。任脉通者。陰用之道泰也。太衝脉盛者。血氣俱盛也。何謂之月經。月者陰也。經者經絡也。過期而行。經者血寒也。未期而行。經者血熱也。經行作痛者。氣之滯也。來後或作疼者。氣之虛也。其色紫者。為風。黑者。為熱。淡者。為痰。如煙塵水者。血不足。余攷古方。養其氣以調其經。則以為人之正氣。不宜耗也。夫衝者。氣也。任脉者。血也。氣升則升。氣降則降。血隨氣行。无暫息。若獨耗其氣。血无所施。正氣既虛。邪氣必勝。故百病生焉。其經安得調乎。況心生血。脾統之脉。為之元也。養其心。則血生。實其脾。則血足。氣勝則血行矣。安得獨耗其氣哉。此調經之要法也。行經之時。保如產母。一失其宜。為病不淺。當戒暴怒。莫損於衝。任。遠色。慾。莫損於血海。一有抑鬱。宿血必停。走於腰脇。注於腿膝。遇新血擊。搏。則疼痛不已。數於四肢。則麻木不仁。入於血室。則寒熱不定。或怔忡而煩悶。或入室而狂言。或湧上出。或歸入腸。皆因氣七情之所致也。余攷產後一科。胎前血氣用藥溫煖。於理最當。治法至於子和論產後出血數斗。世人皆以血氣兩虛。妄用溫熱之劑。養血補虛。止作寒治。舉世皆然。故有誤者。殊不知妊孕如天地之孕物。陰陽和合。人物俱生。陰陽偏勝。豈得孕乎。譬如瓜果值水旱。花實美惡。故立秋後十八日。十莖不結。乃寒不發生也。今婦人終於十月而產者。反為寒治。則非理矣。若子和之法。當行溫涼溫熱之劑。實所禁也。以余常用和暖之劑。使血得暖。以流通。其惡露自盡。故无後患耳。況生產有難。易血氣有盛衰。豈可偏執一法。能盡產後無窮之變焉。余每經歷新產月。用溫暖治。

效者十多八九用溫涼治效者百无二三。嘗致子和之法。施於月外。溫熱自甚。陰虛潮熱往來。當行溫涼之劑。故無禁耳。其月裏可不慎哉。人子受胎。雖係陽精所得。實賴母血而成。亦若瓜果賴枝葉所蔭也。今婦人終於十月而產者。即瓜熟蒂懸脫殼之意。雖冒寒暑傷食。調理不宜急迫。則隨手而愈。間有失珍重。不滿十月而動胎產者。猶若枝蔓瓜果有所傷也。胞係腐爛。胎始墮落。故此得病則難愈矣。昔人所謂小產傷如太產者此也。凡婦人新產。榮衛俱虛。腠理不密。或冒風寒。或傷飲食。或惡露不通。或血行過度。如此四者。俱能發寒熱身疼腹痛。又不可相類而用藥也。又如產後脾胃既虛。或多食難子冷物。所傷脾胃。遂成傷食。以致身熱口脉盛。當行消食之藥。世人多因身熱便為外感。然行溫涼之藥。發汗退熱。胃氣轉傷。豈無死者。產後半月之前。雖去內外之邪。亦當兼行血氣。如過半月已後。若有雜症。不可偏執產後一門。治療。又當各類中求之。庶无耽誤病體矣。

調經諸方

一論此方調經。榮衛滋養氣血。治衝任虛損。月水不調。膈腹疼痛。崩中漏下。血痕塊硬。發歇疼痛。妊娠宿冷。將理失宜。胎動不安。血下不止。及產後乘虛風寒。內搏惡露不下。結生瘕聚。小腹堅痛。時作寒熱。婦人百病。宜四物湯當歸身酒。

川芎 白芍藥

炒酒

懷熟地黃

二

右剉一劑。水煎溫服。看病加減。

一經候將來。腹中陣陣作痛。作止者。血氣實也。用生地。加黃連香附。桃仁紅花。元胡索。牡丹皮。義術。一經水常不及期而行者。血熱也。用生地黃。黃連。黃芩。白芷。一經水常過期而來者。瘦人多。是血少。倍黃歸地黃。加黃芪甘草。少佐以紅花。桃仁。以為生血之引用也。肥人大。聚是氣虛。挾痰阻滯。升降然也。去地黃。加參芪甘草。茯苓。半夏。陳皮。香附。一經水常過期而重。或塊者。熱也多。作腹痛。用生地。加香附。黃連。元胡索。五靈脂。乳香。沒藥。一過期而血淡色者。痰多血少也。用生地黃。合二陳。湯煎服。一肥盛婦人。經水或二三箇月一行者。痰盛而軀脂閉塞。經脈以導痰湯。加芍歸香附。蒼朮。白朮。一經水過來過斷。往來寒熱如瘧者。合小柴胡湯煎服。一經行過三五日。腹中綿綿走痛者。此血行而滯氣未盡行也。加木香。枳殼。煎服。一經水行後而作疼。香氣血俱虛也。加四君子湯煎服。一經事欲行。膈腹絞痛。臨經者。血澀也。加川練子。小茴木。香。枳殼。玄胡索。一經行時。急着氣。後得心腹腰脇痛。不可忍。脉弦急。不勻。乃瘀血作痛也。加桃仁紅花。玄胡索。木香。及行血即愈。一經行不止。加炒阿膠。地榆。荆芥。穗。一婦人因經血過多。得五心煩熱。日

眼朝熱加胡黃連二三服效。一婦人筋骨肢節痛及遍身頭疼兩手脉弦增寒如瘧每以散風止痛之劑罔效加羌活防風秦艽官桂立效。一血崩初起不問虛實加荊芥穗燈上燒過升麻如不止加蒲黃炒白木炒升麻。一治血崩加荊芥黃芩香附。一治崩漏如沙參益母草香附炒阿膠炒蒲黃炒陳皮白木甘草去當歸不用。一赤白帶下加柴胡升麻酒炒各半夏煨汁白茯苓酒洗蒼朮酒炒黃柏酒炒知母酒炒乾姜炮升陽除濕帶自除也。一胎動下血不安加艾葉阿膠炒黃芩白木砂仁香附糯米。一胎死腹中加官桂白芷麝香。一產後惡露不行加益母草桃仁蘇木一產後血虛昏暈不醒加人參白木白茯苓各香附甘草。一腹中氣塊加木香枳椇一血積塊痛加三稜義木官桂乾漆炒一口乾煩渴加麥門乾葛烏梅一骨蒸勞熱加知母地骨皮柴胡。一小便閉澀加澤瀉木通。一大便不通加桃仁大黃。一虛煩不眠加竹葉人參酸棗仁炒。一心神恍惚加遠志酸棗仁白茯苓各辰砂另研。一嘔如薑香半夏砂仁陳皮。一瀉加白茯苓白木蓮肉山藥炮乾姜。一婦人經水先期而至血紫有塊腰痛手足冷痺口乾頭眩胸痞本方加條荊芥香附小茴玄胡索續斷杜仲地榆甘草。一婦人血塊作痛不可忍者加三稜義木青皮陳皮小茴香附吳茱萸玄胡索木香甘草姜黃煎服。一婦人經不下行連經吐血不止本方一兩加川大黃酒浸炒一兩水煎入童便同服立效。一婦人女子經信愆期以致鼻衄錯經妄行本方去地黃加桃仁山梔炒大黃酒炒甘草共七味水煎臨服入童便同服。一婦人經行三日後來多不止本方加伏龍肝地榆蒲黃柏側柏葉黃連白茯苓甘草梔子十三味因氣惱加香附。脾胃虛少食加白木。一論婦人經不調或腹痛白帶或淋漓不止或肌瘦者頭目眩暈面色萎黃四肢無力以十全大補湯加香附陳皮玄胡砂仁阿膠沉香小茴香吳茱萸。

一論室女十四歲經脉初動名曰天癸水至失于調理心腹脹滿惡寒發熱頭身遍疼此感寒血氣不順宜服小溫經湯利氣散主之。小溫經湯 桂枝酒洗白芷酒洗白木酒洗川芎酒洗當頭酒洗熟地黃錢酒洗枳殼去穢白芍酒洗羌活酒洗柴胡酒洗砂仁酒洗黃芩酒洗香附酒洗甘草酒洗小茴酒洗血氣刺心腹難忍加玄胡酒洗咳嗽加杏仁酒洗祛風酒洗五味子酒洗桔梗酒洗右劉一劑生薑三片水煎熱服利氣散 香附酒洗黃芩酒洗枳殼去穢陳皮酒洗藿香酒洗小茴酒洗白木酒洗玄胡索酒洗砂仁酒洗草果酒洗甘草酒洗厚朴酒洗右為細末每服二錢空心米湯調酒亦

一論室女十五六歲經脈不通。日夜寒熱。手足麻痺。飲食少進。頭疼惡心嘔吐。腹中忽結一塊。痛者。此症誤食生冷所傷。可服。加減四物湯。香附炒一。當歸酒洗。川芎。枳殼炒。柴胡。白芍酒炒。黃芩。陳皮。三棱炒。莪術炒。木香炒。熟地黃。白芷。玄胡索。小茴酒炒。白朮炒。青皮。砂仁。肉桂。甘草各五。右剉作一劑。水煎空心熱服。

一論室女十七八歲經脈不通。或百日。或半年。顏色青黃。飲食少進。寒熱往來。四肢困倦。頭疼目眩。肚痛結塊。五心煩熱。嘔吐膨脹。此乃脾胃受傷。血氣俱弱。後食生冷。急宜和氣血。扶脾胃。先以逍遙散。次服加味八物湯。後服調經丸。逍遙散。

當歸酒洗。白芍酒炒。柴胡。黃芩。川芎。熟地黃。半夏七。人參。麥門冬五。甘草各四。右剉散。生薑三片。水煎服。後服八物湯十劑。又可服調經丸數服。右少睡加酸棗仁炒。以欬心血。加味八物湯。香附。當歸。白芍炒。白朮。川芎。人參。熟地黃。小茴香。黃芩。柴胡。白茯苓炒。甘草。腹中痛加玄胡索。枳殼乾。漆。嘔吐惡心。加良姜。砂仁。手足麻痺惡寒。加肉桂。咳嗽加杏仁。五味子。款冬花。右剉水煎服。調經丸。

香附乾。三棱。當歸酒洗。白朮去。一兩半。如服。枳殼乾。赤芍。陳艾。陳皮。小茴炒。川芎。厚朴姜汁炒。熟地黃酒。青皮酒。玄胡。砂仁。三棱。莪術。牛膝酒洗。白芷。粉草各兩。右為細末。醋打米糊。為丸。如梧子大。每服百丸。空心米湯送下。

一論婦人二十歲後。過經脈動來。滿身疼痛。手足麻痺。寒熱頭痛目眩。可服。加減五積散。厚朴姜。蒼朮淋。川芎。白茯苓炒。當歸酒洗。半夏。白芍炒。獨活。羌活。牛膝炒。桔梗。白芷。枳殼炒。麻黃。陳皮。甘草。右剉散。姜煎服。咳嗽加五味。杏仁。瀉去枳殼。加肉蔻。

一論婦人二十三歲。經水不調。或赤白帶下。或如梅汁。淋或成片。有阻二三月者。此乃氣血虛弱。新生潮熱咳嗽。飲食少進。四肢倦惰。日必變生骨蒸。即成勞瘵。急當調治。可服前加味八物湯四劑。方可服大溫經湯。大溫經湯。香附。當歸酒洗。白芍酒洗。熟地黃。鹿茸酥。人參。白茯苓炒。白朮。吳茱萸炒。玄胡索。川芎各五。砂仁。陳皮。小茴酒。沈香。黃芪蜜。阿膠炒。肉桂。甘草各三。右剉一劑。生薑三片。水煎空心熱服。如汗不止。加酸棗仁。炒黃芪。咳嗽加杏仁。五味。半夏。桔梗。各五分。潮熱加柴胡。黃芩。

服如汗不止。加酸棗仁。炒黃芪。咳嗽加杏仁。五味。半夏。桔梗。各五分。潮熱加柴胡。黃芩。

一論婦人二十四歲所服藥餌加味四物六君湯加味四物六君湯厚朴煨汁當歸洗牛夏煨汁香附各五

枳實煨白茯苓皮川芎赤芍蘇葉煨榔桔梗白木四各砂仁紅花各三黃連三炒玄胡

三陳皮四甘草仁右劉散生薑三片水煎空心熱服

一論婦人二十五歲血海虛冷經水不調或時小腹疼痛或下白帶如魚腦髓或似米泔不分信期每日淋瀝不止面色

萎黃四肢無力頭暈眼花目眩宜服四物補經湯兼服烏雞丸調理四物補經湯香附當歸白芍六酒炒各熟

地黃川芎各五黃芪蜜白茯苓桂白朮法黃芩玄胡索陳皮各四砂仁小茴炒酒人參阿膠各炒

分三沈香湯研吳茱萸分粉草右劉生薑三片水煎空心熱服烏雞丸海金沙側柏葉各四砂仁香附

砂一厚朴三兩當歸酒洗白朮法川芎各二白芍二酒炒熟地二羌活半兩防風各半人參兩砂

仁各一粉草錢右劉用白毛烏肉膳雞一隻不問三五年者俱好殺淨去腸屎毛將藥一半入雞肚中放銅鍋內好

酒五壺水二瓶文武火煮至乾取雞去骨取肉切細同藥晒乾為末用粳米粉酒水煮糊為丸如梧桐子大每服百丸空

心米湯吞下酒亦可

一論婦人二十七歲身體虛敗經水不時淋漓或成片或下黑水面色青黃虛暈眼花四肢困倦宜服此四五劑後服前

大溫經湯十餘帖止經湯當歸酒洗三白朮法白芍酒川芎熟地黃香附阿膠炒黃芩蒲黃

炒側柏葉砂仁各七甘草炒右劉生薑煎空心熱服咳嗽加五味子杏仁桂肚痛加枳殼玄胡索乾漆氣

急加半夏蘇子各五

一治婦人經水來多不止用斷艾一兩好生酒炒三次碗蓋淬入水煎滾去渣溫服立止

一論婦人三十一二歲年年生育敗血過多以致經水不均不時腹中疼痛結塊飲食少進困倦目眩潮熱往來五心煩熱

此血虛胃熱宜服紅花當歸散兼用八物湯紅花當歸散當歸酒洗川芎赤芍藥熟地黃黃芩香附各

分枳殼五玄胡索五厚朴煨小茴香炒柴胡陳皮三稜醋煨各莪朮醋煨牛膝去芦紅花各三

甘草仁右劉生薑水煎空心熱服

一論婦人三十四五歲因經水來時當風坐臥失于迴避腰理空虛外邪乘入遍身麻痺不能轉側肺經受風咳嗽痰喘宜

一論婦人三十四五歲因經水來時當風坐臥失于迴避腰理空虛外邪乘入遍身麻痺不能轉側肺經受風咳嗽痰喘宜

服五積交加散二劑。又服八物湯十餘劑。五積交加散只可服一二劑勿多服。羌活、當歸、川芎、獨活、白芷、半夏、麻黃、桔梗、白茯苓、厚朴、蒼朮、防風、枳殼、陳皮、柴胡、桂皮。

甘草、右劉善慈炒熟服去柴胡。加烏藥、麝香各一錢。酒煎服。

一論婦人三十六歲。經行太過。血氣虛耗。胃氣不足。故經水妄來。可進八珍湯。同烏雞丸治之。八珍湯、當歸、白朮、白茯苓、人參、川芎、熟地黃、白芍、甘草、加香附、右劉善慈、姜水煎服。

一論婦人三十八歲。經脈不行。腹中有塊。頭暈眼花。不思飲食。乃血斷早餘。血未盡。不時攻痛成疾。宜莪朮散。逐去餘血。莪朮散、香附、當歸、莪朮、元胡索、赤芍藥、枳殼、熟地黃、青皮、白朮、黃芩、三棱、小茴香、砂仁、乾漆、紅花、川芎、甘草、右為細末。每服二錢。空心好米酒調服。

一治婦人腹中常常作痛。上下不定。經年積血也。青皮、陳皮、三棱、莪朮、香附、烏藥、乾姜、右各等分。醋煮焙乾為末。空心陳皮湯調下。

一論婦人四十二歲。經水斷絕。五十一二復來。或淋漓。或成片條。漏下不止。宜服和經湯。兼四物補經湯。烏雞丸。相間服之。可好。和經湯若三帖。即去氣。乃香附、陳皮、小茴香是也。和經湯、白芍、當歸、熟地黃、白茯苓、黃芩、香附、白朮、川芎、酸棗仁、蒲黃、阿膠、白芷、陳皮、小茴香、甘草、右各等分。

一凡婦人經水不調。或前或後。或多或少。時常頭暈。眼黑耳鳴。赤白帶下。腰腹疼痛。五心煩熱。四肢沈困。胸膈痞悶。不思飲食。凡屬減削。一切百病皆治。宜此。調經滋補丸、香附、米酒、醋、薑、鹽、湯、各浸、懷生地黃、酒、浸、砂、鍋、當歸、酒、洗、川芎、白芍、白朮、白茯苓、陳皮、懷山、藥、兩、牡丹皮、兩、小茴香、兩、玄胡索、兩。

一論婦人五十歲。以外經水猶不斷。則頭倒。倒不准。而來。當預防。恐成敗血症也。此丸甚妙。十全丹、當歸、頭、二、懷山、藥、兩、白朮、人參、黃芩、綿地榆、鹿角霜、黃柏、白茯苓、神、心、皮、懷生地黃、乾、四、雨。

一論婦人五十歲。以外經水猶不斷。則頭倒。倒不准。而來。當預防。恐成敗血症也。此丸甚妙。十全丹、當歸、頭、二、懷山、藥、兩、白朮、人參、黃芩、綿地榆、鹿角霜、黃柏、白茯苓、神、心、皮、懷生地黃、乾、四、雨。

一論婦人五十歲。以外經水猶不斷。則頭倒。倒不准。而來。當預防。恐成敗血症也。此丸甚妙。十全丹、當歸、頭、二、懷山、藥、兩、白朮、人參、黃芩、綿地榆、鹿角霜、黃柏、白茯苓、神、心、皮、懷生地黃、乾、四、雨。

右共為細末用艾葉三兩水二觔煎至一觔去渣入浮小麥粉六兩攪勻煮熟糊和藥為丸每日空心服一百五十丸扁柏葉煎湯送下。

一治婦人因怒吐痰胸膈作痛服四物二陳苓連枳殼之類不應近加祛風之劑半身不遂筋漸掣搐四肢痿軟日晡益甚內熱口乾形體倦怠予以為鬱怒傷脾胃氣血復損而然遂用逍遙散補中益氣湯六味丸調治喜其謹疾年餘悉愈形體康健。

一治婦人晡熱肢體瘦倦飲食少无味月經不行或鼻衄或血崩久矣或用順氣清熱等劑不應更加寒熱且時欲作嘔此乃鬱怒傷損脾胃虛火錯經妄行而然耳以補中益氣湯兼進六味丸。

一治婦人多怒經行旬餘方止後淋瀝无期肌體瘦口乾內熱盜汗如洗日晡熱甚皆由肝脾虧損无以生發元氣以補中益氣湯加茯神遠志麥門冬酸棗仁五味牡丹皮龍眼肉逍遙散方見後補中益氣湯方見後六味丸方見後十全大補湯方見後。

○斷產方總論

婦人欲斷產者不易之事雖曰天地大德曰生然亦有生產艱難或生育不已或不正之屬為尼為娼不欲受孕而欲斷之者故錄驗方以備所用然其方頗眾且多有用水銀蛋水蛭之類孕不復懷難免受病此方平和而有異驗具於後。

一婦人斷產驗方故蠶紙方員一尺燒為末酒調服終身不復懷孕也。

一千金斷產方油煎水銀一日方息空心服如東大一圓水斷不孕且不損人。

一斷子法用白麴一升无灰酒三斗打作糊煮至二升半絹袋濾去渣分作三服隨月經來日晚吃一服五更吃一服天明吃一服經事即行終身无子。

○經閉

脉女人尺脉常勝而右手脉大皆其常也若腎脉微滿或浮或滑而斷絕不勻或肝脉沉而急皆經閉不調之候也。丹溪曰經候有枯閉不通者有不及期過期者有妄行者有血紫黑及淡者有或塊者有作疼者夫經不通或因墮胎及多產傷血或因久患潮熱消血或因久發盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而不生血或多痢疾失血治宜生血補血。

除熱調胃之劑。隨症用之。或因七情傷心。心氣停結。故血閉而不行。宜調心氣。通心經。使血生而經自行矣。

一治婦女經閉。不論虛實寒熱新久。即服此方有殊效。清熱通經湯。當歸酒洗一錢。川芎一錢。白芍酒炒一錢。生地黃半錢。

大黃鈔。官桂鈔。厚朴姜炒。枳殼姜炒。蘇木錢。枳實姜炒。黃芩錢。紅花鈔。烏梅一錢。桃仁去皮尖。右

對生薑三片水煎。空心溫服。不數劑而奏效。

一論婦女經水不通。腹中積塊。癥瘕。攻注刺痛。宜服。歸木破癥湯。歸尾酒。赤芍。白芍。青皮鈔。一。三稜酒炒。

莪朮酒炒。香附醋炒。一。烏藥鈔。官桂。蘇木。紅花鈔。五。右剉一劑。水煎。入酒一盞。空心服。

一論婦女經閉。一二年不通。臍左下一塊。如碗口大。間或吐血。或便。發熱咳嗽。吐痰盜汗等症。宜養血調經丸。當歸

酒洗。川芎一兩。熟地黃兩。山茱萸酒炒。去。懷山約兩。生地黃酒洗。益母草兩。白芍酒炒。牡丹皮。白茯苓

苓。法皮。梔子仁兩半。香附米兩。澤瀉半兩。陳皮半兩。右為末。煉蜜為丸。如梧子大。每服三錢。空心淡薑湯

送下。

一治婦人血虛。作痛。臍下脹滿。或月經不行。發熱體倦。當歸。桂心鈔。玄胡索鈔。四。白芍酒炒。血竭。蒲黃

分。六。右為末。每服二錢。空心酒調下。消積通經丸。香附米醋炒。艾葉醋炒。當歸酒洗。兩。川芎一兩。赤芍兩。

生地黃兩。桃仁去皮。破。紅花酒洗。三稜醋炒。莪朮醋炒。一兩。乾漆炒。一。右為細末。醋糊為丸。如梧子大。每服八十

丸。臨臥淡醋湯送下。

一治婦女月經不通。鼻衄。出血不止。侍郎張玉陽。當歸半錢。川芎一錢。白芍半錢。生地黃半錢。知母錢。黃柏

錢。二分。一。桃仁去皮尖。紅花錢。牡丹皮錢。茅根。側柏葉錢。二。大黃用紅花。薑木為根。煎酒。右剉一

劑。水煎。空心服。

一治室女經水不行。翰林張明宇傳。當歸。川芎。赤芍。生地黃。荊芥穗。枳殼鈔。各。馬鞭草一錢。牡丹

皮。川牛膝。生蒲黃。各五。桂心。烏梅。右剉一劑。水煎。服。日二劑。過期不行。加澤蘭葉。

一治室女經閉。咳嗽發熱。虛弱。宜養血通經。牡丹皮。當歸。各五錢。白芍。生地黃。陳皮。白朮。香附

錢。一。川芎。柴胡。黃芩。甘草。右剉一劑。水煎。空心溫服。通經調氣湯。治症同前。當歸酒洗。川

芎。一。川芎。柴胡。黃芩。甘草。右剉一劑。水煎。空心溫服。通經調氣湯。治症同前。當歸酒洗。川

芎 白芍炒 生地黃 香附米鍾便砂 牡丹皮錢 柴胡錢 黃柏酒炒 知母八錢 牛膝酒洗 桃仁去皮

紅花二錢 右判十劑水煎空心一服食遠一服

一治婦人經閉不通不論新久下取良法 下取通經丸 乳香 沒藥 孩兒茶 巴豆法 血竭 蔥白各五

一治婦人胃氣素弱為哭母吐血咳嗽發熱盜汗經水三月不行此乃悲則傷肺以補中益氣湯加桔梗貝母兼進六味丸

一婦人經閉八月肚腹漸大面色或青或黃用胎症之藥不應余診視之曰面青脉濡寒熱往來肝經脉病也此鬱怒傷脾

肝之症非胎也不信仍用胎散不應余用加味歸脾逍遙之藥各二十餘劑諸症稍愈彼欲速效別服通經丸藥一服

下血昏潰自汗惡寒手足俱冷嘔吐不食余用人參炮姜二劑漸愈又用十全大補湯五十劑而愈

一婦人久患瘧形體怯弱內熱晡熱自汗盜汗飲食少思月事不行或用通經丸虛症悉具此因虛而致瘧因瘧以閉經也

用補中益氣湯及六味地黃丸瘧愈經行

一婦人性沉多慮月經不行胸滿食少或作脹或吞酸予以中氣虛寒用補中益氣加砂仁香附煨姜二劑而胸膈和飲

食進更加六君加川芎歸貝桔梗生薑太累數劑脾胃健而經自調矣

一婦人素有胃火或用清胃散而後因勞得燥渴內熱肌肉消瘦月經不行此胃火消燥陰血用逍遙散加牡丹皮炒梔

子以清胃熱用八珍湯加茯苓遠志以養脾血而經自行矣 補中益氣湯方見六味丸補益十全大補湯方見逍遙散

方見婦歸脾湯方見婦六君子湯 八珍湯補益

人虛弱歸脾湯方見婦六君子湯 八珍湯補益

人虛弱歸脾湯方見婦六君子湯 八珍湯補益

●崩漏

脉婦人漏血下赤白日久數升脉急疾者死遲者生○又曰脉小虛滑者生大緊實數者死○又云尺寸脈虛者漏血漏血

脉浮不可治也

夫婦人崩中漏下者由勞傷血氣衝任之脉虛損故也衝脉任脉為經脉之海皆起于胞內而手太陽小腸之經也手少陰

心之經也此二經上為乳汁下為月水婦人經脉調通則月水依時若勞傷衝任氣虛不能制其經脈血非時而下淋漓

而不斷謂之漏下也致五臟傷損五臟之色隨臟不同若五臟皆虛損者則其色隨血下診其脉寸口弦而大弦則為減

大則為孔。減則為寒。孔則為虛。虛寒相搏。其脈為牢。婦人即生產而漏下。又云。尺脈急而弦大。風邪入少陰之經。女子漏血下赤。又漏下赤白不止。脉小虛滑者生。脉大緊實數者死也。又漏血下赤。白。日下血數斗。脉急疾者死。遲者生也。又云。尺寸脉虛者。漏血。漏血。脉浮不可治也。若經候過多。其色紫黑。甚者。崩下。吸吸少氣。臍腹冷極。則汗出如雨。尺脉微小。由衝任虛寒。為風冷客乘胸中。氣不能固。可多關元百壯。在臍下當中三寸。

一論女人漏下惡血。月事不調。或暴崩不止。多下水漿之物。皆因飲食不節。勞倦所傷。或素有心氣不足。致令心火乘脾。必怠惰嗜臥。困倦乏力。氣短氣急。脾主滋榮周身者也。脾胃虛而心胞乘之。故漏下月水不調也。况脾胃為血氣陰陽之根蒂也。當陰虛去熱。抑風氣上伸。以勝其濕。又云。火鬱則發之。宜用升陽除濕湯。當歸酒洗五分。黃芪半錢。蒼朮。蘇。柴胡半錢。升麻錢。藜蘆本錢。防風錢。羌活五分。獨活。蔓荊子。甘草錢。右制作一劑。水煎。空心溫服。少時以早飯壓之。可一服而愈。又灸足太陰脾經血海穴二七壯。此藥乃從權之法。因風勝濕。為胃氣下陷。而氣迫于下。以收其血之暴崩也。往後必須服黃芪人參當歸炙甘草之類。數服以補之。

一治婦人崩漏。多因氣所使而下者。黃芪酒洗五分。人參。白朮去。當歸身酒洗。川芎。白芍酒炒。熟地黃。香附炒黑。蒲黃炒。地榆。升麻。右制一劑。水煎。空心服。

一治婦人經水過多不止者。椿根皮。白芍。黃芩。龜板。黃柏。香附。重便浸。右為末。酒糊為丸。如梧子大。每服五十九丸。空心溫酒白湯任下。

一治婦人血崩。氣血兩虛。而兼熱者。當歸酒洗。川芎。人參。黃芪。防風。荆芥。白芍。艾葉。炒。真阿膠炒。蒲黃。黃連。黃芩。白朮。地榆。生地黃。山梔子。甘草。右制一劑。水煎。空心溫服。或毒蟲煎服。

一治婦人血崩。或作肚腹刺痛者。蒲黃。五靈脂。官桂。雄黃。甘草。右為細末。每服一錢。姜湯調下。

一治婦人血崩。惡血去多。心神恍惚。戰慄虛羸者。宜復元養榮湯。遠志。肉桂。人參。酸棗仁。黃芪。荆芥。白芍。當歸頭。地榆。白朮。甘草。右制。果一枚。水煎溫服。如虛極發羸。不省人事。口

噤。急以醋嗅其面。又將鉄鉗燒通紅。浸入醋碗內。沸起醋氣。置本婦鼻邊。此產後通用法也。

一治婦人經候凝結。黑血成塊。左脘有血瘕。水泄不止。食有時不化。復血塊暴下。并水泄俱作。是前後二陰有形血脫。竭於下既久。經候猶不調。水泄日三四行。食罷煩心。飲食減少。人形瘦弱。血脫益氣。古聖人之法也。先補胃氣。以助生發之氣。故曰陽生陰長。諸甘藥為之先務也。甘能生血。陽生陰長之理。人身以製氣為貴。故先理胃氣為要。益胃升陽湯。黃芪半斤。人參二錢。甘草一錢。陳皮一錢。白朮二錢。當歸一錢。柴胡一錢。升麻一錢。神麴一錢。生薑一錢。黃

芪半斤。人參二錢。甘草一錢。陳皮一錢。白朮二錢。當歸一錢。柴胡一錢。升麻一錢。神麴一錢。生薑一錢。黃

一異人傳授秘方。治血崩如神。金鳳膏。白毛烏肉雄雞一隻。吊死。水泡去毛。去腸雜不用。將金櫻子之根洗淨切片。裝入肚內。煮令熟。去藥。將雞酒任意食之。

一治血崩試效方。云來弟傳。懷生地黃。用砂礱去皮煎。牡丹皮。石棗。酒蒸。懷山藥。條芩。蒲黃。炒。阿膠。香附。白芍。白朮。黃連。陳皮。甘草。右剉一劑。生薑三片。裹一枚。不拘時服。

一治婦人五十以上。經脉暴行。內經曰。大主速。不可以冷病治之。如下峻藥即死。止可用黃連解毒湯。以清其上。加棕灰連殼灰。以參其下。然後用四物湯。涼血和經可也。

一方治血崩。用槐花一兩。百草霜半兩。為末。每服二錢。燒紅稱銖。淬酒下。一方治風熱血崩。荊芥穗。燈火燒焦為末。每服三錢。童便調服。一方血虛內熱。血不歸元而崩。桂心燒存性為末。每服一二錢。米飲調下。一方治血崩。枯礬為末。麩糊為丸。指頂大。每一丸。好酒下。一方治血崩。棕燒灰一撮。好酒調。空心一服立止。一方治血崩。用益智仁為末。每服二錢。以燒紅稱銖。淬酒調服。一方治血崩。用精肉四兩。百草霜二兩。隔湯燉吃即止。一方用乾驢糞為粗末。入罈內燒烟。令崩婦坐其上。烟薰久自止。一方用腥腥草剉一劑。水煎服立效。一方用雞子一個。去黃入銀硃三錢。攪勻。燒存性。溫酒下。一方鹽沙揀為末。每服三錢。空心熱酒調服。米飲亦可。一方五靈脂炒黑烟為末。每一錢。溫酒下。一方半生半炒。一方香附米炒黑烟為末。每服三錢。空心熱酒調服。米飲亦可。一方婦人崩漏。面色黃或赤。時覺腰間臍下痛。四肢困倦。煩熱不安。其經行先發寒熱。兩脇如束。此脾胃虛損。元氣下陷。與相火濕熱下迫所致。以益氣湯加防風白芍黃柏炒。一女子漏下惡血。月經不調。或暴崩不止。多下水漿之物。或白帶脫漏不止。皆因飲食不節。勞傷所傷。或素有心氣。

一治婦人經候凝結。黑血成塊。左脘有血瘕。水泄不止。食有時不化。復血塊暴下。并水泄俱作。是前後二陰有形血脫。竭於下既久。經候猶不調。水泄日三四行。食罷煩心。飲食減少。人形瘦弱。血脫益氣。古聖人之法也。先補胃氣。以助生發之氣。故曰陽生陰長。諸甘藥為之先務也。甘能生血。陽生陰長之理。人身以製氣為貴。故先理胃氣為要。益胃升陽湯。黃芪半斤。人參二錢。甘草一錢。陳皮一錢。白朮二錢。當歸一錢。柴胡一錢。升麻一錢。神麴一錢。生薑一錢。黃

不足致令心火乘脾。必怠惰嗜臥。困倦乏力。氣短氣急。脾主滋榮周身者也。脾胃虛而心胞乘之。故漏下月水不調也。况脾胃為血氣陰陽之根蒂也。當除濕去熱。抑風氣上伸。以勝其濕。又云火鬱則發之。以益氣湯去參朮陳皮。加蒼朮薑本。防風羌活蔓荊子。一婦人行經太過。血氣虛耗。胃氣不足。故經水安來。可以十全大補湯去桂枝加香附。一婦人患崩。過服寒涼之劑。其症益甚。更加肚腹痞悶。飲食不入。發熱煩燥。脉洪大而虛。此脾經氣血虛而發燥也。急用八珍湯加炮姜以溫補之。緩則不救。不信。乃服止血降火之劑。虛症蜂起。始信予言。緩不及治矣。

●帶下

脉婦人帶下六極之病。脉浮則為腸鳴腹滿。緊則腹中痛。數則為陰中痒痛則生瘡。弦則陰戶掣痛。帶下脉浮寒濕漏下者不治。

婦女下白而不甚稠者。曰白淫。與男子白濁同也。係出於相火。如龍雷之擾。而不澄清。然耳屬於足少陰太陽。治當清補為主。其下赤白稠粘者。謂之帶下。屬於心胞手厥陰少陽。即若男子自遺之精。其即如砂石之淋。原乎心胞係於脊。絡於帶脉。通於任脉。下抵湧泉。上至泥丸。王叔和云。崩中白久為白帶。漏下多時。骨木枯之切矣。治宜血肉之劑以培之。此乃窮源探本之論。百世不易之法。時人皆泥於當套。作濕痰以治。及以牡蠣龍骨地榆膠艾之類。溫之。和以四物。兼以提丹。殊不知根本損傷。以致腐敗而來。彼塞滯不消之物。則益加其滯。升提不正之氣。則增劇其鬱。噫。或非醫者之過。抑求治之者不賢也。凡遇是病。必以六龍內固丸。十六味保元湯主之。十六味保元湯。黃芪錢。石斛分。巴戟肉錢。白茯苓錢。升麻分。圓眼肉錢。黃仲三錢。人參錢。山藥錢。川獨活錢。當歸身錢。蓮蕊錢。黃柏分。生甘草分。杜仲小。苧藍醋湯浸。骨碎補毛。粗槲寄生錢。右剉一劑。水煎。空心溫服。潮熱加柴胡分。黃芪酒炒。帶甚者。月經必少。其有聚而反來者。或紫或黑。通來通斷。離離落落。而不淨者。加荊芥錢。黃連分。地榆分。若五心煩熱。而口舌乾者。加知母一錢。麥門冬錢。地骨皮。大便溼而燥者。乃血少火躁陽明也。四物湯加麻仁大黃等分。研如泥。半夜熱服之。帶下久不能止。服前約不能奏效者。宜六龍固本丸大效。

一論此丸能生血固真。補心益腎。帶不滿則經水自調。月經調準。則有孕。男婦元氣充足。產子少病。而且壽矣。此方不特赤白帶下有效。凡小產後虛者。血出崩虛者。五勞七傷。女勞怯者。一切不足之症。并欲求嗣得孕。婦女諸虛。皆有殊效者也。

草鋪之放豆屬於內。上仍用草蓋入水煮一日。頻頻添水。煮至豆腐黑為度。取出硫黃。研為末。將白芍紙包。水濕火煨。切片為末。各等分。合一處和勻。水打麪糊為丸。如梧桐子大。每早空心用五分好燒酒一鍾送下。服五日後即愈。如未愈。每早服一錢。服至五日全愈。

一治婦人白帶。男子白濁下淋。乾姜砲一 百草霜二 右為末。每服一錢。溫酒調下。

一治婦人赤白帶下。不論年月深久不瘥。乾姜砲 白芍酒炒 右為細末。每服一錢。空心米飲調服。又方。白雞冠

花搗末。每服三錢。空心酒調下。赤帶用赤雞冠花。又方。用鹿角燒灰存性為末。好酒調下。空心服二匙。又方。雞

子開頂入硫黃末三分。濕紙裹煨。嚼吃。好燒酒下。又方。蒼朮焙乾 乾姜砲 各為末。每服二錢。空心酒調下。又方。

白芷兩 以石灰半斤。淹三宿去灰。炒焦為末。清米飲空心調服。又方。硫黃五錢 胡椒四錢 為末。好酒調服。又方。

硫黃銕 用烏梅肉銕 搗丸。黃豆大。每服五丸。空心酒送下。又方。蔓荊子炒焦 為末。空心米飲調服。以能燥濕。瘥也。亦

可治心痛。治赤白帶下。五倍子炒 桃仁炒去 各等分為末。每服二錢。空心燒酒調服。

一治婦人久患白帶。瘦則無力。倦怠欲睡。腰酸腿痛。飲食无味。面黃日晡煩熱。小水淋瀝。以用參朮香湯去桂。加車前子。地

骨皮鹿角膠大獲全效。

一婦人帶下四肢無力。蓋四肢者土也。此脾胃虛弱。濕痰下注。以補中益氣湯。兼歸脾湯二藥治之。愈。

一婦人年踰六旬。內熱口乾。勞則頭暈吐痰。帶下。或用化痰行氣。前症益甚。飲食愈少。肢體或麻。絡服祛風化痰。肢體常麻。

手足或冷或熱。日漸消削。此症屬脾氣虛弱。而不能生肺。祛風之劑復損諸經。也。當滋化源。以補中益氣湯加白茯苓半

夏炮乾姜。如聖丹。白礬。蛇床子各等 右為末。醋糊為丸。如彈子大。胭脂為衣。薄綿線二尺許繫約。丸深入玉戶

中。定坐半日。熱極再換。大抵此疾多因子宮不潔。服藥難於取效。

一治婦人帶下。腸有敗膿。淋瀝不已。腥穢殊甚。遂至臍腹更增冷痛。此蓋敗膿所致。卒元已期。須以排膿乃已。白芷兩

單葉紅菱根二片 芍藥各 白礬五錢 研為末。同以蠟丸。梧子大。空心飯前米飲下十丸。或五十丸。候膿盡。仍以他

藥補之。五積散方見 補中益氣湯方見 歸脾湯方見 虛勞

夫人之生以血氣為本人之病未有不先傷其氣血者世有室女童男精想在心思慮過當多致勞損男子則神色先散女子則月水先開何以致然蓋憂愁思慮則傷心心傷則血逆遏血逆遏則神色先散而月水先開也大既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虧故發嗽嗽既作水氣絕故四肢乾水氣不充故多怒髮焦筋攣傳變五臟至此成勞最為難治或有以為血熱用涼藥解殊不知血得熱則行冷則凝凡經水少漸至不通手足骨節煩疼漸至羸瘦漸生潮熱脈來微數此陰虛血熱陽往來之水不能滅火火逼水涸當養陰血慎勿以藥通之

一論治婦人以血旺氣衰為本心生血肝藏血今血衰而氣盛者由心氣虛耗又不能生血又不能制平肺金使肺氣得以乘乎肝木肝之虧損則不能藏血漸至枯涸不榮經絡固月信不調矣此藥專補心元之虛抑其肺金之盛調和榮衛滋養血脈其疾自愈兼治血氣過多虛勞發熱及吐血衄血咳嗽痰喘上壅胸膈不利虛勞發熱咳嗽痰喘無汗者可服茯苓補心湯當歸酒川芎白芍酒懷熟地黃陳皮半夏湯泡煨汁白茯苓桂枝枳殼錢一乾葛紫蘇各七人參木香各五甘草三右剉一劑生薑棗子煎服

一論婦人諸虛百損五勞七傷經脈不調肢體羸瘦此藥專調經水和血脈補虛勞扶元氣健脾胃養心肺潤咽喉清頭目定心悅安神魄退潮熱除骨蒸止喘嗽化痰涎收盜汗住泄瀉開鬱氣利胸膈療腹痛解煩渴散寒熱祛體痰大有奇效不能盡述

濟陰至寶丹 當歸酒 白木各八分 白茯苓各二分 生知母各二分 貝母各二分 香附酒便 地骨皮 麥門冬各八分 陳皮各八分 薄荷 柴胡 甘草各三 右剉一劑煨生薑三片水煎溫服

一論婦人脾經失血少寐發熱盜汗或思慮傷脾不能攝血以致妄行或健忘怔忡驚悸不寧或心脾傷痛嗜臥少食或憂思傷脾血虛發熱或肢體作痛大便不調或經候不准哺熱內熱或燥癰流注不能消散消飲宜 歸脾湯 黃芪蜜水 人參 白木各八分 白茯苓各二分 當歸酒 遠志各二分 酸棗仁 炒 龍眼肉 各一分 木香 甘草各二分 右剉一

劑姜棗煎服 加味歸脾湯 治瘀血已去或脾經失血小腹作痛無寐發熱盜汗或傷脾不能攝血或心脾傷痛嗜臥少食或憂思傷脾血虛發熱或肢體腫痛大便不調或經候不准哺熱內熱等症依前方加柴胡梔子是也 一論婦人血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏沉心忪煩赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相傳月水不調臍腹

