


李时珍《本草纲目》中有关 治疗噎膈、反胃的方药



福建省肿瘤防治研究办公室 编 印
福建省医药研究所情报资料室

一九八〇年二月

PDG

印 发 说 明

编者从阅读李时珍《本草纲目》及历代有关的中医著作中，将有关治疗噎膈、噎食和反胃的方药，摘录整理成册。这对发掘祖国医药学宝库中有效的防治肿瘤的方药，将起一个推动的作用。

编者在前言中已明确交待：噎膈、噎食不等于食管癌；反胃不等于胃癌。但噎膈、噎食包括食管癌，反胃包括胃癌。因此，该资料中必定有部分治疗食管癌、胃癌的方药。我们将它编印成册，供参考。临床医师可根据病人的具体情况，选择试用。在试用时，应注意药性、剂量和剂型，尤其要注意药性，防止发生严重的付反应。并请在试用的过程中，注意资料的完整性（包括病例诊断依据、方药的用法、疗程以及疗效观察记录等原始资料），发现有效苗头，及时报送我们，以便总结提高，使祖国医药学在防治肿瘤中发挥更大的作用。这是我们印发该资料的主要目的。

福建省肿瘤防治研究办公室
福建省医药研究所情报资料室

一九八〇年二月

前 言

肿瘤病是一种严重威胁人民健康的常见病，也是近年来医学领域内越来越受到重视的研究课题。而食管癌、胃癌又是我国常见恶性肿瘤病中最常见的病种。因此，对于食管癌和胃癌的防治研究工作，是肿瘤防治研究工作的重要课题。

为了向广大医药科学人员和广大群众提供一些祖国医药学对治疗食管癌和胃癌的资料，特将李时珍《本草纲目》中有关噎膈、反胃等疾病的治疗方药摘出，并附赵学敏《本草纲目拾遗》等书中的有关记载，以供有关医药科研人员和临床医师参考，根据具体情况选择试用。

这里摘出的都是治疗噎膈、反胃的有关方药，历代中医文献中，没有食管癌、胃癌的病名，但这并不等于前人没有认识和治疗过此类疾病，也不应妨碍我们从祖国医药学宝库中努力发掘这方面的经验。既然食管癌、胃癌是一种常见病，我们应努力在伟大的祖国医药学宝库中发掘其有效的治疗方法。

根据近年来有关方面的研究，一般认为中医典籍中所称的噎膈、噎食、关格等大致相当于目前所说的食管癌或食管末端贲门癌；反胃、翻胃等相当于目前所说的胃癌，但是，由于中医和西医是在不同历史条件下形成的两个不同的医学体系，其认识疾病的手段和方法是有所不同的。因此，不能简单地把西医的病名与中医的病名划出等号。中医所称的噎膈、噎食、反胃等疾病，也不能说就完全相同于现代医学所称的食管癌和胃癌。但是我们的祖先既然也发生过食管癌和胃癌这类疾病，历

代的医学家和人民群众也和这类疾病作过斗争，在我们伟大的祖国医药学宝库中是有这方面记载的，同时在民间也必然有这方面的经验。

噎膈、噎食、反胃等中医文献记载的症状既然类似于我们今天所称之食管癌、胃癌等肿瘤疾患，我们在发掘中医治疗这类疾病的经验时，从整理中医文献中对治疗噎膈、噎食、反胃等的有关方药着手，根据条件，选择试用，对防治肿瘤的医药科学研究工作是具有推动意义的。

李时珍是我国历史上一位伟大的科学家，在他的不朽著作《本草纲目》中，就记载了大量的有关治疗噎膈、噎食和反胃等类疾病的方药，其中有些方药经近代医药学家的研究，已发现了不少可喜的苗头，因此，只要我们善于根据患者的具体情况和其他条件，选择试用其中一些方药，配合中西医的其它疗法，是可能探索出一些有益的经验。

编 者

目 录

丁香·····	(1)	白豆蔻·····	(8)
人屎·····	(1)	白马溺·····	(9)
人参·····	(2)	白芷·····	(9)
水银·····	(3)	白茅根·····	(10)
木槿花·····	(4)	白鼓钉·····	(10)
牛喉·····	(4)	半夏·····	(10)
白水牛喉·····	(4)	田螺·····	(11)
牛口涎·····	(4)	巧妇鸟·····	(11)
人工牛黄·····	(5)	毕澄茄·····	(12)
石碱·····	(5)	伏龙肝·····	(12)
牛乳·····	(5)	红豆蔻·····	(12)
代赭石·····	(6)	红花·····	(13)
斑鸠·····	(6)	羊屎·····	(13)
乌雄鸡肉·····	(6)	羊胓子·····	(13)
黄雌鸡肉·····	(6)	羊胃·····	(13)
反毛鸡·····	(7)	赤石脂·····	(13)
凤仙·····	(7)	苏茎·····	(14)
化州桔红·····	(7)	芦根·····	(14)
石打穿·····	(7)	杜衡·····	(14)
石莲子·····	(8)	豆付锅巴·····	(15)
甘蔗·····	(8)	豆蔻·····	(15)
甘遂·····	(8)	附子·····	(15)

砂仁·····	(16)	黄桔皮·····	(25)
鸡嗉·····	(16)	蚯蚓泥·····	(25)
鸡内金·····	(16)	黑雌鸡·····	(25)
驴尿·····	(17)	梨·····	(25)
柿·····	(17)	棠梨叶·····	(26)
矾石·····	(17)	猫胞衣·····	(26)
虎膏·····	(18)	鸛鷀·····	(27)
虎肚·····	(18)	鹅毛·····	(27)
狗宝·····	(18)	鹅血·····	(27)
狗胆汁·····	(19)	狼皮·····	(28)
狗尿中粟·····	(19)	猪肉·····	(29)
胡椒·····	(19)	绿矾·····	(29)
荞麦秸·····	(20)	雷公藤·····	(29)
韭菜·····	(20)	蓬砂·····	(29)
韭·····	(20)	雌黄·····	(30)
秋石·····	(20)	蜈蚣·····	(30)
梁上尘·····	(21)	豨莶草·····	(31)
荳蔻槟榔·····	(21)	蛻螂·····	(31)
茴香虫·····	(21)	罌子粟米·····	(32)
蚬·····	(21)	齡草·····	(32)
蚌·····	(22)	鲤鱼·····	(32)
蚕豆粉·····	(22)	鲫鱼·····	(33)
狼喉靨·····	(22)	壁虎·····	(33)
铅·····	(22)	燕窩·····	(34)
铅丹·····	(23)	燕窩脚·····	(34)
高良姜·····	(23)	螺丝泥·····	(34)
礞砂·····	(23)	鹰吐毛·····	(35)

檀香.....	(35)	鼯鼠.....	(37)
蟾皮.....	(35)	大枣.....	(37)
蟾蜍.....	(36)	斑蝥.....	(38)
蟾酥.....	(36)		

丁香

辛温无毒。

反胃吐食：袖珍方：用母丁香一两为末，以盐梅入捣，和丸，芡子大，每噙一丸。圣惠方：用母丁香神曲炒等分，为末，米饮服一钱。

朝食暮吐：丁香十五个，研末，甘蔗汁姜汁和丸莲子大，噙嚥之。

反胃关格：气噎不通，丁香木香各一两，每服四钱，水一盏半煎一盏，先以黄泥做成盂，滤药汁于内，食前服此方。乃稼史吴安之传于都事盖耘夫，有效，试之果然。土盂取其助脾也。德生堂经验方。

《本草纲目》（卷三十四）

注：以下篇末所列卷数，系指《本草纲目》。

人尿

苦寒无毒。

噎膈反胃：诸药不效，真阿魏一钱，野外干人尿三钱，为末，五更以姜片蘸食，能起死人。乃赵王困【注】方也。（永类铃方）

噎食不下：人尿入萝卜内，火炼三柱香，取研，每服三分，黄酒下，三服效。（海上名方）（卷五十二）

〔注〕困，古渊字。

人 参

根，甘微寒无毒：主治反胃吐食。

反胃呕吐：饮食入口即吐，困弱无力，垂死者，上党人参三大两，拍破，水一大升，煮取四合，热服，日再，兼以人参汁，入粟米鸡子白菲白煮粥与啜。李直方司勋，于汉南患此，两月余，诸方不瘥，遂与此方，当时便定，后十余日，遂入京师。绛每与名医论此药难可为传也。（李绛兵部手集）（卷十二上）

止反胃吐食，煎饮或煮粥食，或同半夏生姜蜜煎服。（卷三上）

食入即吐：人参半夏汤。用人参一两，半夏一两五钱，生姜十片，水一斗，以杓扬二百四十遍，取三升，入白蜜三合，煮一升半，分服。（张仲景金匱方）（卷十二上）

附：国外对人参成分、药理及部分治癌的临床研究报导

村田等人曾观察了人参提取物 Prostisol 对癌症患者 101 例的治疗效果，患者中胃癌 71 例，胰腺癌 8 例，结肠癌 11 例，乳腺癌 4 例，甲状腺癌 2 例，肉瘤 3 例，其他肿瘤 2 例，大部分病例为手术切除主要病灶后有复发、转移或手术不能根治肿瘤病人。每日 4—6 片（每片含 Prostisol 10 毫克）连续服用 3—6 周，以后每日用 1—2 片维持治疗。手术后 6 个月内，与其他抗癌药合并应用；6 个月以后则单用 Prostisol。连续服用 3 个月以上的 43 例中，30 例有效，占 69.8%，胃癌 28 例中有 23 例有效，肠癌 7 例中有 5 例有效，胰腺癌、肉瘤均无效，肝转移者有效甚少。多数病例于服用后 1—2 周，食欲改善，

体重增加，临床症状好转，腹水减少，转移灶停止增大。大部分病例血象改善；丙种球蛋白免疫球蛋白 M (Ig M) 含量增高，对网状内皮系统的功能有所增强。此与动物实验结果：Prostisol 促进蛋白质和脂质的代谢，提高机体的免疫力，改善带癌者的脂肪代谢是一致的。

肿瘤化疗中，氟脲嘧啶 (5—Fu)、阿糖胞苷 (Cytosine Arabinoside)、喜树碱等均能中断癌和正常细胞的核酸代谢，但人参成分只改善患癌的动物DNA等的代谢，并不增加癌组织中的DNA等。从而改善了整个机体代谢，限制了肿瘤的发展。又目前已知癌变与细胞中CAMP癌细胞中CAMP含量降低，一般为正常细胞50%以下。如果增加细胞培养中CAMP的含量，可明显抑制癌细胞。大浦等人前已报告人参皂甙可促进糖类及脂质代谢，增加肾上腺CAMP含量，用人参和其他扶正药可能通过调节CAMP，以提高其他抗癌药疗效，延长癌患者的生存期。

《国外对人参成分、药理及临床的研究》（中医药国外资料摘译）78.4

水 银

辛寒有毒。

反胃吐食：水不能停。黑铅、水银各一钱半，结砂，舶硫黄各五钱，官桂一钱，为末，每服六钱，一半米汤一半自然姜汁，调作一处服。（圣济录）（卷九）

木 槿 花

甘平滑无毒。

反胃吐食：干叶白槿花阴干为末，陈糯米汤调送三五口，不转再服。（袖珍方）（卷三十六）

牛 喉：（白水牛者良）

疗反胃吐食，取一具去膜及两头筋节，以醋浸炙，燥烧存性，每服一钱米饮下，神效。（时珍。出法天生意）（卷五十下）

白水牛喉

噎膈结肠不通，醋炙五次，为末，每服一钱，饮下立效。（卷三上）

牛 口 涎

日华曰：以水洗老牛口，用盐涂之，少顷即出，或以荷叶包牛口，使耕力乏，涎出取之。

主治：反胃呕吐（日华）水服二匙，终身不噎。

噎膈反胃：集成，用糯米末，以牛涎拌作小丸，煮熟食。

危氏得效香牛饮，用牛涎一盞，入麝香少许，银盞炖热，先以帛紧束胃脘，令气喘解开，乘热饮之，仍以丁香汁入粥与食。

普济干嘔丹，用牛涎好蜜各半斤，木鳖仁三十个，研末，入铜器熬稠，每以二匙和粥与食，日三服。（卷五十下）

人工牛黄

医科院等用人工牛黄散（猪胆汁、甘草、朱砂、冰片）治食管癌6例，其中服药三个月的3例，1例有效，1例稳定，1例死亡。（中国医学科学院等食管癌防治研究队，抗癌简讯（1）：18，1974.

石 碱

辛苦温微毒；

治噎膈反胃；

多年反胃（方见铅下）消积破气：石碱三钱，山楂三两，阿魏五钱，半夏，皂夹水制过一两为末，以阿魏化醋煮糊丸服。（摘亥方）（卷七）

牛 乳

甘微寒无毒。

治反胃热哕。

【震亨曰】反胃噎膈，大便燥结，宜牛羊乳，时时嚥之，并服四物汤为上策。不可用人乳，人乳有饮食之毒，七情之火也。（卷五十下）

治反胃噎膈。

噎膈不通，服香燥药取快一时，破气而燥血，是速其死

也，不如少服药，饮牛乳加韭汁或姜汁陈醋为佳。《本草备要》
卷六

代赭石

苦寒无毒。

止反胃吐血鼻衄。（卷十）

《本草从新》代赭石，苦寒。治翻胃噎膈。

斑 鸠

肉：甘平无毒。

食之令人不噎（卷四十九）

明目愈噎《本草从新》

乌雄鸡肉

甘微温无毒。

反胃吐食：用乌雄鸡一只，治如食法，入胡荽子半斤在腹内，烹食二只愈。（卷四十八）

黄雌鸡肉

甘酸咸平无毒。

老人噎食：老人噎食不通，黄雌鸡肉四两，切茯苓二两，白面六两，作馄饨，入豉汁煮食，三五服效。（卷四十八）

反毛鸡

主治反胃：以一只煮烂，去骨。入人参、当归、食盐各半两，再同煮烂，食之至尽。《出乾坤生意》（卷四十八）

凤仙（急性子）

子，微苦温有小毒；主治难产积块噎膈。

噎食不下：凤仙花子酒浸三宿，晒干为末酒丸绿豆大，每服八粒，温酒下，不可多用。（摘玄方）卷十七下

化州桔红

治翻胃噎膈呕吐：

辰砂五香丸，治翻胃噎膈呕吐，张氏秘效方，用血竭、乳香、没药、辰砂各一钱五分，元胡一钱，化州桔红一钱，共为末，每三分，酒服。《本草纲目拾遗》卷七

石打穿

治噎膈翻胃

敏按：蒋仪药镜拾遗赋云，滚咽膈之疾，平翻哕之胃，石打穿识得者谁注，噎膈翻胃从来医者病者群相畏惧，以为不治之症，余得此剂十投九效，不啻如饥荒之粟，隆冬之裘也，乃作歌以志之，歌曰，……味苦辛平入肺脏，穿肠穿胃能攻坚；采掇茎叶捣汁用，蔗浆白酒佐使全；噎膈饮之痰立化，津嚙平

复功最先；世眼愚蒙知者少，岐黄不识名浪传。《本草纲目拾遗》卷五

石 莲 子

甘平无毒

反胃吐食：石莲肉为末，入少肉蔻末，米汤调服之。（直指方）（卷三十三）

甘 蔗

甘平无毒。

止呕哕反胃。

反胃吐食：朝食暮吐、暮食朝吐，旋旋吐者，用甘蔗汁七升，生姜汁一升，和匀，日日细呷之【注】。（梅师方）（卷三十三）

呷：读Xia，不读甲。

甘 遂

苦寒有毒。

主治：噎膈痞塞。

膈气梗噎：甘遂面煨，五钱，南木香一钱，为末，壮者一钱，弱者五分，水酒调下。（怪病奇方）（卷十七）

白 豆 蔻

辛大温无毒。

止吐逆反胃。 宽膈进食。 治噎膈。

脾虚反胃，白豆蔻、缩砂仁各二两，丁香一两，陈廩米一升，黄土炒焦，去土研细，姜汁和丸梧子大，每服百丸，姜汤下。名太仓丸。（济生方）（卷十四）

白 马 溺

辛微寒有毒。

破瘕坚积聚。治反胃杀虫。

痞块心痛，僵蚕末二钱，白马尿调服，并敷块上。（摘玄方）（卷五十下）

辽宁用新鲜便出之马溺治 8 例肿瘤，7 例有效。其中……6 例宫颈、食管、胃癌等患者经 3～6 个月随访，症状明显减轻。

也有的以马溺煮酸不浆草等治噎膈，有的以马溺醋淬鳖甲治胃癌。

（宽甸县下露河地区医院：辽宁抗癌战讯（7）：35，1972）

《从动物中探研抗肿瘤物质概况》姜廷良

载《中药研究》1977. 3

白 芷

辛温无毒。

翻胃吐食。

血风反胃，香白芷一两，切片，瓦炒黄为末，用猪血七片，沸汤泡七次，蘸末食之，日一次。（妇人良方）（卷十四）

白茅根

甘寒无毒。

反胃上气，食入即吐，茅根、芦根二两水四升、煮二升，炖服得下，良。（圣济总录）（卷十三）

白鼓钉

官游笔记口外白鼓钉即内地蒲公英，叶有锯齿，婆婆铺地，与内地生者回殊，内地者，花早开，单瓣；生沙漠者，花开于夏至前，宛似黄菊，一望灿然满地，其蕊瓣重叠，颜色娇媚，暮春草甫萌芽，口外啖此味，用之不竭，不啻春韭秋菘也，采食之，清火，亦为通淋妙品，其茎中折断有白汁。诸虫盛夏孕育，人手触之成疾，百药难效，取汁厚涂即愈。郑方升云，一茎两花高尺余者，掘下数尺，根大如拳，旁有人形拱抱，捣汁酒服，治噎膈如神。《本草纲目拾遗》卷八

半夏

辛平有毒。

治吐食反胃。

呕吐反胃，大半夏汤，半夏三升，人参三两白蜜一升，水一斗二升，和捣之，一百二十遍，煮取三升半，温服一升，日再服，亦治膈闲支饮。（金匱要略）（卷十七）