

又方苦瓠

一兩

蛇蛻

半兩

露蜂房

半兩

梁上塵

爲

末油調塗

又方伏龍肝

三分

亂髮

三分

爲末猪脂

和塗

又方取雞冠血塗

雞冠血和黃連末塗

煎鯽魚膏塗

生切鯽魚片和鹽貼患處

燒胡燕

窠水和塗之

紅絲瘡

有一種紅絲瘡雖非丹胗其毒實同多生於

兩手中指節上男左女右則尤甚也其狀但一水泡

清澄光瑩如小雞頭大其底下澣澣然數十小針孔

不痒不痛都無妨礙泡邊當有一絲脉如紅絲隱隱

在皮裏其行甚速循臂而上過肘則危至心卽死有

此證者急以針迎頭挑斷或刺耳塞或嚼白梅封之
絲卽不行紹興庚午無爲宰方梓字楚材與先子爲
同年秩滿代歸三日而殂詢其所以云無疾但左手
中指生一小水泡耳蓋不知其爲紅絲瘡也 又衛

提轄宜人云比鄰有女子忽中指節生一水泡色極
清澈其底盡細細針孔歷歷可數傍有紅絲一縷舉
家嬉笑忽有老嫗來見驚曰此紅絲瘡也當害汝命
急就其泡上灼艾數十壯仍於絲上數處挑斷遂免
惡核瘰癧巢氏云小兒遇風熱毒氣與血氣相搏結
成頑核生於頸項遇風寒所折不消結成瘰癧又而

潰膿成瘡也湯氏用宜服清涼飲子及升麻湯等
金連翹丸龍膽湯皆可服
瘰癧一證先賢名曰
九漏究其所因似熱稽考形狀非一不過隨象命名
大槩初發於頸項肌肉之間未成膿者從本引末可
使衰去針之灸之傳之從其所因而施療然小兒幼
弱豈堪針灸但以服餌塗貼之劑爲治此疾多生於
耳後及頸項兩旁初發止是一枚次必連生大小十
數纏繞項下累累如貫珠逐箇先腫作膿穿破輕者
可愈重者難除先穴漏膿長歲不乾謂之漏項原其
得病之初自是三陽感受風熱與血氣相搏而成治

以百解散加當歸散水薑蔥燈心煎服次用玄參飲
及牛蒡湯木通散內消丸與之宜熱化毒洗以槲皮
散塗用白芨散二香散使氣血行膿乾汁盡則自愈
矣仍忌燥毒野味其證不致再作

薛胎毒癰瘰者乃稟肝膽二經鬱火氣滯所致蓋肝
膽經行人身之側若因肝火動而受患故發於肝膽
二經部分當審其因而藥之或因乳母恚怒或血虛
內熱者當審其所因而調其母不可用峻厲之藥恐
傷元氣也 一小兒落草頸間有癰五枚審其母素
多怒時常寒熱或乳間作痛或脇肋微腫悉屬肝膽

經證先用小柴胡湯加當歸芍藥寒熱頓退又用加
味逍遙散母服兩月餘其兒亦愈 一小兒因乳母

肝經有熱耳前後患之用加味逍遙散治其母其兒
自愈 一小兒頸間耳下各結核三歲久服消毒之
劑患處益甚元氣益虛診乳母素鬱怒致肝脾血虛
而有熱用加味歸脾湯為主佐以加味逍遙散母熱
漸退却與兒日各數匙兩月餘而愈 一小兒自落

草時頸間患有四枚至五歲耳前後如貫珠元氣虛
甚寒熱往來飲乳不徹此稟肝膽經氣滯之證用八
珍逍遙二散與壯年婦人服之兒飲其乳半載之後

兒體漸充其核漸消又服地黃丸逍遙散而全愈
一小兒生下頸間癰癰三枚將期敷藥延及耳前余
謂此稟肝膽二經所致診其母肝膽脉尚洪數余謂
母子一體治其母兒自愈不信另用必効散一服吐
瀉並至一夕而歿

熱毒癰癰乃手足少陽足厥陰二經風熱之證或肝
疳食積所致其證發於項腋或耳前後或如貫珠當
分表裡虛實若炊赤腫者肝經熱毒也用人參敗毒
散作痛寒熱者肝火內作也用加味小柴胡湯不痛
而小便黃肝血虛也用六味地黃丸隱於肉裏而色

不變者肝疳內作也用九味蘆薈丸膿成而不潰或潰而不斂者脾氣虛弱也用益氣養榮湯凡此腫癰疼痛寒熱作渴者屬病氣有餘形氣不足治宜清肝火生肝血腫硬不潰潰而不斂者屬病氣形氣俱虛治宜補腎水實脾土若因乳母恚怒肝火遺患者又當隨所因而治之 一小兒膿水淋漓其核未消發熱憎寒此肝經氣血虛而有熱也用補陰八珍湯為主間以清肝益榮湯而愈後復結核小便赤澀哺熱作渴用參朮柴苓湯爲主佐以六味地黃丸料加柴胡山梔及四味肥兒丸而斂 一小兒十五歲患此

發熱作渴日晡頰赤脉數無力屬陰虛而有熱用補
陰八珍湯五十劑加參芪又二十劑而潰但膿水清
稀肌肉不生此脾氣虛弱也以參芪歸朮爲主佐以
芍藥熟地黃麥門五味氣血乃復遂進必効散一服
毒下而痊 一小兒患此服尅治之藥致寒熱腹膨
此肝脾疳證先用五味異功散加柴胡升麻佐以九
味蘆薈丸漸退又用四味肥兒丸五味異功散而消
一小兒九歲患此面色常青腫硬不潰肉色不變
乃伐肝化痰余曰當調補肝脾不信果虛證蜂起復
請治仍欲伐肝余曰面帶青色肝虛而本色見也面

色變白肺虛而本色見也痰涎上湧脾虛而不能攝也兩目連劄肝血虛而生風也經云胃為五藏之本當先救胃氣遂用五味異功散加升麻柴胡元氣稍復乃朝用補中益氣湯夕用五味異功散佐以九味蘆薈丸面色始黃而核漸消又以四味肥兒丸間服地黃丸而愈

百解散

驚

當歸散

潮熱

牛蒡湯

咽喉

大聖散

治癰癰消風毒腫上壅內熱多生癰疹風

丹風證食煎燂多致此疾

羌活

荊芥

升麻

薄荷

防風

甘草

大黃

黃芩

玄參

各等分

或加赤芍藥連翹

右為末每二錢水一盞煎六分溫服又方用牡蠣

二兩火鍛為末玄參二兩甘草半兩為末每服二錢茶清

調下

玄參飲 治瘰癧及頭上生惡核腫痛

玄參

升麻

川烏

炮裂去皮脂

草烏

炮裂去皮

當歸

酒洗

川芎

赤葛

生乾地黄

赤芍藥

各二

甘草 三

大黃

半生半
炮四

右剉每服二錢水一盞薑三片煎七分無時溫服

升麻湯

升麻

射干

連翹

犀角屑

大黃

微炮

硝

各半

右咬咀水煎大小加減忌酒麵炙煖物

木通散

淋

柴芍參苓飲

治肝火血熱遍身搔痒或起赤暈或

筋攣結核

柴胡

芍藥

人參

白朮

茯苓

陳皮

當歸

牡丹皮

山梔炒

甘草炒各三分

右薑棗水煎服

清肝益榮湯

治肝膽經風熱血燥筋攣結核或作

瘕子

柴胡

龍膽草

酒拌炒各伍分

當歸

川芎

芍藥

各一

熟地黃

自製

白朮

炒

不瓜

不犯鉄器

山梔

炒

茯苓

薏苡仁

各伍分

甘草

三分

右水煎服

加味小柴胡湯

治肝膽經風熱耳前後腫痛或結

核癰痛或寒熱晡熱口苦耳聾等證

柴胡

二斤

黃芩

炒一

人參

半夏

各柒分

甘草

炙伍

山梔

牡丹皮

各一

右薑水煎徐徐服

去山梔牡丹皮即小柴胡湯

益氣養榮湯

治氣血虛弱四肢頸項等處患腫不

問腫潰日久不斂俱宜服之

人參

茯苓

陳皮

瘡癰

外科

卷

貝母

香附炒

當歸酒洗

川芎

黃芪炒

熟地黃自製

芍藥炒各

甘草炙

桔梗各伍分

白朮炒

柴胡六分

右每服二三錢薑水煎

必効散 治癰癰元氣無虧者宜用此方若元氣怯

弱者宜先補而後服之癰每已下便與滋補庶無

他患若孕婦及虛勞氣鬱所致者尤不可服世以

此方為良劑故併注之

南鵬砂二分

輕粉一分

麝香伍分

巴豆

五粒去皮心膜

白欖榔

去箇

蟹螯

四十箇去頭足翅同

糯米炒去米

右爲末取雞子二箇去黃用清調藥入殼內以濕紙數重糊口甑蒸熟取出曝乾研細每服五分用炒生薑酒五更調服如毒出小便澀痛用益元散一服其毒出而不痛

貼惡核方

赤小豆

猪牙皂莢

硝石

黃藥

木鼈子

各半

右末雞子清調塗患處

貼散癰癰神効方

白膠香

降真香

用心無土氣者海螵蛸

右等分為末糝患處外以水紙掩之一夜而退

興化李八哥傳貼癰癰膏藥未破者即消已破者即

出惡物收斂神驗良方

輕粉

麝香

珍珠

血竭

沒藥

乳香

黃蠟

銅青

松香

各六分

八分

杏仁

二十枚去皮尖

蓖麻子

十枚

以上十一味各研極細末攪和用磁杵鉢搗成泥