

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷七十三



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

參方
 更不
 木出
 才熱
 白
 散
 或
 五
 苓
 散
 加
 木

明 薛已 訂

恐欲起驚小便不利導
 尿犀角湯初出不快小
 白朮散或五苓散加木

通收靨之後小便不利煩熱而渴猪苓湯竊謂前症當分所因若小腸熱結用導赤散肝經熱用柴胡麥門冬湯脾經熱用犀角湯肺經熱用生地黃湯腎經熱地黃丸靨後氣血虛弱用八珍湯中氣虛弱用五味異功散一小兒小便不利口舌生瘡乾渴用導赤散加味四物湯而膿貫又用白朮散去木香治之而愈

一小兒小便不通口舌如糜作渴面赤左尺脉數此膀胱熱結先用五淋散而小便利又用地黃清肺飲參芪

四聖散而愈

一小兒小便數而欠利面赤口渴兩足發熱此稟陰虛也地黃滋腎二丸煎服用四劑而愈又用地黃丸料加黃芪當歸而痊愈

一小兒痘將愈小便不利服五苓散之類小便愈少喘咳唾痰此脾肺復傷也先用補中益氣湯三劑送滋腎丸却用補中異功二藥而痊

八正散治下焦積熱大小便不通或小便淋瀝脉症俱

實者

大黃

酒炒

車前子

炒

瞿麥

篇蓄

山梔

炒

木通

各一錢

錢

滑石

煨二錢

甘草

一錢

右每服二錢水煎

滋腎丸為末水糊

黃柏

炒黑

知母

炒黑

各二兩

肉桂

二錢

益元散治痘疹初起煩躁作渴小便不通

滑石

六錢

甘草

一錢

每服五六分白湯調下

導赤散治小腸實熱生瘡作渴發熱小便秘赤或小便

不利者

方見作
痺搔破

柴苓湯治疹瀉小便不利

方見
症症

五苓散

茯苓

猪苓

白朮

澤瀉

各等分

肉桂

減半

右為末每服四分白湯下

黃芩清肺飲

黃芩

炒

山梔

炒等分

右每服二錢水煎

生地黄湯

生地黄

五錢

麥門冬

七錢

杏仁

去皮尖二錢

款冬花

陳皮

各三錢

甘草

二錢五分

右每服二三錢水煎

紫草木通湯治痘疹出不快小便不利

紫草

人參

木通

茯苓

糯米

各等分

甘草

減半

柴胡麥門冬散方見作

犀角湯方見頂

仙聖散方見痘

加味四物湯方見痘

白朮散即七味

六味地黃丸二方見發

痘便血或黑屎

聞人氏云痘瘡大便下血或黑糞若睡而不醒是為惡

候乃內熱盛也用犀角地黃湯抱龍丸小柴胡湯加生地黃主之竊謂前症若寒熱作渴小柴胡加生地黃發熱體倦用五味異功散加當歸口乾作渴用人參白朮散大凡作渴引飲發熱者屬實熱作渴飲湯手足不熱者屬虛熱手足逆冷者屬虛寒治者審之

一小兒出痘便血痘赤痛如錐或瘡內出血余謂肝火熾盛用小柴胡湯加生地黃一劑隨用犀角地黃湯一劑而痊

一小兒痘瘡下血且不起發先君謂氣血不足用紫草快癍湯加參芪歸朮血頓止瘡頓起用八珍湯而愈

一小兒痘瘡下血小便赤色瘡色如赭發熱飲冷二便不利先君謂心小腸實熱用八正散後用解毒防風湯及飲芹菜汁而痊

一小兒痘疹便血倦怠作渴飲湯余謂倦怠便血脾虛下陷也少食作渴津液枯涸也用五味異功散加紫草而愈

一小兒便血腹脹困倦身熱口乾飲渴四肢逆冷先君
謂脾氣虛寒不能攝血用五味異功散加丁香炮薑二
劑血止痘貫而靨

一小兒痘將愈而便血面白惡寒大便欲去而不去余
謂此元氣虛而下陷也用益氣湯不信服涼血之劑致
吐瀉腹痛而歿

一小兒痘將愈患便血面白惡寒手足並冷脉沉細如
無余謂陽氣虛寒欲用人參薑桂不從翌日而死手足

青黑惜哉

解毒防風湯治痘瘡毒氣熾盛便血

防風 地骨皮 黃芪 白芍藥炒 荆芥 牛蒡

子各等分

右每服四錢水煎或為末白湯調下

紫草快癰湯治痘疹下血不能起發出不快色不紅活

等症

即紫草湯方見頂陷心煩

聖濟犀角地黃湯治熱毒內蘊煩躁作渴面色赤大便

黑屎或神昏便血

方見痘作渴

小柴胡湯治肝經有熱不能藏血而便血

方見痘身痛

五味異功散治脾胃氣虛不能統血而大便下血

方見寒戰

咬牙

八珍湯治氣血不能攝血而便血

方見頂陷白

八正散治心小腸有熱小便赤澀大便下血

方見痘小便利

七味白朮散

即人參白朮散方見痘發熱

痘瘡坼裂出血

聞人氏云痘瘡大便不通小便如血或結癰毒身痘破裂乃內火熾盛失於解利急用犀角地黃湯小柴胡湯加生地黃四順飲之類治之竊謂前症若心脾熱盛用犀角地黃湯心肝熱盛用小柴胡湯加生地黃若大便不通先用四順飲次用犀角湯若色赤焮痛二便不通急用活命飲加硝黃若色赤焮痛惡寒發熱用活命飲加麻黃若因乳母怒火用加味逍遙散加味歸脾湯一小兒痘根赤色寒熱作痛此肝經有熱也先用加味

小柴胡湯二劑諸症漸退又用加味道遙散一劑而貫
膿末用八珍湯而醫

一男子痘根赤痛發熱作渴服紫草飲痘裂出血余謂
心肝二經風火相搏先用小柴胡湯加生地黃犀角二
劑用聖濟犀角地黃湯而愈

一小兒患前症大便不利小便赤澁作渴飲冷先君謂
脾胃實熱先用涼膈散一劑漸愈又用犀角地黃湯并
菜汁而痊

一小兒患此診乳母有鬱火用加味道遙散加味歸脾湯而痊同時患是症而用雜藥者俱致不救涼膈散治上焦實熱煩渴面赤咽燥喉痛便溺赤澀狂言譫語睡臥不安

大黃 朴硝 甘草 連翹 山梔 黃芩 薄

荷葉

各等分

右為細末每服少許煎竹葉密湯調乳母同服

加味清胃散

方見痘癰