





早晨疼痛



唐孫真人思邈氏  
原輯  
清周亮節生之氏  
較正

問曰早晨痛至午者何也答曰早晨至午皆陽旺是虛陽攻  
上頭風攻注為諸陽之首早晨人動則血運赤陽轉于首與  
風氣相攻早晨疼痛兩皆宜服川芎散白蒺梨散  
川芎散 石菖 附子 甘草 羌活 菊花  
地骨皮 右等分水煎服 白蒺梨散方在府風

午後疼痛



問曰人之患眼午後至夜漸加疼痛者何也腦虎陽毒勝也  
人身之血午後行于陰道至夜歸于肝之司况腦匿陰毒勝  
故午後漸疼痛昏花也治之須用回陽湯次以夜光推紅月  
回陽湯治眼珠淡紅羞澀難開宜服


附一 人參 當歸 川芎 赤芍藥 茯苓 五味子

細辛 車全子 甘草

右每服東子一枚姜三片水煎半飢服

夜光柳紅丸方 狂風傷肝出膿症內 風濕傷用

痛極增寒



問曰人之患眼痛而增寒者何也答曰此乃氣衰血盛經白  
血榮氣衛足厥陰主血榮陰也衛為陽今氣衰血旺乃陽不  
盛陰故痛極而惡寒也宜服附子猪苓湯白水湯主之

附子猪苓湯

白芍藥

甘草

羌活 附子

加黃芩

柴胡

右每服五錢水煎服之

白朮湯

白朮

川芎

蔓荊子

沒藥

白蒺藜去刺黃芩

防風

五味子

菊花

甘草

右各等分水煎服

問曰人之患眼痛而體熱者何也答曰胃屬陽而發熱榮屬

陰而發寒榮衛為陰陽之道也在上屬心肺在下屬肝腎今  
乃氣旺而血衰是陽多陰少故痛而体熱是挽邪歸于心也  
宜服洗心散解明散

洗心散

大黃

赤芍藥

荆芥

黃芩

當歸

連翹

薄荷

甘草

鮮明散

當歸

赤芍藥

黃芩

菊花

柴胡

地骨皮

車全子

桔

根

生地黄


枝子

連翹

兩

右各等分  
水煎服

血瘀停臉



問曰人之患  
停癰濕也或

眼臉停瘀血者何也答曰此乃肝氣凝滯脾胃  
因天行赤眼之後起之太早不能調養則使血



下胞臉之間名曰癰  
盡膏服退赤散當歸散

血治之須審上下胞臉兼洗瘀血至

退赤散

大黃

黃芩

黃連

白芷

當歸

芍藥

枝子

桑白皮

右各等分水煎服

當歸散

當歸

生地黄

赤芍藥

川芎

甘草

菊花

木賊

黃芩

大黃

梨

水通枝子

右各等分水煎服

不赤而痛



問曰人之患眼不痒不赤而痛者何也答曰氣腦虛也榮衛不和氣血凝滯亦有也七情鬱結肝風沖上腦中風氣相攻故不痒不赤而痛初患急服藥恐變為五風內障難治宜服

透紅勻氣散川芎散助陽和血湯

透紅勻氣散

當歸

細辛

白芷

沒藥

澤南

甘草

茴香

天仙藤

厚朴

乳香

肉桂

黑牽牛

生地黄

羌活

一右為末每服

三錢熱酒調下

川芎散

川芎

菊花

細辛

鼠粘子

石膏

姜蚕

蒺藜

略

一右為末每服


二錢米湯下

助陽和血湯

方在傷寒熱

病後症內

赤而不痛




問曰人之應眼赤而不  
利心火炎也人身之血

痛者何也答曰肝熱也膀胱澀而不  
若河澤之流此有川澤疏通必歸

精勝光壅塞則洪水安流人之而順則經絡流利上下相  
接迴而復始逆則散湯安行上注于目故赤而不痛也今  
光不利心火上炎肝經寔熱豈不若川澤之壅塞也治之須  
用八正散導赤散順肝丸服之

入正散導赤散二方肝丸在火條下  
當歸 麝仁三十 右共為末煉蜜為丸

左赤傳右



問曰左赤傳右何也答曰此陰經火熱也陽中行陰也肝也  
陰中行陽心也邪熱攻積于肝也肝邪交于心傳于目也左



左目屬太陽右目屬太陰故左赤傳右太陽經旺也宜服三

黃丸洗心散

三黃丸

方任大醫赤脈症內

熱甚加

黃柏

洗心散

大黃

赤芍藥

當歸

甘草


荆芥

麻黃

枝子酪

一右各等分水煎服

右赤傳左



問曰右赤傳左何也答曰此陰經火旺脉有陰經及陽絡

屬于肺氣者肺之精也故右赤傳左乃肺經邪熱陰絡火旺

宜服泄肺散一曰陰虛命門火旺也

肺散

方在膜入水輪症內桑白散

治肺氣壅塞邪熱上攻眼目白翳

眼目夜痛心煩悶

桑白皮


玄參

升麻

杏仁

覆花 赤芍藥 菊花 葶藶 防風 黃芩 枳殼  
 甘草 炙甘草 每服水一鍾半 姜三片 煎至八分 食遠溫服

# 胞腫如桃



問曰人之患眼胞腫如桃者何也答曰此乃脾肺之熱  
 熱邪客于腠理致上下胞腫如桃痛澁淚出不絕之注桃目  
 治之用桃葉烘熱熨其腫處宜服此散清涼散羌活除風湯  
 蟬花散主之

此散清涼散 升麻 赤芍藥 川芎 柴胡 枳殼 三玄參  
 黃芩 荆芥 甘草 白朮 枝子 赤茯苓 乾葛


草決明 右爲末每服六錢水煎服

羌活除風湯 羌活 獨活 川芎 桔梗 大黃 地骨皮

黃芩 醋一麻黃 蒼朮 甘草 菊花 木賊 右水煎服

蟬花散 方在花翳自陷症內

# 視物不真



問曰人之患眼視物不明如紗遮睛何也答曰此血衰氣旺  
血爲榮氣爲衛七爲陽而氣清榮爲陰而氣濁素問曰清氣  
爲天濁氣爲地清陽發腠理濁陰走五臟者心肝脾肺腎也  
眼有五輪內五臟腎屬于木輪爲瞳人腎水衰不能濟于肝

大使用木血衰不榮于眼目故睛少短不能久視腎衰不爲  
心火交齊故心火上炎眼目必熱則看物不準今腎水衰乃  
虛陽攻上肝血衰故目不得血豈非血衰而氣旺也服駐景  
丸補腎四順涼肝散

賢景丸

川椒去刺瞿實子

五味子

枸杞子

乳香人參

祿一免絲子

肉蓯蓉焙五

右煉蜜爲丸鹽湯下

四順涼肝散

荊芥

川芎

當歸

防風

赤芍藥

甘草

漢防已

右各等分水煎溫服

室女逆經



問曰人之患眼女子逆經血灌瞳人滿眼赤澁者何也答曰此乃室女或肥壯婦人血熱經閉過期不行則血逆行於上注于目灌于睛外皆紅色或身睛上起如弩肉治之切不可鉤割只用下氣破血通經之藥其血翳自退宜服調經散破血紅花散順經湯導赤散

調經散 香附米 當歸尾略一大黃短 黃芩兩一黃連生薑

赤芍藥 川芎羌活 枝子 薄荷 木賊 蘇木 紅花

甘草各兩 破血紅花散方在血翳包睛症內治室女逆經眼赤痛生

順經湯 能通經行血止痛 當歸尾 川芎 枳殼 小茴香

柴胡 陳皮 玄胡索 白芍藥 青皮 香附子 桃仁


紅花 肉桂 熱甚加黃連 右各等分水煎食後溫服

導赤散 方在大醫赤脈症內

養血散 方在愈肉生瘡症內



血室凝痛



問曰婦人遇行經之際眼目澁痛者何也答曰肝虛也凡婦人稟受虛者眼中原有病根若遇行經之際去血過多肝經愈加虛損故使眼目轉加疼痛腫澁難開頭痛眩暈生翳于黑睛上或如粟米或如花翳白陷者皆因肝衰虛也宜服當歸補血散煎以丸一丹

當歸補血散

當歸

川芎

白芍藥

防風

細辛

菊花

甘草

車前子

葵梨

白朮

羌活

羌蔚子

薄荷各

百大黃

五錢

右每


服八錢

水煎入

酒三盞

溫服

# 白睛黃赤



八物湯 治虛損血枯上攻眼目  
 黃芪 茯苓 熟地黃 川芎  
 當歸 人參 菊花 白芍藥  
 右每復半飢溫服

問曰白睛漸上黃赤者何也答曰酒毒也酒能發陽過飲無  
 度脾經受濕傷肝胆助火火傷于肺經白仁屬肺故曰仁黃  
 赤者酒之過也引血傷于肝肝受其血熱自上朝于目日受  
 其酒之熱毒灌注睛輪黃赤宜服黃連解毒散服數貼之後  
 點以清涼散

黃連解毒散 黃連 黃芩 黑參 龍胆草 荊芥 枝子

天花粉 茵陳 生地黃 車前子 枯梗 連翹

右每服水煎加童便三次溫服

金涼膈散

黃連

黃芩

枝子

連翹

葶歷

桑白皮

麥門冬

天花粉

赤芍藥

乾葛

荆芥

杏仁


青皮

甘草

右水煎加

蜜一盞人內煎一沸食後溫服

# 患眼頭疼



問曰人之患眼偏正頭痛者何也答曰風毒甚也頭風在右者屬痰屬熱用蒼朮半夏熱用酒製黃芩在左屬風及血虛風用荆芥薄荷血虛者用芎藭芍藥酒製黃柏此三症看血用之有驗治法痛甚者酒調散表之熱痛者石羔散清空散川芎茶調散冷痛者酒調散川芎散神清散土之風毒作痛

菊花散如神散主之不必点丹

酒調散

下桑螵蛸的

方在暴風客熱症內

灸穴 百會一穴

神聰四穴

臨泣二穴

聽會二穴

耳尖二穴

風池二穴

光明二穴

太陽二穴

率骨二穴

定髮際并点各穴

法則參入餘偏則餘處

前眉心平以墨点

記以草比同身十三寸目眉心比至草尺處是前髮際亦以

墨点記是後髮際又將草自前髮際比至後髮際平折摘去

一節又將草均分作六摺摘一摺止存五摺以比草目前髮

際比至草盡處是百會穴

又以百會穴為中四邊各開一寸半乃神聰穴也

灸耳尖穴神聰將耳摺轉尖上比寸半盡處是率骨穴考

臨泣穴

以童人對眉尖上點為記以草自点比上三寸半

光明穴

對童人上眉中是光明穴

潰竹穴

眉頂兩陷中是潰竹穴