

欽定四庫全書

子部
婦人大全良方卷十二



南京中医药大学图书馆版权所有

卷之四

天 下

外科疾病

日吉
 辰者
 天已
 是壽
 長月
 隨
 數服藥
 石始不飲春

宋陳自明撰

次知之姓

當對證依法治之

息法第一 凡二十方

熟酸美受御宜食大麥

又妊娠一月足厥陰脉養不可針灸其經足厥陰內屬於肝肝主筋及血一月之內血行否澁不為力事寢心安靜毋令恐懼

又妊娠一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服烏雄雞湯方

烏雄雞一隻治如食法 吳茱萸一升 茯苓 阿膠各二兩 生薑

甘草各一兩 人參 芍藥 白朮各三兩 麥門冬伍合

右十味細切以水一斛二升煮雞取汁六升去雞下藥

煮取三升并膠烊盡取三升去滓溫服一升日三服
內酒三升

又若曾傷一月胎者當預服補胎方

北細辛一兩防風二兩烏梅一升吳茱萸五合乾地黄

白朮各一兩大麥五合生薑四兩

右呖咀以水七升煮取二升半去滓分溫三服若寒
多者倍細辛茱萸熱多渴者去細辛茱萸加栝樓根
二兩若有所思去大麥加栝子仁三合一方有人參
一兩忌生菜蕪荑桃李雀肉等物

妊娠二月名始膏母食辛臊居必靜處男子勿勞百節以痛是謂胎始結

又妊娠二月足少陽脉養不可鍼灸其經足少陽內屬於膽膽主精二月之時兒精成於胞裏當謹護驚動

又妊娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎卒中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所下乍寒乍熱艾湯主之方

丹參

三兩

當歸

人參

麻黃

去節

艾葉

阿膠

炙各二兩

甘草

炙 一兩

大棗

十二枚 擘

生薑

六兩

右九味切以酒三升水一斗內藥煮減半去滓內膠煎取三升分溫三服忌海藻菘菜

又若曾傷二月胎者當預服黃連湯方

黃連

人參

各一兩

吳茱萸

五合

生地黃

五兩

生薑

三兩

右五味切以醋漿七升煮取三升分四服日三夜一每十日一作若頗覺不安加烏梅一升加烏梅者不用漿直用水耳忌猪肉冷水蕪荑一方當歸半兩

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐清虛是謂外象而外感者也

又妊娠三月手心主脉養不可鍼灸其經手心主內屬於心無悲哀無思慮驚動

又妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不赤即黃卒驚恐憂愁瞋恚喜頓仆動於經脉腹滿繞臍苦痛腰背痛卒有所下雄雞湯方

雄雞一隻治如食法甘草炙茯苓人參阿膠各二兩黃芩

白朮各一兩芍藥四兩麥門冬去心五合大棗十四枚擘生薑一兩切

右㕮咀以水一斛五升煮雞減半內藥煮取一半入

清酒三升并膠再煎取三升分三服一日盡之當溫

卧忌海藻菰菜酢物桃李雀肉等一方有當歸川芎二兩無黃芩生薑

又若曾傷三月胎者當預服茯苓神湯方

茯苓丹參龍骨各一兩阿膠當歸甘草炙

人參各二兩赤小豆二十粒大棗十二枚擘

右呔咀酢漿一斗煮取三升分四服七日後服一劑腰

痛者加桑寄生

二兩

深師方有薤白

二兩

麻子

一升

忌同前

妊娠四月始受水精以成血脉其食稻粳其羹魚鴈是謂成血氣以通耳目而行經絡

又妊娠四月手少陽脉養不可鍼灸其經手少陽內輸三焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食又妊娠四月為離經有寒心下溫溫欲嘔胃膈滿不欲食有熱小便難數數如淋狀臍下苦急卒中風寒頸項

强痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胃
煩不得安卒有所下菊花湯方

菊花

如雞子
大一枝

麥門冬

去心
一升

麻黃

去節

阿膠

炙各
三兩

生薑

五
兩

甘草

炙

當歸

半夏

洗各
二兩

人參

一兩
半

大棗

十四
枚擘

右細剉以水八升煮減一半內清酒三升并阿膠煎

取三升分三服溫卧當汗以粉粉之護風寒四五日

忌羊肉海藻松菜飴等

又若魯傷四月胎者當預服調中湯方

芍藥

四兩

甘草

炙

芍藥

續斷

各一兩

柴胡

白朮

各三兩

烏梅

升

生李根白皮

三兩

當歸

一兩

生薑

四兩

厚朴

炙

枳實

炙各二兩

右細切以水一斛煮取三升分四服日三夜一八日

再服一劑一方有半夏二兩忌海藻菰菜桃李雀肉

妊娠五月始受火精以成其氣晏起沐浴浣衣居處必

厚其衣裳朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和

菜羹調以五味是謂養氣以定五藏

又妊娠五月足太陰脉養不可鍼灸其經足太陰内輸
於脾五月之時兒四肢成無大饑無甚飽無食乾燥無
自炙熱無大勞倦

又妊娠五月毛髮初生有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦
腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處
腹痛悶頓欲仆卒有所下阿膠湯方

又名旋覆花湯

阿膠

四兩炙

人參

一兩

麥門冬

去心一升

生薑

六兩

吳茱萸

七合

旋覆花

當歸

芍藥

甘草

炙

黃芩

各二兩

右細切以水九升煮取一半內清酒三升并膠微火煎取三升半分為四服日三夜一先食再服便愈不差更服忌海藻松菜

又若曾傷五月胎者當預服安中湯方

甘草

炙芍藥各三兩

當歸

人參

乾地黄

芍藥

各二兩

五味子

合生薑六兩

麥門冬

去心一升

大麻仁

合大棗三十五枚擘

黃芩

一兩

右細切水七升清酒五升煮取三升半分四服日三

夜一七日再服一劑忌如前

小品療妊娠五月舉動驚愕胎動不安下在小腹痛引腰脇小便疼下血安胎當歸湯

當歸 阿膠 芎藭 人參各一兩 棗十二箇 艾一虎口

右細切以酒水各三升合煮至三升去滓內膠令烱分三服腹中當安小便緩也古今錄驗救急同一方有甘草無參棗

妊娠六月始受金精以成筋身欲微勞無得靜處出遊

於野數觀走犬馬食宜鷙鳥猛獸之肉是謂變腠理紐筋以養其力以堅背脊

又妊娠六月足陽明脉養不可鍼灸其經足陽明內屬於胃主其口目六月之時兒口目皆成調五味食甘美無大飽

又妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體腫驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼麥門冬湯方

麥門冬去心一升 甘草炙 人參各一兩 乾地黄三兩 黃芩二兩

阿膠四兩生薑六兩大棗十五枚擘

右八味切以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取三升分三服每如人行三四里中間進糜粥忌海藻菰菜蕪荑

又若曾傷六月胎者當預服柴胡湯方

柴胡四兩芍藥一方作紫葢白朮甘草炙各二兩麥門冬三兩去心

茯苓一兩芎藭二兩乾地黄五兩生薑六兩大棗三十枚擘

右十味切以水一斛煮取三升分四服日三夜一中

間進糜粥勿食生冷及堅強之物七日更服一劑忌

海藻菰菜蕪荑桃李雀肉等

一方有黃
芩二兩

集驗療妊娠六七月胎不安常處旋覆花湯

亦名
阻病

旋覆花

一兩

厚朴

白朮

枳殼

黃芩

茯苓

各三
兩

半夏

炒一
方無

芍藥

生薑

各二
兩

右細切以水一斗煮取二升半先食分五服日三夜

二忌羊肉鰾醋桃李雀肉千金同

妊娠七月始受木精以成骨勞身搖肢無使定止動作