

辨證錄

4

辨證錄卷之十

山陰陳士鐸敬之甫號遠公又號朱華子著述

會稽陶式玉商白甫號存齋文號
參訂

鶴膝門

人有足脛漸細足膝漸大骨中痰疼身漸瘦弱人以爲鶴膝之風誰知水濕之入骨乎夫骨最堅硬濕邪似難深入何竟入於膝乎此因立而行房所成也凡人行房必勞其筋骨至於精泄之後則髓必空虛髓空則骨空邪卽乘其虛空而直入矣若膝則筋骨聯接之處骨靜而

膝動動能變而靜不能變也不變者形消能變者形大
但其病雖成於腎精之虛而治病斷不可單治其腎因
所犯者濕耳濕乃陰邪陰邪必須以陽氣祛之腎之精
陰水也補精則精旺陰與陰合陰無爭戰之機不戰而
邪何能去故不當補精而當補氣方用蒸膝湯生黃芪
八兩金釵石斛二兩薏仁一二兩肉桂三錢水煎二碗先
服一碗卽擁被而卧覺身中有汗意再服第二碗必兩
足如火之熱切戒不可坐起任其出汗至汗出到湧泉
之下始可緩緩去被否則萬萬不可去也一劑病去大

半再劑病全愈此方補氣未免太峻然氣不旺不能週遍於一身雖用利濕健膝之藥終不能透入於邪所犯之處而祛出之也第大補其氣而不加肉桂之辛熱則寒濕裹住於膝中亦不能斬關直入於骨髓而大發其汗也至於絕不治風者以此病原無風也若作風治愈耗其氣安得取效哉

此症用加味芪

桂湯亦妙

黃芪三兩肉桂三錢破故紙二錢牛膝
三錢水煎服服必有大汗如雨二服愈

鶴膝之症有二一本於水濕之入骨一本於風濕之入

骨也前條乃言水濕入骨未言風濕入骨之症大約水濕之病骨重難移風濕之症骨輕可走至於痠痛則一也雖然痠痛亦有微別水濕之痛在一處而不遷風濕之痛移來移去而無定治法不可徒治風濕也用散膝湯治之黃芪五兩防風三錢肉桂五錢茯苓一兩水煎服服後亦擁被而卧聽其出汗不必驚惶汗出愈多去病愈速夫黃芪原畏防風得防風而功更大吾多用黃芪正恐人之難受加入防風能於補中以行其氣得肉桂之辛散引入陽氣直達於至陰之中又得茯苓共入

膀胱利水濕之邪內外兼攻內既利水而外又出汗何
風濕之不解哉惟是大汗淋漓人恐有亡陽之懼誰知
用散藥以出汗若爲可慮今用黃芪補氣以出汗乃發
邪汗而非損正汗也邪汗能亡陽正汗反能益陽此所
以二劑而收全功也

此症用薏米防

桑湯亦效

防風三錢桑葉二兩陳皮一錢破故紙二錢薏仁一
兩白朮一兩水煎服亦必出大汗而愈只消一劑也

癩風門

人有頭面身體先見紅班後漸漸皮破流水成瘡以致鬚眉盡落遍身腐爛臭穢不堪人以爲大麻風也誰知是火毒結成之病乎大麻風之病南粵甚多以其地長蛇虫熱毒之氣聚住於皮膚之間濕蒸之氣又藏遏於肌骨之內故內外交迫蘊結不能宣散反致由班而破由破而腐也此係最惡之病不特南粵多生此病也蓋毒氣何地蔑有濕熱乃天地所成正不可分南北也治法必以解毒爲先然而近人元氣虛者甚衆徒瀉其毒未

必不先損其正惟是補正又恐引邪入內要當於補中散邪爲妙方用散癘湯蒼朮三錢熟地一兩玄參一兩蒼耳子三錢車前子二錢金銀花二兩薏仁五錢水煎服連服十劑可半愈也再服十劑必全愈此方補腎健脾又有散風去濕化毒之品則攻補兼施正旺而邪退也倘純用寒涼或全用風藥鮮有奏功者矣

此症用黃金湯亦效

大黃五錢金銀花半斤水煎汁三碗分作三次服一日服完必然大瀉惡糞後單用金銀花三兩連服十日全愈

人有生大麻風者不必盡在兩粵之中往往居於兩粵之

外而亦生者人以火毒之入身也誰知盛酒罷之毒而成之者乎夫酒氣熏蒸最能害人或卧於酒糟之上或坐於酒缸之邊皆能成病大約多得之行房之後盡行房泄精則毛發盡開酒氣易中其病與大麻風無異但兩粵之病心相傳染於家人父子之間獨感酒毒而成者止在本人而他人無恙也治法雖瀉火毒仍須兼化酒毒爲妙方用解癘辟丹孩童二錢白朮五錢薏仁五錢黃連一錢玄參一兩金銀花三兩桂木枝三錢水蘿服連用十劑未爛者可愈已爛者再服二十劑可全愈

此方健脾去濕化毒解酒正氣無傷邪氣易退能止癰
風純是火毒單用祛毒瀉火之味置酒濕於不問非善
治之法也然酒濕之毒何以別之間酒香而生憎飲美
醜而柔疼此乃感酒毒而成者也倘若聞酒香而流庭
飲美醜而作癰者非感酒毒乃感火毒也

此病成於酒毒亦可用黃金湯加
柏木枝五錢煎前四二得瀉而愈

遺尿門

人有夜而遺尿者其人畏寒喜熱面黃鶴怯大便溏泄小水必勤人以爲小腸之虛誰知腎氣之虛乎夫腎與膀胱爲表裡膀胱之開闔乃腎主之也蓋膀胱奉令於腎腎寒則膀胱自不遵腎之令故腎不閉而膀胱亦不閉也治法約腎之水而水寒不若溫腎之水而水雜也方用溫泉飲白朮一兩巴戟天一兩益智仁三錢肉桂一錢水煎服一劑即止遺泄服四劑不再遺矣此方辨腎兩補之法肉桂溫命門之寒益智斷膀胱之漏且白朮

通腰臍之氣自然病與藥宜蓋遺尿之病雖成於腎寒亦由腰臍之氣不通則水不走於小腸而竟走於膀胱也通其腰臍之氣則水迂迴其途自走小腸小腸與心爲表裡而心氣能攝之而不遽遺也且白朮又上能補心之氣心氣虛則水瀉心氣旺而水又難瀉矣心腎交而泉溫亦心腎交而泉縮矣

此症可用萸桂

益桂湯治之

山茱萸五錢白朮一兩肉桂一錢益智仁一錢水煎服

人有年老遺尿者不必夜卧而遺也雖日間不睡而自遺

較前症更重此命門寒極不能制人也夫老人孤陽何至寒極而自遺乎蓋人有偏陰偏陽之分陽旺則有陰虛火動之憂陽衰則有陰冷水沉之患少年時過泄其精水去而火又何人水火必兩相制者也火無水制則火上炎水無火制則水下泄老人寒極而遺正坐水中之無火耳惟是補老人之火必須於水中補之以老人火衰而水亦不能甚旺也方用八味地黃湯熟地一兩山茱萸一兩山藥五錢茯苓二錢澤瀉一錢丹皮一錢附子一錢肉桂一錢水煎服連服二劑渴即止矣服十

日全愈約照此方分兩修合丸散每日服一兩永不再
遺八味地黃湯正水中補火之聖藥水中火旺則腎中
陽氣自能通於小腸之內下達於膀胱膀胱得腎之氣
能開能閉一奉令於腎何敢私自開關聽水之自出乎
氣化能出卽氣化能閉也惟是八味湯中茯苓澤鴻過
於利水老人少似非宜丹皮清骨中之熱遺尿之病助
熱而不可助寒故皆略減其分量以制桂附之橫斟酌
得宜愈見八味湯之妙然此方但可加減而不可去畱
加減則奏功去畱則寡效也

此症亦可用

老湯治之

熟地一兩 山茱萸一兩 益智一錢 肉桂二錢 遠志一錢
炒棗仁五錢 人參三錢 北五味二錢 水煎服

人有憎熱喜寒面紅耳熱大便燥結小便艱澀作痛夜卧反至遺尿人以爲膀胱之熱也誰知是心火之炎亢乎夫心與小腸爲表裡心熱而小腸亦熱然小腸主下行者也因心火太盛小腸之水不敢下行反上走而顧心及至夜卧則心氣趨於腎小腸之水不能到腎只可到膀胱以膀胱與腎爲表裡到膀胱卽是到腎矣然而膀胱見小腸之水原欲趨腎意不相合且其火又盛自能

化氣而外越聽其自行全無約束故遺尿而勿顧也治法將瀉膀胱而膀胱無邪將補膀胱而膀胱又未損正然則奈何瀉心火之有餘而遺尿自止矣方用清心蓮子飲加減治之茯苓三錢麥冬三錢竹葉三十片蓮子心三錢黃連二錢白芍五錢陳皮五分丹皮一錢大門冬三錢紫苑一錢玄參三錢水煎服一劑少利再劑大利三劑全愈此方專清心火不去止小陽之水蓋此等遺尿愈止而愈遣也

此症亦可后加減逍遙散治之
茯苓白芍各五錢山藥丹皮各三錢柴胡歸車前子各五錢山藥丹皮各三錢柴