

欽定四庫全書

子部

醫壘元戎卷六



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院八品吏目臣黃發

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

醫聖元戎卷六

三陽拾遺例

海藏通聖散評議

通聖散治雜病最佳治傷寒陽風有失其故何也防

風麻黃蔥豉汗也大黃芒硝下也梔子滑石利小便

也經云發表攻裏表自不同故發表不遠熱攻裏不

元 王好古 撰

遠寒仲景云當汗而反下之者逆也當下而反汗之者亦逆也又云桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛乃亡既有汗藥而復有下藥發表攻裏合而並進有失古人用藥之本意兼日使不宜遽利若利之過則燥而畜血汗之不當則生黃下之不當則結胸若藥隨虛實而變上行則有汗多亡陽之證下行則有下多亡陰之証其害非輕可不慎歟在太定間此藥盛行於世而多效何哉當時雖市井之徒口腹備衣著

全心志樂而形不苦雖然用涼亦多效而少失如今
之時乃變亂之餘壅鹽糟糠有所不克加以天地肅
殺之運五十餘年敢用涼藥如平康之世耶故多失
而少效有如仲景用桂枝當漢之末也韓祗和解桂
枝當宋之隆也其時世之異不可不知也兼犯藥三
禁傷風不宜汗而汗之一也傷寒不宜下而下之二
也小便不宜重利而利之三也若知此而不犯亦無
生黃畜血結胸之證故餘有白朮神朮二湯以革世

醫之弊云耳

韓氏微旨論和解因時法

李思訓保命傷寒論亦出此書

傷寒病有可汗者論中但統言其汗証及可汗脉或云脉浮弱或云脉浮而數或云脉浮緊或云脉浮無汗而喘或云脉浮為在表今畧舉數條後人但憑其脉之大概並不分脉浮有陰陽虛盛之理又不分有可汗不可汗之趣誤投發表藥則多變成陽毒之患今舉病人有汗惡風無汗惡熱分為三等及據立春已後至

立秋已前氣候輕重各方治之庶學者易為開誤耳

病人二三日已前兩手脉浮數或緩或急緊按之差
軟寸關尺若力齊等其力不甚大不甚小者亦未可
便投解表藥此是見表證未見表脉也直候寸脉力
小如關尺脉即可投表藥大抵治傷寒病見證不見
脉未可投藥見脉不見證雖少投藥亦無害矣凡治
雜病以色為先脉為後治傷寒以脉為先證為後病
人兩手脉浮數而緊名曰傷寒者若關前寸脉力小

關後尺脉力大雖然不惡風不自汗出此乃陰氣已
盛先見于脉也若不投藥和之後必惡風及自汗出
若立春已後至清明以前宜調脉湯主之清明已後
至芒種以前宜葛根柴胡湯主之芒種以後至立秋
已前人參桔梗湯主之

調脉湯方

葛根

一兩

防風

去虛頭
半兩

前胡

去苗
三分

甘草

各半
兩

右為粗末每服二錢水一鍾生薑一塊如小指大擘

破煎至七分去粗溫服如寸脉依前力小加棗三箇
擘破同煎

葛根柴胡湯方

葛根

二兩半

柴胡

去苗洗二兩

芍藥

二分

桔梗

三分

甘草

炙三分

右咬咀每服二錢水一鍾生薑二片煎至七分去滓

熱服如寸脉依前力小加葱白三寸同煎服

人參桔梗湯方

人參

三分

桔梗

兩三

麻黃

去節一兩

石膏

兩三

甘草

炙三分

右咬咀每服二錢水一鍾荊芥五穗煎至七分去粗
熱服如寸脉依前力小加麻黃二分去節同煎服

病人兩手脉浮數而緩名曰中風若寸脉力小尺脉
力大然不惡風不自汗出此乃陰氣已先見於脉若
於授藥和之後必惡風自汗出若立春已後清明以
前宜薄荷湯主之清明以後至芒種以前宜防風湯

主之芒種以後至立秋以前宜香薷湯主之

薄荷湯方

薄荷

一兩

葛根

半兩

人參

三分

甘草

炙三分

防風

去蘆半兩

右以咀每服三錢水一鍾煎至七分去粗熱服如三

五服寸脉力尚小加薄荷三分

防風湯方

防風

去蘆一兩

桔梗

三分

甘草

炙半兩

旋覆花

半兩

厚朴

去麁皮炙塗生薑汁三分

右吹咀每服三錢水一鍾生薑一塊如指大擘破煎至七分去滓熱服如三五服如寸脉力尚小加荊芥五七穗同煎

香芎湯方

川芎

一分

石膏

二分

升麻

三分

甘草

炙半兩

厚朴

半兩薑汁炒

右吹咀每服三錢水一鍾煎至七分去粗溫服如三

五服後寸脉尚小加細辛二分

前二段又將中風與傷寒各立法者何蓋謂病人始得病三日以前或因中風脉緩或因傷寒脉緊然脉雖先見而病證猶未見尚可以藥解之故各立方耳

病人兩手脉浮數或緊或緩寸脉短反力小於關尺脉若此名陰盛陽虛也若自汗出惡風者是邪氣在表陰氣獨有餘也素問曰陰氣有餘為多汗身寒是也即可投消陰助陽發表藥治之若立春以後清明

以前宜六物麻黃湯主之清明以後至芒種以前宜
七物柴胡湯主之芒種以後至立秋以前宜以發表
湯主之

六物麻黃湯方

麻黃

去節
一兩

葛根

三分

人參

半兩

甘草

炙半兩

蒼朮

去皮
三分

右㕮咀每服三錢水一鍾棗二枚煎至七分去滓熟
服如三五服後汗未止猶惡風者加荊芥三分如三

五服後不惡風猶汗自出者加舶上丁香皮半兩

七物柴胡湯方

柴胡

去苗
二兩

蒼朮

去黑皮
一兩

荊芥穗

一兩

甘草

炙一兩

麻黃

去節
一兩

右吹咀每服二錢水一鍾生薑一塊如指大擘破棗

二枚擘破同煎至七分去滓熱服如服三五服後汗

未止猶惡風者入葱白三寸如三五服汗猶未止者

加當歸一兩每服加棗三枚同煎服

發表湯方

麻黃

去節一兩五錢

蒼朮

去黑皮三兩

人參

半兩

當歸

去蘆頭半兩

甘草

炙五分

舶上丁香皮

三分

右咬咀每服三錢水一鍾入生薑一塊如指大擘破棗三枚擘破同煎至七分去滓熱服如三五服後汗未止猶惡風者加桂枝三分如汗未止更加細辛半兩以汗止為度病人脉浮數或緊或緩其脉上出魚際寸脉力大如關尺者此名陽盛陰虛也若發胃悶

口燥咽乾者乃是邪氣在表陽氣獨有餘也素問曰
陽氣有餘為身熱無汗是也可投消陽助陰藥以解
表若立春以後至清明以前宜人參湯主之清明已
後至芒種以前宜前胡湯主之芒種已後至立秋以
前宜石膏湯主之

人參湯方

人參

半兩

芍藥

三分

石膏

二兩

柴胡

去苗
一兩

甘草

炙三
分