# 欽定四庫全書

子部

三因極一病証方論卷五

南京中医药大学图书馆版权所有

宋 陳言 撰

診汗下致病不解壞証
候數變久而不瘥陰陽
寒瘥後經久精神不守

言語謬或潮熱煩赤寒熱如瘧昏沉不愈皆由汗下不正毒在心包間所致也

知母一兩　麻黃去節五錢　甘草炙　芍藥　黃芩　桂心各兩半

右剉散每服五錢水一盞半煎七分去滓溫服日三四服若心煩欲飲水稍稍與之

無憂散　治傷寒調理失序毒氣內結胸腹脹滿坐臥不安日久不瘥狂妄譫語大小便不通或復吐逆臘月黃牛胆一個以天南星為末入胆內縛令緊

當風避日懸之候乾取用

右為末以人參五錢煎湯七分分半盞調末二錢熱服遲遲更以熱人參湯投之或瞑便溺下黃黑惡物取效為度

黑奴丸　治傷寒調理失宜醫所不治及時行疫病六七日不汗脉洪數面赤目瞪身熱煩躁狂言欲走大渴或口噤精魂已散但心下煖挖開口灌藥下咽即活并治陽毒發斑

麻黃去節二兩　小麥奴一兩　大黃二兩　芒硝一兩　釜底煤一兩另研　梁上塵一兩另研　灶突墨一兩另研

右末煉蜜為丸桐子大新汲水研下二丸渴者與冷水盡量飲之須臾當寒竟汗出便瘥若日移五尺不汗依前法再服病人大渴乃可與之不渴者莫服

狐惑証治

狐惑証者默默欲眠目不得瞑惡飲食面目乍赤乍白乍黑齒無色舌上白聲啞咽乾此因大病後腸胃空虛

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

三蟲求食食人五臟食其咽則為惑其聲啞食下部則為狐其咽乾當看上唇有瘡蟲食其臟下唇有瘡蟲食其肛

## 桃仁湯

桃仁去皮尖 槐子 研艾各一兩

右剉散每服五錢水一大盞姜三片棗二枚煎七分去滓食前服

## 黃連犀角湯 治傷寒及諸病後有瘡出下部

黃連五錢犀角一兩無則以升麻代烏梅七個木香一分

右剉散每服五錢水盞半煎七分去滓食前服

雄黃銳散　治下部蟲瘡

雄黃研青箱子苦參黃連各二分桃仁去皮尖研一分

右末以生艾搗汁和丸棗核大綿裹納下部扁竹汁更佳無艾只用綿裹散子亦得

譫語症治

病有言語錯謬者其証有二有虛有實虛則鄭聲實則

譫語傷寒胃熱及三陽合病婦人熱入血室及下利而
譫語者皆屬實熱大小便利手足逆冷脉微細言語鄭
重者皆屬虛寒治之各有方虛寒宜温如四逆湯之類
胃實宜下承氣湯之類婦人熱入血室小柴胡湯若譫
語而反四肢逆冷脉沉細者不治

四逆湯 方見兩感

柴胡湯 方見少陽証

大承氣湯 方見陽明証

病後虛煩証治

大病後心虛煩悶發熱與傷寒相似但不惡寒與不頭疼為異汗下後人參竹葉湯嘔者橘皮湯諸病後多有此症各見本門

人參竹葉湯　治汗下後表裏虛煩不可攻者

竹葉　兩　半夏　二兩　半
把　人參　炙草　各三兩　石膏　麥冬　各五兩

右為剉散每服四錢水一盞半薑五片粳米一撮煎

至来熱去滓食前服

橘皮湯　治動氣在下不可發汗發之反無汗心中大煩骨節疼痛目運惡寒食則反嘔穀不得入宜服此方

橘皮一兩　炙草五錢　人參一分半　竹茹五錢

右㕮咀每服五錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去滓食前服

料簡

凡傷寒中雜病症狀非一當隨門類酌量施治可也如

發黃則多用五疸中藥只依黃疸治之發狂已見陽毒門吐衄便利瘀血見失血門下利見滯下奔豚見五積陰陽厥見厥論嘔噦喘咳見本門其他更不繁錄

## 傷暑叙論

傷暑者乃夏至前後各三十日有奇少陽相火用事之時也炎熱大行爍石流金草萎河涸人或傷之則發熱自汗面垢背寒倦怠少氣以暑消氣氣消血散與傷寒相類此是夏間即病非冬傷寒至夏發為熱病也當以

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

脉別之傷暑脉虛無力蓋因氣血消散致脉虛弱傷寒則氣血内閉脉緊而有力大不同也要畧言傷寒家別有暍病蓋詮次者見其一條別在後故有是說輕重不同識者知之

## 傷暑証治

病者身熱惡寒頭痛狀如傷寒或往來寒熱如瘧煩躁渴甚眩暈嘔吐背寒面垢泄瀉昏悶不清其脉陰陽俱虛緩而微弱皆由傷暑之所致也

却暑散　治胃暑伏熱頭目眩暈嘔吐泄瀉煩渴背寒面垢

赤茯苓　生甘草各四兩　寒食麪　生薑各一兩

右為末每服二錢新汲水調下或湯點不拘時服

五苓散　治傷暑煩渴引飲無度兼治傷寒溫熱表裏未解煩渴引飲水入即吐或小便不利或汗出表解渴不止又治霍亂吐利黃疸溫疫

澤瀉二兩五錢　桂心一兩　猪苓去皮　赤茯苓　白朮各一兩五錢

右為末每服二錢沸湯調不拘時服服訖多飲熱湯汗出即愈

桂苓丸　治煩渴消痰飲寬胸膈

桂心　白朮各一兩　赤苓三兩　烏梅肉一兩五錢　乾薑一兩　炙草五錢

右為末蜜丸彈子大每服一丸至二丸細嚼滾湯送下

香薷丸　治大人小兒傷暑伏熱躁渴瞀悶頭目昏眩胸膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食

或發霍亂吐利轉筋並宜服之

香薷　紫蘇俱去梗　乾木瓜各一兩　丁香　炙草　檀香　白茯苓　藿香

右為末蜜丸彈子大每服一丸至二丸熱水嚼下或新汲水化下亦得小兒半丸

消毒丸　治中暑煩渴脘暈寒熱

半夏湯泡令去滑米泔煮令透茯苓　生甘草各五錢

右為末蜜丸桐子大每服三十丸新汲水調下不拘

時服

傷濕叙論

經云濕為痺着凡關節疼痛重痺而弱皆為濕着若氣不平亦使人半身不遂口眼喎斜涎潮昏塞此中濕之候也夫寒熱風濕皆能并合為疾所謂風濕寒濕濕溫者其証各有不同其治亦別不可不辨若治風濕寒濕當發其汗但微微似汗出則風濕俱去若大汗出風去濕不去則不能愈若治痺又中濕只宜利小便不宜以

火攻并轉利濕家下之額上汗出微喘小便不利者死若下利不止者亦死論曰治濕不利小便非其治也

傷濕証治

病者身重腳弱關節煩疼發熱惡寒小便秘澁大便殘泄自汗腰腳冷痺腿膝浮腫小便或自利不渴皆久坐卑濕或為雨露所襲或汗出沾衣受濕漸漬得之名曰濕痺

腎着湯　治身重腰冷如坐水中形如水狀反不渴小

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com