

欽定四庫全書

子部

名醫類案卷三



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

醫類書卷三

齊肅

明 江瓘 編

羅氏主治楊大

余七司徐宿

風痰春間忽病頭旋眼

黑目才牙

地神煩亂

欲吐不吐心中如懊懷

狀如偏痛微腫而赤色

赤色足胗冷

此足冷因痰火

升羅曰此少壯日如飲食久積濕熱於內風痰內作

上熱下寒陰陽不得交通否之象也經云治熱以寒
雖良工不能廢其繩墨而更有道也然而病有遠近
治有重輕參政年高氣弱上熱雖盛豈敢用寒涼之
劑損其脾胃經云熱則砭之以三稜針約二十餘處
刺出紫血如露珠之狀少頃頭目清利諸症悉減遂
處一方天麻為君柴胡黃芩黃連俱酒製為臣以治
上熱陳皮辛溫炙甘草甘溫補中益氣為佐生薑半
夏辛溫治風痰茯苓甘平利水道導濕熱引而下行故

以為使

立方
可法

服數服邪氣平而愈此案與東垣治火

條中案相同

滄州翁治一人病寓湖心僧舍以求治翁至其人方飯

坐甫定即搏爐中灰雜飯猛噬且喃喃詈人命左右

掖之切其脉三部皆弦直上下行而左寸口尤浮滑

蓋風留心胞症也法當湧其痰而凝其神既湧出痰

沫四五升即熟睡竟日乃寤寤則病盡去徐以治神

之劑調之神完如初

丹溪治一室女素强健六月發煩悶困憊不食時欲入

井脉沉細數弱口漸渴醫作暑病治不效又加嘔而

瘦手心熱喜在暗處脉漸伏而妄語

憑脉作暑治亦不謬但喜在暗

處云云明

屬風痰

朱制局方妙香丸

妙香丸方

巴豆 冰

膩粉

金箔

黃蠟

蜜丸

如芡實大井水下一丸半日大便藥

已出矣病不減遂以麝香水洗藥以針穿三孔凉水

吞半日下稠痰數升得睡漸愈因記金匱云昔肥而

今瘦者痰也

一人患痰血滯不行胸中有飲服韭汁三四盞胸中煩躁不寧無效以瓜蒌仁一錢半夏二錢貝母三錢為末炊餅丸麻子大薑湯送下即抑痰丸

一人遍身俱是塊塊即痰也二陳加白芥薑炒黃連煎服

一人年五十形肥味厚且多憂怒脉常沉濇自春來得痰氣病醫認為虛寒率與燥熱香竄之劑至四月間兩足弱氣上衝飲食減朱視之曰此熱而脾虛痿厥

之症作矣形肥而脉沉未是死症但藥邪太盛當此
火旺實難求生且與竹瀝下白朮膏盡二斤氣降食
進一月後仍大汗而死

此案又見第八卷痿症門

一婦年五十餘素多怒因食燒酒次早面浮絕不思食

痰

身倦怠脉沉濇獨左豁大朱作體虛有痰氣為痰

所隔不得降當補虛利痰藥為主

煎六君吞滾痰丸

每早以

二陳加參朮大劑與一貼後探令吐出藥辰時與索

矩三和湯三倍加白朮至睡後以神祐丸七粒撓其

痰

神祐丸不如
滾痰丸佳

如此一月而安

虞恒德治一婦四月間因多食青梅得痰飲病日間胸

膈中大痛如刀錐至晚胸中痛止而膝髀大痛蓋痰

飲隨氣升降故也一醫作胃寒治

胃寒之脉宜見沉
遲或緊今見洪數

而滑非
寒可知

用乾薑良薑官桂烏附丁沉輩及煮胡椒粥

間與病日劇加之口渴小水淋瀝虞診其六脉洪數

而滑作清痰處治令其亟烹竹瀝服三日口不渴小

水亦不淋瀝但胸中與膝互痛如舊用蘆菹子汁研

與半碗吐痰半升至夜痛尤甚而厥正所謂引動其

猖狂之勢耳

粗工至此束手無策矣

次日用參蘆一兩逆流水

煎服不吐又次日苦參煎湯服亦不吐又與附子尖

桔梗蘆皆不吐一日侵晨梨蘆末一錢麝香少許酸

漿水調與始得大吐至次日天明吐方定前後得痰

及稠飲一小桶其痛如脫調理而安

一東南朝貴素畏熱藥病痰輒云火痰茹芩連一日冬
雪寒冽眩嘔以死韓飛霞以黑附子一片砒一分春

入薑汁切之大吐又服煖藥而愈此蓋地氣束人豈
可拘執自誤況痰生於濕濕生於寒乎

吐寒痰
之法

會稽徐彥純治一人病痰數年不愈診其脉左手微細
右手滑大微細為寒滑大為燥以瓜蒂散湧其寒痰
數升汗出如沃次以導水丸禹功散去腸中燥垢亦
數升人半愈後以淡劑流濕降火開胃口不踰月而

瘥

吐下
兼行

盛文紀以醫名吳中有訓導病頭疼發熱惡寒初作外

感治或以風治見熱則退熱痛則止痛或又以氣虛

治由是病劇人事不省飲食已絕危哉盛診視曰君幾

誤死法當先去其滯遂用二陳湯加大黃六七錢令

守者曰急煎俾服至夜分左眼若動肝氣乃舒大泄

則有可生之機矣至夜半時腹中有聲左眼果開遺

穢物斗許中有堅硬如卵之狀竹刀剖視即痰裹麵

食也此症斷之痰裹食非明眼不能既而氣舒結散津液流通即索

食矣衆醫問故盛曰訓導公北人也久居於吳飲酒

食麪皆能助濕濕能傷脾脾土一虧百病交作有是病服是藥更何疑焉衆醫咸服

黃師文治一婦人卧病垂三年狀若勞瘵諸醫以虛損治不瘥黃視之曰此食陰物時或遭驚也問之婦方自省悟曰曩者食水糲時忽人報其夫墜水由此一驚病延至今不能愈黃以青木香丸兼以利藥一貼與之須臾下一塊挾之乃痰裹一水糲耳當時被驚怏怏在下而不自覺也自後安康無恙

小兒醫陳日新形體尪羸嘗日病熱至暮尤甚醫以陰虛治或以勞瘵治荏苒半載病勢轉危日新謂其父曰欲得大黃通利大腸為之一快雖死無憾其父從之遂以導痰湯入硝黃煎服自辰至申下結糞一塊如核桃許挾開視之乃上元看燈時所食粉餌因痰裹在外不能化由是致熱日漸銷鑠耳向使日新不知醫則終為泉下人矣誰謂劉張之法無補於世哉錢中立治周訓導年五十時患痰火之症外貌雖癯稟

氣則厚性不喜飲醫視脉孟浪指為虛火用補中益
氣湯加參朮各五錢病者服藥踰時反致氣喘上升
喘息幾殆錢視曰此實火也宜瀉不宜補痰氣得補
火邪愈熾豈不危殆先用二陳湯探吐出痰碗許其
夜安寢平明仍用二陳去半夏加朴硝大黃下結糞
無數其熱始退更用調理藥旬日始安吁不識病機
妄施補瀉鮮有不敗事者

豐城尹莫強中凡食已輒胸滿不下多方治之不效偶

家人輩合橘紅湯取嘗之似有味因連日飲之一日
坐廳事方操筆覺胸中有物墜下大驚目瞪汗如雨
急扶歸須臾腹疼下數塊如鐵彈子不可聞自此胸
次廓然蓋脾之冷積也其方橘皮去穰取紅一斤甘
草鹽各四兩水五碗慢火煮乾焙搗為末點服夫當
病經年藥餌多矣不知功乃在一橘皮世之所忽豈
可不察哉又古方以橘皮四兩水五碗慢火煮乾焙
搗為末點服名曰二賢散以治痰特驗

泊宅編

吳茱山治一男子瘦弱因卧卑濕之地遂得溢飲之症

頭目眩暈羞日光寒熱時作

痰能作寒熱信然

四肢歷節疼

痛

四肢歷節疼痛乃濕飲流注關節

合羅案四肢

活

獨活

升麻

靈仙

防風

蒼朮

當歸

甘草

澤瀉

茯苓

醫作風治或作

虛治將及半年俱不效吳診脉曰寸口脉沉而滑兩

尺弦此溢飲濕痰也但汗吐之諸醫以病者虛羸當

用補法謂吐汗必死吳曰此溢飲當發其汗遂以控

涎丸一服

蠲

涎

丸方

川烏

製半夏

僵蠶

全

甘遂

麩粉

生薑汁

打糊為丸

硃

砂為衣
薑湯下

却用爆乾綿子一斗燃之以被圍之勿令氣
泄令患人坐薰良久倏然吐出黑痰升許大汗如雨
痛止身輕其病遂愈

一婦素有心脾氣痛好燒酒患舉則四肢厥冷每用諸
香附子薑桂之屬隨服隨止一日前患復作遂以前
藥服之不安仍飲燒酒二盞酒下腹脇脹滿坐卧不
得下木香檳榔丸一百丸大便通後痛稍可頃間下
墜愈痛向後延吳診視脉數而有力知前香燥太過