

欽定四庫全書

子部
證治準繩卷一百一



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院八品吏目臣黃發

編修臣倉聖脈覆勘

證治準繩

外科

禁
中景
三法
東垣
先生
治瘡
瘍

明 王肯堂 撰

三法東垣先生治瘡瘍

待宜厥疾瘳矣假如瘡

實其邪在內當先疎其

內以下之。燠瘧作痛，便利調和，脈浮而洪，其邪在表，當先托其裏以汗之。元戎云：榮衛充滿，抑遏而為癰者，當泄之以奪盛熱之氣；榮衛虛弱，壅滯而為癰者，當補之以接虛怯之氣。又東垣先生云：瘡瘍雖面赤伏熱，不得攻裏，裏虛則下利。仲景先生云：瘡家雖身體疼痛，不可發汗。汗之則發痙，苟不詳審，妄為汗下，以致血氣虧損，毒反延陷。少壯者難以潰斂，老弱者多致不救。

東垣瘡瘍及諸病面赤，雖伏火熱，禁不得攻裏，為陽氣

怫鬱邪氣在經宜發表以去之故曰火鬱則發之雖大便數日不見宜多攻其表以發散陽氣少加潤燥藥以潤之如見風脈風證只用發表風藥便可以通利大便若口乾燥秘澇尤宜潤之慎不可下也九竅不利皆不可下瘡瘍鬱冒俗呼昏迷是也慎不可下汗之則愈

丹溪精要云大黃治癰疽之要藥以其宣熱拔毒又云瘡始作皆須以大黃等湯極轉利之且排日不廢繼又自言患癰疽者每有泄瀉皆是惡候此是不能無疑者

也借曰前用大黃恐因病體實而大腑秘結有積熱沈
痼之積者發也止可破結導滯推合轉動而已豈可謂
極轉利之而且排日不廢乎若下利之後又與利藥恐
非防微杜漸之意瘡之始作即周禮腫瘍之時也腫在
肌肉若非大滿大實堅之證自當行仲景發表之法借
五香湯為例散之於外何必遽以峻下之藥以奪其裏
自取其禍乎

精要云大凡癰疽不可舍五香湯此又不能無言者也

開卷便於第一論中詳言之吾不知良甫之時有許多
大腑堅秘病氣鬱塞若是之頑厚可以驟散而天下者
若果有之亦當開陳時之先後證之可否庶乎後人不
敢孟浪殺人也或曰癰疽用大黃走泄以去毒自孫真
人行千金方已言之矣良甫祖述其說何吾子病之深
也曰大黃除諸實熱而性峻急孫以盛行奇術於公卿
間時在晚宋民不知兵交游於富貴之家肉食之輩固
皆捷効今良甫不分貧富苦樂勞逸一槩用之寧無孟

浪之患乎況有房勞而虛者憂怒而虛者極意貪求而
虛者強力動勞而虛者大醉過飽而虛者皆因氣弱而
瀉血少而獨生疽固是難治之病若大腑秘而稍安穀
食肯守戒律甘心澹味者猶為可治但費補工夫耳苟
因旬日半月大便秘實不知其氣不降也便以為實而
行大黃些少寒熱不知其血氣不和也便以為有外感
而行表散如此害人甚速

仲景云瘡家雖不疼痛不可發汗汗之則瘡

發汗為大
汗出非謂

諸托裏之藥
輕輕表散也

丹排膿內補十宣散若用之於些少癰疽與冬月儘可
助內托之功若於冬月腫瘍用之亦可轉重就輕移深
為淺若潰瘍與夏月用之其桂朴之溫散佐以防風白
芷吾恐雖有參芪難為倚仗比見世人用此方者不分
癰疽冬夏無經絡無先後如盲人騎瞎馬半夜臨深池
危哉 又云內補十宣散瀉衛燥血藥太多止可用於
輕小證候虛之甚者恐難倚仗

精要云內托散一日至三日之內進十數服治毒氣攻衝臟腑名護心丸此方專為服丹石而發疽者若不因丹石而發恐非必用之劑若夫年老者病深者證憊者體重者菜豆雖補將有不勝重任之患矣

丹夫外施敷貼正與發表之意同經曰發表不達熱大凡氣得熱則散冷則斂向見鄭經歷性嗜酒與煎燂年五十餘忽春末夏初在額絲竹空穴湧出一角長短大小如鷄距稍堅求予治予曰此非膏粱所致而何宜斷

厚味先解食毒針灸以開泄壅滯未易治也此少陽經
所過氣多血少者鄭以憚煩召他醫以大黃朴硝腦子
等冷藥罨之一夕豁開如醬蚘徑三寸一二日後血自
蚘中濺出高數尺而死此冷藥外逼熱鬱不得發宜其
發之暴如此也 李世英疽不熱不痛屬陰切不可用
冷藥敷貼恐逼毒氣入內 薛內經云五臟不和九竅
不通六腑不和留結為癰又云形傷痛氣傷癰此則臟
腑不和瘡發於外也明矣塗貼寒涼豈能調和臟腑宣

通氣血耶設使瘰癧痛熱渴脈滑數而有力屬純陽宜內
用濟陰丹外用益陽散則熱毒自解瘀滯自散若似瘰
非瘰似痛非痛似潰不潰似赤不赤脈洪數而無力屬
半陽半陰宜內用沖和湯外用陰陽散則氣血自和瘀
滯自消若微瘰微痛或色黯不痛或堅硬不潰脈洪大
按之微細軟弱屬純陰宜內服回陽湯外敷抑陰散則
脾胃自健陽氣自回丹溪先生云敷貼之劑應酬輕小
熱證耳若不辨其陰證陽證之所由分而妄敷寒涼之

劑迷塞腠理凝滯氣血毒反內攻而肉反死矣況運氣得寒而不健瘀血得寒而不散瘀血得寒而不潰新肉得寒而不生治者審焉

蜚針法謂開門放毒以為要捷恐可施於輕小證候耳愚謂蜚之所吮止膚間惡血若積毒於臟腑者徒竭之於外而不及於裏恐未為得往見張兄之子甫二歲偏身赤疹如霞片子向見其母久病疔謂毒熱在血所成者張曰誰不因母血所成何謂毒熱之血予曰其母雖

疔食肉如平時肉性熱與宿痰之熱相搏非毒歟張不
之信自取五六大蜚吮其血疹頓消乳食起居如舊予
曰非其治也未可以為喜張怒越二三日大發熱而暴
死非竭之於外血去而氣不能獨居乎

薛氏論見前內消條

薛用藥之法如執權衡當察病勢輕重邪畜表裏瘡毒
癰潰元氣虛實若不詳究其因率爾投治實實虛虛七
惡之禍不能免矣治者審之 吳庠盛原博掌後患疔

紅絲至腕惡寒發熱勢屬表證與奪命丹一服紅絲頓
消又用和解之劑大勢已退彼別服敗毒藥發熱口乾
紅絲仍見脈浮大而虛此氣血受傷而然以補中益氣
湯主之而愈蓋奪命散毒性尤猛烈瘡邪已散而復用
之是誅伐大過失內經之旨矣 一儒者元氣素弱予
補其氣血出膿而愈後因勞役瘡痕作癢乃別服敗毒
藥一劑以致口噤舌強手足搐搦痰涎上涌自汗不止
此氣血傷而發瘕也用十全大補加附子一錢灌服而

甦 一男子患疔服奪命丹汗不止而瘡不痛熱不止而便不利此汗多亡陽毒氣盛而真氣傷矣用參芪歸朮芍藥防風五味二劑諸證悉愈惟以小便不利為憂予曰汗出不宜利小便汗既止陽氣復而自利矣仍用前藥去防風加麥門倍用當歸黃芪四劑便行瘡潰而愈 東垣曰瘡瘍食肉乃自棄也瘡瘍乃營氣而作今反補之自棄何異雖用藥治不能愈也 精要曰羊鷄牛鵝魚麴煎燂炒炙酒等味犯之必發熱用梔子黃芩

湯最効 丹溪曰梔苓苦參犀角佐輔人參固可解食
毒之熱若寒月與虛人寧無加減乎內經謂膏粱之變
足生大疔此言瘡疽之因也禁戒厚味恐其引起宿火
之熱此誠富貴養口腹者所當謹若素貧者大不然
矣予治一人背癰徑尺穴深而黑家貧得此急作參耆
歸朮膏多肉餽飣與之而安多肉餽飣補氣之有益者
也

腫瘍 十六