

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷五十三

一至三



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

簡急千金要方卷五十一

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

脾臟方

疳濕痢第九方

論曰凡疳濕之病皆由暑月多食肥濃油膩取冷眠睡

之肝得也禮云君子威暑之月薄滋味無食肥濃煮餅

此時以不病人也養生者宜消戒之不爾多患疳濕痢

耳

凡所患處或著口斷咽喉下部疳與月蝕並不痛令人
不覺其治用五月五日蝦蟇角蒿救月木寒食泔淀但
得一事單用之燒作灰和蠟月猪脂傅之逐手便瘥極
須慎口味耳

凡疳在慎鹽醬酢酥油棗等一切皆忌惟白飯豉苜蓿
苦苣蕒菁不在禁限

凡吹藥入下部沒中指許深即止

治疳濕下黑醫不能治垂死者方

髑髏灰

熏黃

朱砂

青黛

石鹽

丁香

麝香

礬石

梔子

菰荇子

鐵衣

乾薑

故靴底灰

乾蝦蟇

五月五日

細辛

土瓜根

芥子

蜀椒

葶藶

菖蒲

各等分

右二十味治下節以竹筒吹杏仁大著大孔中所有患疳瘡上悉傳之其丁香麝香別研擣著藥中合之

一方有寒食泔淀救月木楸葉為二十三味若病大者用灌方如左

麝香

丁香

甘草

犀角

各三分

右四味治下篩合和以鹽三合蜀椒三合豉二合以水二升煮取一升去滓內四味散合和分作二分灌大孔旦一灌酉一灌之凡久下一月不瘥成疳候大孔必寬者是以此主之

八物菑根湯凡下血者是蠱也以此主之

方見蠱篇中

治疳濕久下痢赤白百療不瘥者方

兔頭骨

蛇頭

新薑子

故緋並灰

葶藶子

狸骨一作狐骨

蜚蠊

百草

五月五日
日收者倒掛草

青黛

晚蠶蛾

青礬

丁香

沐中桄木

蠹蟲屎

麝香

苦參

黃蘗

乾薑

角蒿

朱砂

印成鹽

救月木

桂心

鐵衣

芒硝

蝦蟇

黃礬

荏子各等分

右二十九味治下節以筒子內下部吹著日一二度

妙

治疳濕不能食身重心熱脚冷百節疼痛方

黃芩

芍藥

苦參

甘草

當歸

蜀椒

甘松一作甘淀

青黛

熏黃

豉各二兩

東引桃根

蔥白各一握

鹽合一

麝香半分

猪膽二枚

右十五味咬咀以水一斗八升煮取四升分為二分
一度灌一分湯如人體然後著麝香猪膽一枚即灌
灌了作蔥豉粥食之後日更將一分如前灌之七日
忌生冷毒物等但是油膩醬乳醋三十日忌之大佳
治疳蝕人諸處但是赤血痢久不瘥立著即瘥祕方

乾蝦蟇

五月五日收者一枚作灰末

人屎灰

一作髮灰

金銀土塼

各五兩

麝香

一分

銀末

小豆許

右五味治下篩傅瘡上即瘥三七日忌如前痢者吹

下部

治疳痢不止方

苦參

甘草

熏黃

各二兩

豉

一升半

蔥白

五莖

蜀椒

三十粒

右六味以苦參等三物各擣下篩以水五升煮蔥白豉椒取三升以三指撮苦參末等各一撮內汁中冷暖如人體先飲少許豉汁食一口飯乃側臥徐徐灌之訖多時臥不出為佳大急乃出之於淨地當有疳

濕蟲如白馬尾狀頭黑是其效也其重者肛大難瘥
當取桃枝綿裏頭用前件汁適寒溫烙之須近脊一
上三十度烙之乃瘥神驗

又方崔氏云晉代之地多三疳蝕人五臟通見脊骨下
膿血手足煩疼四肢無力夜臥煩燥不安而失血色肩
髀疼面及手足有浮氣或下血乃死治之方

雄黃

青箱各二兩

苦參

各三兩

礬石

雌黃

鐵衣

藜蘆

各一兩

麝香

二分別研

右八味治下篩以竹管內大孔中酸棗許吹內下部
中日一不過三度小兒以大豆許此方極救死

又方

大麻子

胡麻各一升半

右二物並熬令黃以三升瓦瓶泥表上厚一寸待泥
乾內大麻等令滿以四五枚葦管插口中密泥之掘
地作竈倒立竈口底著瓦器承之密填竈孔中地平
聚炭瓶四面著壑壘之日沒放火燒至明旦開取適

寒溫灌疳濕者下部中一合尋覺咽中有藥氣者為佳亦不得過多多則傷人隔日一灌重者再三灌之從旦灌至日夕極覺體中之力勿怪也非但治疳濕凡百異同瘡疥癬並洗塗之

論曰凡日月蝕時忌食飲腹中生蠱蟲及房室生子不具足必患月蝕瘡亦不得與兒乳日月生後乃不忌令人口臭齒斷宣露常有血出舌上生瘡者皆由犯此所致耳日月蝕時須救不救出行逢暴雨其救月杖須收

取治蠶之神藥預備患此者施之救療

硫黃

藺茹

斑猫各等分

右三味治下節傳瘡上乾者以猪脂和傅之日三夜

一

又方

地榆根

薔薇根

吳茱萸根

右三味各三兩治下節以鹽湯洗瘡傅之日三

小兒痢第十方

溫中湯治小兒夏月積冷洗浴過度及乳母亦將冷洗
浴以冷乳飲兒兒壯熱忽值暴雨涼加之兒下如水胃
虛弱則面青肉冷眼陷乾嘔者宜先與此調其胃氣下
即止方

乾薑

厚朴各一分

當歸

桂心

甘草各三分

人參

茯苓

白朮

桔梗各二分

右九味㕮咀以水二升煮取九合六十日至百日兒

一服二合半餘皆隨兒大小

溫中大黃湯治小兒暴冷水穀下或乳冷下青結不消
或冷實吐下乾嘔煩悶及冷滯赤白下者良若已服諸
利湯去實胃中虛冷下如水乾嘔眼陷煩擾不宜利者
可除大黃若中乳乳母洗浴水氣未消飲兒遂為霍亂
者但用大黃小兒諸霍亂宜利者便用大黃不須利宜
溫和者除之方

大黃

分六

桂心

厚朴

甘草

乾薑

各一分

人參

茯苓

白朮

當歸

各二分

桔梗

三分

右十味以水二升半煮取八合凡兒三十日至六十日一服二合七日至一百日一服二合半二百日已來一服三合

黃蘗湯治小兒夏月傷暴寒寒折大熱熱入胃下赤白滯如魚腦壯熱頭痛身熱手足煩此太陽之氣外傷寒使熱氣便入胃服此方良若誤以利藥下之或以溫脾