

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷四十七



南京中医药大学图书馆版权所有

水腫

問

明 張介賓 撰

或醇酒厚味或鬱怒
若腫赤痛甚脈洪數而
若漫腫微痛色黯作渴

脉雖洪數而無力者陰虛之證也為難治若不腫不痛或漫腫色黯脉微細者陽氣虛甚也尤為難治大抵發背之證其名雖多總惟陰陽二證為要若發一頭或二頭其形焮赤腫高發熱疼痛頭起者為癰屬陽易治若初起一頭如粟不腫不赤悶痛煩躁大渴便秘睡語咬牙四五日間瘡頭不計其數瘡口各含如果形如蓮蓬故名蓮蓬發積日不潰按之流血至數日或八九日其頭成片所含之物俱出通結一衣

揭去又結其口共爛為一瘡其膿內攻其色紫黯者
為疽屬陰難治且此證不可大痛又不可痛若見煩
悶者多不治總之瘡瘍雖云屬火然未有不由陰虛
而致者故經云督脉經虛從腦而出膀胱經虛從背
而出故不可專泥于火

陳良甫曰背疽之源有五一天行二瘦弱氣滯三怒氣
四腎氣虛五飲冷酒食炙燂服丹藥

立齋曰大抵發背之證雖發熱疼痛形勢高大煩渴不

寧但得脉息有力飲食頗進可保無虞其膿一潰諸證悉退多有因膿不得外泄以致疼痛若用敗毒寒藥攻之反致誤事若有膿急針之膿一出苦楚即止膿未成而熱毒作痛者可用解毒之藥亦有腐潰尺餘者若無惡證則投以大補之劑肉最易生亦無所妨惟忌腫不高色不赤不掀痛脉無力不飲食腫不潰腐不爛膿水清或膿多不止皆屬元氣虛也為難治宜峻補之其或膿血既泄腫痛尤甚濃水臭敗煩

躁時嗽腹痛渴甚瀉利無度小便如淋乃惡證也皆不可治

又灸法曰予常治發背不問日期陰陽腫痛或不痛或痛甚但未成膿或不潰者即與灸之隨手取效或麻木者明灸之毒氣自然隨火而散或瘡頭如黍者灸之不效亦有數日色尚微赤腫尚不起痛不甚濃不作者尤宜多灸勿拘日期更服甘溫托裏藥切忌寒涼之劑其有勢未定者或先用箍藥圍之若用烏

金膏點患處尤妙凡人初覺發背赤熱腫痛莫辨其頭者但以濕紙覆其上立候視之其紙有先乾處即是結癰頭也取大蒜切成片如二三錢厚薄安於頭上用大艾炷灸之三壯換一蒜片痛者灸至不痛不痛灸至痛時方止最要早覺早灸為上一日二日十灸十活三日四日六七活五日六日三四活過七日則難為力矣若有十數頭作一處生者即用大蒜研成膏作薄餅鋪頭上聚艾於蒜餅上燒之亦能活也

若背上初發赤腫一片中間有一片黃粟米頭子便用獨蒜切去兩頭取中間半寸厚者正安於瘡上灸十四壯多至四十九壯蓋如此惡證惟隔蒜灸及塗烏金膏有效又治法曰腫硬痛深脉實者邪在內也可下之○腫高焮痛脉浮者邪在表也宜托之○焮痛煩躁或咽乾火在上也宜瀉之○腫高或不作膿者邪氣凝結也宜解之○腫痛飲冷發熱睡語者火也宜清之○不作膿或不潰不斂者陽氣虛也宜補

之○瘰癧不腐或積毒不解者陽氣虛也宜助陽氣
○膿多或清者氣血俱虛也宜峻補之○脈浮大或
濇而肌肉遲生者氣血俱虛也宜補之○右關脈弱
而肌肉遲生者宜補脾胃

又諸毒治法曰如頭痛有表證者宜先服人參敗毒
散一二劑○如焮痛發熱脈數者用金銀花散槐花
酒神功托裏散○如疼痛腫硬脈實者以清涼飲仙
方活命飲苦參丸○腫硬木悶疼痛發熱煩躁飲冷

便秘脉沉實者內疎黃連湯或清涼飲○大便已通
欲其作膿宜仙方活命飲托裏散蠟礬丸外用神異
膏○如飲食少思或不甘美用六君子湯加藿香連
進三五劑更用雄黃解毒散洗患處每日用烏金膏
塗瘡口處俟有瘡口即用紙作撚蘸烏金膏絰入瘡
內○若有膿為脂膜間隔不出或作脹痛者宜用針
引之腐肉堵塞者去之若瘀肉腐動用猪蹄湯洗之
○如膿稠或痛飲食如常瘀肉自腐用消毒與托裏

藥相兼服之仍用前二膏塗貼○若腐肉已離好肉者宜速去之○如膿不稠不稀微有疼痛飲食不甘瘀肉腐遲更用桑柴灸之亦用托裏藥○若瘀肉不腐或膿清稀不炊痛者急服大補之劑亦用桑木灸之以補接陽氣解散鬱毒○常觀患疽稍重未成膿者不用蒜灸之法及膿熟不開或待腐肉自去則多致不救○大抵血氣壯實或毒少輕者可假藥力或自腐潰若怯弱之人熱毒中隔內外不通不行針灸

藥無全功矣○此證若膿已成急宜開之否則重者潰通臟腑腐爛筋骨若使透膈則不可治輕者延潰良肉難於收功因而不斂者多矣

又諸補治法曰若腫焮作痛寒熱作渴飲食如常此形氣病氣俱有餘也先用仙方活命飲後用托裏消毒散解之○漫腫微痛或色不赤飲食少思此形氣病氣俱不足也用托裏散調補之○不作膿或膿成不潰陽氣虛也托裏散倍加肉桂參芪○膿出而反

痛或膿清稀氣血俱虛也八珍湯○惡寒形寒或不
收斂陽氣虛也十全大補湯○晡熱內熱或不收斂
陰血虛也四物加參朮○作嘔欲嘔或不收斂胃氣
虛也六君加炮薑○食少體倦或不收斂脾氣虛也
補中益氣湯加茯苓半夏○肉赤而不斂血熱也四
物加山梔連翹○肉白而不斂脾虛也四君加酒炒
芍藥木香○小便頻數者腎陰虧損也加減八味丸
○大抵瘡毒勢甚若妄用攻劑怯弱之人必損元氣

因而變證者衆矣

又三證治法曰若初患未發出而寒熱疼痛作渴飲
冷此邪氣內蘊也仙方活命飲若口乾飲熱漫腫微
痛此元氣內虛也托裏消毒散若飲食少思肢體倦
怠此脾胃虛弱也六君子湯如未應加薑桂其有死
者乃邪氣盛真氣虛而不能發出也在於旬餘之間
見之○若已發出用托裏消毒散不腐潰用托裏消
毒散如不應急宜溫補脾胃其有死者乃真氣虛而

不能腐潰也在於二旬之間見之○若已腐潰用托裏散以生肌如不應急溫補脾胃其有死者乃脾氣虛而不能收斂也在於月餘見之此三證雖不見於經籍余嘗治而歷驗者

千金方灸法治發背已潰未潰者用淡豈豉以水和搗成硬泥依腫大小作餅三四分厚如已有瘡孔勿置瘡孔上但四布豆餅列艾其上灸之使微熱勿令破肉如熱痛急少起之日灸二度如先有瘡孔孔出汁

即瘥

一驗透膈法凡背疽大潰欲驗穿透內膜者不可用皂角散嚏法但以紙封患處今病者用意呼吸如紙不動者未穿透也倘用取嚏法鼓動內膜則反致穿透慎之慎之

都憲周弘岡背患疽腫而不潰脉大而浮此陽氣虛弱而邪氣壅滯也用托裏散倍加參芪反內熱作渴脉洪大鼓指此虛火也用前散急加肉桂脉證頓退仍

用托裏而愈若以為熱毒而用寒藥則誤矣○上舍
張克恭患此內服外敷皆寒涼敗毒遍身作痛欲嘔
少食晡熱內熱惡寒畏寒余曰遍身作痛營衛虛而
不能營於肉裏也欲嘔少食脾胃虛寒而不能消化
飲食也內熱晡熱陰血內虛而陽氣陷於陰分也惡
寒畏寒陽氣虛弱而不能衛於肌肉也此皆由脾胃
之氣不足所致遂用補中益氣湯諸證漸退更以十
全大補湯腐肉漸潰又以六君子湯加芎歸肌肉頓