

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷三十七



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

久遠人壽

薛氏醫書

婦人良方

白帶丸

明薛已訂

養完全十月而產若血

凡妊婦腰痛多墮胎

胎孕乃成血氣虛乏不

火氣重

薛氏醫案

能榮養其胎則墜譬如枝枯則果落膝痿則花墜嘗
治賈氏婦每有孕至三月前後必墜診其脈左右大
而無力重則濡知其血虛也補其中氣則血自榮時
正初夏教以濃煎白朮湯下黃芩末二錢與數十貼
得保而生因而思之墮于內熱而虛者于理為多曰
熱曰虛蓋孕至三月上屬相火所以易墮不然何以
黃芩熟艾阿膠等為安胎之妙如此也大抵治法須
審某月屬某經育養而藥之

附治驗

一妊婦五月服剪紅丸而胎墮及腹脹痛乃服破血之劑痛益甚手不敢近予曰此峻藥重傷脾胃也用八珍倍加參耆半夏乳香沒藥二劑而痛止數劑而安

吳江庠史萬湖仲子室年二十餘疫疾墮胎時咳服清肺解表之藥喘急不寐予以為脾土虛而不能生肺金藥復損而益甚也先與補中益氣加茯苓半夏

五味炮薑四劑漸愈後往視之用八珍加五味及十全大補湯而愈

一方鯉魚二觔者一尾粳米一升用鹽醬煮食甚善月食三次

芎藭補中湯杜仲丸治氣虛而胎墜

方見十二卷第一論

附方

十全大補湯

八珍湯 二方見二十四卷第四論

補中益氣湯方見二十四卷第六論

妊娠不長方論第二

夫妊娠不長者因有宿疾或因失調以致臟腑衰損氣血虛弱而胎不長也當治其疾疾益其氣血則胎自長矣

愚按前症更當察其經絡審其所因而治之

附治驗

一妊婦胎六月體倦懶食面黃晡熱而胎不長因勞

欲墜此脾氣不足也用八珍湯倍加參朮茯苓三十餘劑脾胃漸健胎安而長矣

一妊婦因怒寒熱往來內熱晡熱脇痛嘔吐胎至八月而不長此因肝脾鬱怒所致用六君子加柴胡山梔枳殼紫蘇桔梗病愈而胎亦長矣

黃耆湯 治妊娠不長更安胎和氣

黃耆炒 白朮炒 陳皮 麥門冬心去 白茯苓 前胡

人參各五 川芎 甘草炒三

右薑棗水煎服

集驗用鯉魚長尺許如食法飲其汁其胎漸大而長矣

附方

六君子湯

方見二十四卷第六論

八珍湯

方見二十四卷第四論

妊娠胎動不安當下方論第三

夫人以胃氣壯實衝任榮和則胎得所如魚處淵若氣血虛弱無以滋養其胎終不能成也宜下之以免其禍

愚按前症宜用第十二卷十四方論主之其胎果不能安者方可議下慎之慎之

附治驗

鴻臚張淑人痢疾後胎動心神不安肢體殊倦用八珍散二十餘劑漸愈因勞加煩熱頭痛以大劑補中益氣湯加蔓荊子治之熱痛頓止仍用前散又五十餘劑而安其後生產甚易

桂心散 治妊娠因病胎不能安者可下之

桂心 瓜蒌 牛膝 瞿麥各五分 當歸

右水煎

又方牛膝一兩酒一鍾煎七分作二服

小品方用麥藥一升搗碎水二升煮一升服之神效觀
麥藥能損氣破血如此脾胃虛弱飲食不化者不宜
用明矣

文仲取雞子一枚鹽三錢服之立下

佛手散服之胎死者即下生者亦安

方見十二
卷第七論

附方

八珍湯

方見二十四卷第四論

補中益氣湯

方見二十四卷第六論

妊娠墮胎後血下方論第四

墮胎後復損經脈而下血不止甚則煩悶至死皆以調補胃氣為主

愚按前症若肝經血熱用四物參朮山梔肝經風熱用防風黃芩九肝經怒火用加味道遙散脾經氣虛

用四君子歸地脾經鬱滯用加味歸脾湯氣滯不和
用紫蘇飲胃氣下陷用補中益氣湯

附治驗

一妊婦墮胎昏憤不時吐痰自用養血化痰之劑昏
憤不省自汗發搐痰涎湧出彼以為中風欲用祛風
化痰予曰此屬脾氣虛寒所致遂用十全大補湯加
炮薑二十餘劑尋愈

治妊娠損動下血腹痛

阿膠

炒一兩

艾葉

半兩

右水一大盞煎

因墮胎下血煩滿寒熱狂悶鎔鹿角炒為末每服三錢
水調下日三服或家雞翎燒為末每服二錢溫酒下良
久再服以效為度

附方

四物湯

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

紫蘇飲

方見十二卷第八論

防風黃芩丸

方見十二卷第六論

加味道遙散

加味歸脾湯

十全大補湯

三方見二十四卷第四論

妊娠未足月欲產方論第五

妊娠未足月而痛如欲產或應產而難或為子煩用知母一味蜜丸桐子大粥飲服之或槐子蒲黃等分為丸

酒服或蒲黃水調錢許並效

愚按小產重于大產蓋大產如瓜熟自脫小產如生採斷其根蒂豈不重哉而人輕忽死于是者多矣大抵治法宜補形氣生新血去瘀血為主若未足月痛而欲產用芎歸補中湯倍加知母止之產而血不止人參黃耆湯補之產而心腹痛當歸川芎湯主之元氣弱而欲產八珍湯固之出血過多而發熱聖愈湯治之若汗不止或昏憤喘咳急用獨參湯若發熱煩

躁或肉瞤筋惕用八珍湯大渴面赤脈洪而虛者用
當歸補血湯身熱面赤脈沈而微者用四君子薑附
以回其陽可也

附治驗方藥

一妊婦八月胎欲墜如產卧久少安日晡益甚此氣
血虛弱朝用補中益氣湯加茯苓半夏隨愈更以八
珍湯調理而安

當歸川芎湯 治小產後瘀血心腹疼痛或發熱惡寒