

訂正東醫寶鑑雜病篇卷之七

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

痲瘧

瘧病之源

內經曰夏傷於暑秋為痲瘧。夏暑汗不出者秋成風痲。內經。○秋善病風痲又曰魄汗

未盡形弱而氣燂穴俞以開發為風痲。內經。○風成為寒熱又曰因於露風乃生寒熱。內經。○風氣盛於皮膚之內內不得通外不得泄腠理開則洒然寒閉則熱而悶名曰寒熱。內經。○夏傷於暑秋必病痲蓋傷之淺者近而暴傷之重者遠而痲瘧痲者久痲也是知夏傷於暑溼熱閉藏而不能發泄于外邪氣內行至秋而發為痲也。保命。○痲之為病以暑舍于榮衛之間得秋之風寒所傷而後發亦有非暑因風寒感冒而得之者在於陽則發熱在於陰則發寒竝則病作離則病止作止故有

瘧疾形證

時在氣則發早在血則發晏淺則日作深則間日
或在頭項或在背脊或在腰脊雖上下遠近之不
同在太陽則一也東垣。○大法風暑當發汗夏月
多在風涼處歇遂開其汗而不泄故也丹心。○病
氣如凌虐人之狀又曰瘧有凌虐之狀在傷寒久
則為壞證在內傷久則為勞瘵然則豈義疾哉門入
瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓
額腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴
欲飲冷內經。○夫陰陽上下交爭虛實受作陰陽
相移也陽並於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄
鼓額巨陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝
陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛
則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴故欲冷
飲也內經。○夫瘧之始發也陽氣並於陰當是之
時陽虛而陰盛外無氣故先寒慄也陰氣逆極則
復出之陽陽與陰復並於外則陰虛而陽實故先
熱而渴夫瘧氣者並於陽則陽勝並於陰則陰勝
陰勝則寒陽勝則熱內經。○衛虛則先寒榮虛則

脉法

先熱表邪多則寒多裏邪多則熱多表裏相半寒熱相等入門。人之榮衛晝行於陽陽則表也夜行於陰陰則裏也榮衛行到病所不通乃作寒戰鼓振頭額中外皆寒腰脊俱痛此邪氣入於內也寒戰俱已內外皆熱頭痛如破渴欲飲冷煩滿欲吐自汗此邪氣發於外也丹心。暑瘧單熱淫瘧多寒寒瘧先寒後熱風瘧先熱後寒餘皆先寒後熱入門。瘧脉自弦弦數多熱弦遲多寒弦小緊者宜下之弦遲者可溫之弦緊者可發汗浮大者可吐之弦數者風發也以飲食消息止之要畧。瘧脉自弦微則為虛代散則死脉經。瘧脉自弦弦遲多寒弦數多熱隨時變遷脉訣。瘧脉多弦但熱則弦而帶數寒則弦而帶遲亦有病久而脉極虛微而無力似乎不弦然而必於虛數之中見弦但不搏手耳細察可也丹心。弦短者傷食弦滑者多痰虛微無力為久瘧醫鑒。瘧脉遲緩者病自愈同春。

寒熱先後

癰先寒而後熱者由夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒藏於腠理

皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風

者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱

也病以時作名曰寒癰內經○先熱而後寒者由

先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒亦以時作

名曰溫癰內經○其但熱而不寒者陰氣先絕陽

氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰癰癰癰

謂熱也

內經

寒熱往來

病有洒淅惡寒而復發熱者何也曰陰脉不足陽往從之陽脉不足陰往來之何謂陽不

足假令寸脉微名曰陽不足陰氣上入陽中則洒

淅惡寒何謂陰不足假令尺脉弱名曰陰不足陽

氣下陷入陰中則發熱也仲景○陽微則惡寒陰

微則發熱大抵陰不足陽往從之故內陷而發熱

陽不足陰往來之故陰氣上入陽中則惡寒仲景

○陽不足則陰邪出表而與陽爭乃陰勝而為寒

也陰不足則陽邪入裏而與陰爭乃陽勝而爲熱也若邪入而正氣不與之爭則但熱而無寒矣陽不足則先寒陰不足則先熱表邪多則寒多裏邪多則熱多半表半裏則寒熱相等乍往乍來而間作也入門。瘧者少陽也少陽者東方之氣也逆行則發寒順行則發熱故分之氣異往來不定也東垣。身後爲太陽太陽者膀胱水寒也身前爲陽明陽明者大腸金燥也少陽之邪在其中近後勝膀胱水則惡寒近前陽明燥則發熱故爲往來寒熱也東垣。甚者內外失守眞邪不分陰陽迭勝寒熱互起則休作無定時矣直指

瘧發日數多少

夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外因秋遇風及得之以浴水氣舍於

皮膚之內與衛氣並居衛氣者晝日行於陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作內經。衛氣與邪相並則病作與邪相離則病休其並於陰則寒並於陽則熱離於陰則寒

已離於陽則熱已至次日又集而並合則復病也

綱目。其間日發者由邪氣內薄於五藏橫連募

原也其道遠其行遲不能與衛氣俱行不得皆出

故間日乃作也內經。時有間二日或至數日發

或渴或不渴其故何也日其間日者邪氣與衛氣

客於六府而有時相失不能相得故休數日乃作

也。瘧者陰陽更勝也或甚或不甚故或渴或不渴

內經。三日一發者受病一年間日一發者受病

半年連日發者受病一月二日連發住一日者氣

血俱受病也又日三日一發陰經受病也最重

心。陽為府邪淺與榮衛並行一日一發。陰為

藏邪深橫連募原不能與正氣並行故間日蓄積

乃發或三四日一發

久則必為瘧母入門

瘧發有晝夜早晏之異

帝曰其作日晏與日早者何氣使然岐伯曰邪氣客於風府循

背而下衛氣一日一夜大會於風府其明日日下

一節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府

則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以此
作日稍益晏也其出於風府日下一節二十五日
下至骶骨二十六日入於脊內注於伏膂之脉其
氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益
早也內經○陽為晝發邪淺榮衛晝行背與脊故
也○陰為夜發邪深榮衛夜行臂與腹故也○陽
為子時至巳陰為午時至亥如發寅卯而退於未
申或發未申而退於子丑皆謂之陰陽不分須用
藥趙早或移時分定陰陽然後陽癰截住陰癰升
散入門○從卯至午發者邪在外也從午至酉發
者邪在內也從酉至子發或至
寅發者知邪在血分也保命

六經癰

夏傷於暑秋必病癰初不知何經受病隨其受
而取之有中三陽者有中三陰者大抵經中邪
氣其證各殊在太陽經者謂之寒癰治多汗之在
陽明經者謂之熱癰治多下之在少陽經者謂之
風癰治多和之此三陽受病皆謂暴癰發在夏至
後處暑前此乃傷之淺者近而暴也○在陰經者

則不分三陰皆謂之溫瘧其發在處暑後冬至前
此乃傷之重者遠而深也瘧瘧者老瘧也故謂之
久瘧保命○傷寒餘熱未淨重感於寒而變瘧名
曰溫瘧亦曰風瘧此為傷寒壞病其證先熱後寒
入門○瘧屬三陽宜汗宜吐瘧屬三陰宜下宜和
宜溫正傳○太陽瘧宜桂枝羌活湯麻黃羌活湯
○陽明瘧宜人參白虎湯柴苓湯方並見寒門
○少陽瘧宜柴胡桂枝湯柴胡加桂湯○三陰溫
瘧宜白虎桂枝湯麻黃白朮湯或小柴胡合四物
湯名曰柴胡四物湯○太陽陽明合病桂枝芍藥
湯桂枝石膏湯三陽合病宜

桂枝黃芩湯以和之保命

桂枝羌活湯

治太陽瘧自汗頭項痛腰脊強桂枝羌
活防風甘艸各一錢半右剉作一貼水

煎服
綱目

麻黃羌活湯

治太陽瘧無汗即前方去桂枝
加麻黃也劑法服法同上綱目

柴胡桂枝湯

治少陽瘧寒熱乍往乍來柴胡二錢桂枝黃芩人參芍藥半夏各一錢甘草五

分右剉一貼入薑三

棗二水煎服入門

柴胡加桂湯

治少陽瘧往來寒熱極驗柴胡三錢黃芩桂枝各二錢半夏一錢甘草四分右

剉作一貼入薑三

棗二水煎服入門

白虎桂枝湯

溫瘧者其脉如平身無寒但熱骨節煩疼時便難朝發暮解暮發朝解此藥主

之石膏四錢知母二錢桂枝甘草各一錢粳米一

合右剉作一貼水煎服

正。一名加減桂枝湯得

麻黃白朮湯

治風瘧麻黃桂皮青皮陳皮川芎白芷半夏麴紫蘇葉赤茯苓白朮桔梗細辛

檳榔甘艸各七分右剉作一

貼入薑三棗二水煎服直指

柴胡四物湯

治三陰經溫瘧或夜發者柴胡生乾地黃各二錢人參半夏黃芩甘草川芎當

歸赤芍藥各一錢右剉作一貼入薑三棗二水煎服

桂枝芍藥湯

治瘧寒熱大作此太陽陽明合病也謂之大爭寒熱作則必戰動發熱則必汗

泄經日汗出不愈知為熱也不治則恐久而傳入陰經宜用此桂枝一錢赤芍藥知母石膏黃芩各二錢右剉作一貼水煎服保命

桂枝石膏湯

治太陽陽明合病間日瘧熱多寒少石膏知母各三錢黃芩二錢桂枝一錢右

剉作一貼水煎服之入門

桂枝黃芩湯

服桂枝芍藥湯後寒熱轉甚者知太陽陽明少陽合病也宜用此和之柴胡二

錢石膏知母各一錢半黃芩人參半夏甘草各一錢二分桂枝一錢右剉作一貼水煎服保命

瘧晝發夜發宜分治

氣虛晝發宜六君子湯方見內傷加半夏黃

苓。○血虛夜發宜柴胡四物湯。方見上 桃仁承氣湯。方見寒門 麻黃黃芩湯。諸方

麻黃黃芩湯

治夜發癰麻黃三錢黃芩二錢甘草一錢半桂心一錢桃仁十五枚右剉作一

貼水煎臨臥服。○桃仁味苦甘辛肝者血之海血受邪則肝氣燥經所謂肝苦急食甘以緩之桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此麻黃黃芩湯乃發散血中風寒之劑也。目細

柴胡芎歸湯

治夜發陰癰引出陽分而散後服人參截癰飲止之 柴胡乾葛川芎各一錢桔

梗當歸赤芍藥人參厚朴白朮茯苓陳皮各七分紅花甘草各三分右剉作一貼入薑三棗二梅一水煎服

諸癰證治

癰有風癰寒癰熱癰溼癰痰癰食癰勞癰鬼癰疫癰瘡癰癰瘰癰老癰。諸方

風癰

自感風而得先熱後寒宜麻黃白朮湯無汗則宜散邪湯有汗則宜正氣湯。入門

寒瘧

自感寒而得寒多熱少宜人參養胃湯方見寒門
交解飲果附湯草果飲柴胡桂薑湯。一名此瘧
入門

熱瘧

因暑勝熱多得之一名瘧瘧亦日暑瘧宜人參白
虎湯柴苓湯二方見寒門柴胡知母湯爭功散龍
虎湯入門

溼瘧

因冒襲雨溼汗出澡浴得之寒熱相半小便
不利宜五苓散方見寒門加蒼朮川芎羌活入門

痰瘧

因外感內傷鬱聚成痰頭痛肉跳吐食嘔沫甚則
昏迷卒倒宜柴陳湯加草果或四獸飲冷附湯久
不止以露薑飲截之入門。有人忽得瘧疾嘔吐
異常以二陳湯方見瘧門加人參縮砂倍用白豆

蔻進一二貼自然寒熱不作蓋白豆蔻能消
能磨流行三焦榮衛一轉寒熱自平也直指

食瘧

一名胃瘧因飲食失節飢飽有傷所致寒已復熱
熱已復寒寒熱交併苦飢而不能食食則吐痰經

勞瘧

曰寒熱善飢而不能食食已支滿腹脹病以日作
名曰胃瘧是也宜平陳湯加枳實白朮山楂子神
麴青皮或清脾飲小清脾湯又二陳湯
加青皮檳榔縮砂白豆蔻亦佳諸方

即久瘧也寒熱微微寒中有熱熱中有寒最難調
治由表裏俱虛真氣未復疾雖暫止小勞復來經

年不差宜芎歸鼈甲散常山飲五勞丸六和湯烏

頭七棗湯露薑養胃湯十將軍丸一補一發丹辰

砂丸養胃丹諸方。久瘧屬元氣虛寒蓋氣虛則

寒血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火下流

則寒熱交作或吐涎不食或泄瀉腹痛手足逆冷

寒戰如慄皆脾胃虛弱也但服補中益氣湯方見

內傷諸證悉愈若投清

脾截瘧多致不起醫鑒

鬼瘧

因感尸疰客忤寒熱日作夢寐不祥多生恐怖宜
辟邪丹雄朱丹或燒人場土作丸塞男左女右鼻

門入中

疫癘

一方長幼相似或染時行變成寒熱須茶運氣用藥宜不換金正氣散方見寒門如意丹五瘟丹瘧瘧丸三方見瘟疫

瘴癘

挾山溪嵐瘴蒸毒之氣令人迷困發狂或啞乍寒乍熱乍有乍無南方多病此宜雙解飲子地龍飲羌活蒼朮湯瘴瘧丸方見瘟門觀音丸諸方

痧癘

者老癘也以其隔三日一發纏綿不去也綱目○三日一作邪入於三陰經也作於子午卯酉日者少陰經癘也作於寅申巳亥日者厥陰經癘也作於辰戌丑未日者太陰經癘也癘得於暑當以汗解夫感冒與風皆外邪也故非汗多不解必先與參朮等補劑為君加柴葛等發散藥漸而收汗得汗而虛又行補養下體屬陰最難得汗補藥力到汗出至足方是佳兆丹心○老癘係風暑之邪入在陰分宜用血藥引出陽分而散古方多用峻劑恐非所宜丹心○若感病極淡雖得大汗所感

之邪必自藏傳出至府其發無時必亂而失期若
發於午之後寅之前者血受病也為難愈須漸趨
早亦是佳兆故治此病春夏為易秋冬為難非有
他也以汗之難易為優劣也丹心○凡瘧經年不
差謂之老瘧必有痰水瘀血結成痞塊藏於腹脇
作脹且痛乃瘧母也雖內虛非常山檳榔決不能
除但須製熟則不損胃老瘧丸是也血虛者宜鼈
甲丸有水癖者暫用消癖丸以補脾化痰湯藥輔
之且量虛實用老瘧飲入門○老瘧宜七棗湯鼈
甲飲子參歸鼈甲散秘方清脾丸經效瘧丹黃甲
丸

散邪湯

治風癰初起川芎白芷麻黃白芍藥防風荊
芥紫蘇葉羌活各一錢甘州五分左右剉作一

貼入薑三葱白三莖煎
露一宿早晨溫服 醫鑑

正氣湯

治同上柴胡前胡川芎白芷半夏麥門冬檳
榔草果青皮赤茯苓各一錢桂枝甘州各五

分右剉作一貼入薑
三棗二水煎服 醫鑑

交解飲

治寒癰即雙解
飲子也方見下

果附湯

治脾寒癰疾面青振寒草果附子炮各二錢
半右剉作一貼入薑七棗二水煎服 入門

草果飲

治寒癰草果白芷良薑青皮川芎紫蘇葉
甘艸各一錢右剉作一貼水煎服直指

柴胡桂薑湯

治邪在半表裏寒熱往來極驗柴胡三
錢桂枝牡蠣各一錢半天花粉黃芩各

一錢乾薑甘艸各八分右
剉作一貼水煎服 入門

柴胡知母湯

治熱癰及瘰癧柴胡知母各一錢半蒼
朮黃芩乾葛陳皮半夏川芎各一錢甘

艸炙七分右剉作一貼入薑三梅二水煎清
晨服午前又一服久癰加人參當歸 節齋

爭功飲

治熱癰多效知母貝母柴胡常山梔子檳榔
地骨皮甘草各一錢蟬退二七箇右剉作一