



醫宗金鑑



上海錦華書局出版



醫宗金鑑卷二

內科

訂正仲景全書傷寒論註(下)

辨大陰病脈證并治全篇

六氣之邪。感入雖同。人受之而生病各異者。何也。蓋以人之形有厚薄。氣有盛衰。感有寒熱。所受之邪。每從其人之藏氣而化。故生病各異也。是以或從虛化。或從實化。或從寒化。或從熱化。譬諸水火。水感則火滅。火感則水耗。物感從化。理固然也。誠知乎此。又何疑乎。陽邪傳陰。變寒化熱。而遂以爲奇耶。自後漢迄今。千載以來。皆謂三陰寒邪不傳。且以傷寒傳經陰邪。謂爲直中。抑知直中乃中寒之證。非傳經之邪耶。是皆未曾熟讀仲景之書。故有此誤耳。如論中下利。腹脹滿。身體疼痛者。先溫其裏。乃攻其表。溫裏宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。此三陽陽邪傳入太陰。邪從陰化之寒證也。如少陰病下利。白通湯主之。此太陰寒邪傳少陰之寒證也。如下利清穀。裏寒外熱。汗出而厥者。通脈四逆湯主之。此少陰寒邪傳厥陰之寒證也。皆歷歷可據。豈得謂傷寒陰不相傳。無陽從陰化之理乎。夫太陰溼土。純陰之藏也。故病一入太陰。則邪從陰化者多。從陽化者少。從陰化者。如論中腹滿。吐食。自利。不渴。手足自溫。時腹自痛。宜服理中四逆輩者是也。從陽化者。如論中發汗後不解。腹滿痛者。急下之。宜大承氣湯。腹滿大實痛者。宜桂枝加大黃湯主之者是也。蓋脾與胃同處腹中。故腹滿腹痛兩皆有之。然腹滿爲太陰主病。心下滿爲陽明主病。其陽明亦有腹滿者。以陽明腹滿與熱同化。故必有潮熱自汗不大便之證。而不似太陰與溼同化。有發黃暴煩。

下利穢腐之證也。誠能更於腹之時痛大實痛腹滿痛處詳審虛實斟酌溫下則了無餘義矣。故以此括之。自知太陰之要法也。

太陰之爲病。腹滿而吐。食不下。自利益甚。時腹自痛。若下之必胸下結。〔按〕吳人駒曰。自利益甚四字。當在必胸下結。輒句之下。其說甚是。若在吐食不下句之下。則是已吐食不下。而自利益甚矣。仲景復曰。若下之無所謂也。

〔註〕太陰脾經也。其脈布胃中。終於隘。寒邪傳於太陰。故腹滿。時腹自痛。寒邪循脈犯胃。故吐食不下。此太陰裏虛邪從寒化之證也。當以理中四逆輩溫之。若腹滿隘乾不大便。大實痛。始爲太陰裏實。邪從熱化之證。當以桂枝加大黃湯下之矣。若以太陽虛寒之滿爾。而誤認爲太陰實熱之滿痛而下之。則裏虛相搏。必變爲藏結痞。輒及自利益甚矣。此太陰病全篇之提綱。後凡稱太陰病者。皆指此證而言也。〔集註〕程應旂曰。陽邪亦有腹滿。得吐則滿去而食可下者。今腹滿而吐。食不下。則滿爲寒脹。吐爲寒格也。陽邪亦有下利。腹痛。得利則痛。隨利減者。今下利而時腹自痛。則利爲寒利。痛爲寒痛也。曰胸下陰邪結於胸下之陰分。異於陽邪結胸之在胸。且按之而痛也。曰結輒無陽以化氣。則爲堅陰。異於痞之濡而輒也。彼皆陽從上陷而阻留。此則陰從下逆而不歸。寒熱大別也。吳人駒曰。自利有時。而腹自痛。非若積蓄而常痛者。若以諸痛爲實。從而下之。其滿益甚。必令胸下皆爲結輒。而自利益甚矣。

傷寒四五日。腹中痛。若轉氣下趨少腹者。此欲自利也。〔註〕傷寒四五日。邪入太陰之時也。腹中痛。若不轉氣下趨者。屬陽明也。今腹中痛。轉氣下趨少腹者。乃太陰欲作自利之候也。此仲景示人不可以諸痛爲實。而妄議下之意也。〔通註〕方可執曰。脈中痛。轉氣下趨者。裏虛不能守。而寒熱下迫也。張璐曰。腹痛亦有屬火者。其痛必自下而上攻。若痛自上而下趨者。定屬寒痛無疑矣。魏荔彤曰。此重在預防下利。而非辨寒熱也。玩若字欲字。可見其辨寒邪者。自有別法。

自利不渴者屬太陰。以其藏有寒故也。當溫之。宜服四逆輩。〔註〕凡自利而渴者。裏有熱。屬陽也。若自利不渴。則爲裏有寒。屬陰也。今自利不渴。知爲太陰本藏有寒也。故當溫之。四逆輩者。指四逆理中附子等湯而言也。〔集註〕

程知曰。言太陰自利爲寒。宜溫者也。少陰屬腎水。熱入而耗其水。故自利而渴。太陰屬脾土。寒入而從其溼。則不渴而利。故太陰自利當溫也。程應旆曰。三陰同屬藏寒。少陰厥陰有渴證。太陰獨無渴證者。以其寒在中焦。總與龍

雷之火無涉。少陰中有龍火。底寒甚則龍升。故自利而渴。厥陰中有雷火。故有消渴。太陰一照雷雨收聲。故發熱則利止。見厥而復利也。魏荔彤曰。自利二字。乃未經誤下。誤汗誤吐而成者。故知其藏本有寒也。

〔理中圓方〕

人參

白朮

甘草

乾薑

各二兩

以上四味。搗篩。蜜和爲丸。如雞子黃許大。以沸湯數合。和

一丸。研碎。溫服之。日三四夜。二服。腹中未熱。益至三四丸。然不及湯。湯法以四物。依兩數切。用水八升。煮取三升。去滓。溫服。一升。日三服。

加減法

若臍上築者。腎氣動也。去朮加桂四兩。吐多者。去朮加生薑三兩。下多者。選用朮。悸者。加茯苓二兩。渴欲

得水者。加朮。足前成四兩半。腹中痛者。加人參。足前成四兩半。寒者。加乾薑。足前成四兩半。腹滿者。去朮。

加附子一枚。服湯後。如須頃。飲熱粥一升許。微自溫。勿發揭衣被。

〔集解〕程應旆曰。陽之動。始於溫。溫氣得而穀精運。穀氣升而中氣贍。故名曰理中。實以變理之功。予中焦之陽也。蓋謂陽虛。卽中焦失守。膈中無發宣之用。六府無灑陳之功。猶如釜薪失焰。故下至清穀。上失滋味。五藏凌奪。諸證所由來也。參尤炙草。所以守中州。乾薑辛以溫中。必假之以燃釜薪。而騰陽氣。是以穀入於陰。長氣於陽。上輸下蓋。下攝州都。五藏六府皆受氣矣。此理中之旨也。若水寒互勝。卽當脾胃雙溫。加之附子。則命門益而土母溫矣。白朮補脾。得人參則壅氣。故臍下動氣。吐多腹滿。皆去朮也。加桂以伐腎邪。加生薑以止嘔也。加附子以消陰也。下多

者溼勝也。還用尤燥溼也。渴欲飲水飲渴也。加尤使飲化津生也。心下悸停水也。加茯苓導水也。腹中痛倍人參虛痛也。寒者加乾薑寒甚也。

傷寒本自寒下。醫復吐下之。寒格更逆吐下。若食入口即吐。乾薑黃連黃芩人參湯主之。〔按〕經論中並無寒下之病。亦無寒下之文。玩本條下文。寒格更逆吐下。可知寒下之下字。當是格字。文義始相屬。註家皆釋胃寒下利。不但文義不屬。且與芩連之藥不合。〔註〕經曰。格則吐逆。格者吐逆之病名也。朝食暮吐。脾寒格也。食入即吐。胃熱格也。本自寒格。謂其人本自有朝食暮吐寒格之病也。今病傷寒。醫見可吐可下之證。遂執成法。復行吐下。是寒格更逆於吐下也。當以理中湯溫其太陰。加丁香降其寒逆可也。若食入口即吐。則非寒格。乃熱格也。當用乾薑人參安胃黃連黃芩降胃火也。

〔乾薑黃連黃芩人參湯方〕 乾薑 黃連 黃芩 人參各三兩 以上四味。以水六升。煮取二升。去滓。分溫再服。

傷寒醫下之。續得下利清穀不止。身疼痛者。急當救裏。後身疼痛清便自調者。急當救表救裏。宜四逆湯。救表宜桂枝湯。〔註〕傷寒醫不分表裏寒熱虛實而誤下之。續得下利清穀不止者。寒其裏也。雖有通身疼痛之表未除。但下利清穀不止。裏寒已感。法當急救其裏。俟便利自調。仍身疼痛不止。再救其表可也。救裏宜四逆湯。溫中勝寒。救表宜桂枝湯。調榮和衛也。〔集註〕王三陽曰。此證當照顧協熱利。須審其利之色何如。與勢之緩急。不可輕投四逆桂枝也。喻昌曰。攻裏必須先表後裏。始無倒行逆施之患。惟在裏之陰寒極感。不得不急救其裏。俟裏證稍定。仍救其表。蓋謂救裏後再行救表也。

下利清穀。不可攻表。汗出必脹滿。〔註〕此詳上條。不先救裏而發其表。以明太陰少陰同病之證也。下利清穀。太陰寒邪已傳少陰。即有身痛不可攻表。若誤攻其表。即使汗出。太陽表解而太陰寒凝必脹滿矣。

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯【註】此承上條互發其證以明先裏後表之治也下利腹脹滿者裏寒邪也身體疼痛者表寒邪也凡表裏寒邪之證同見總以溫裏爲急故當先溫其裏後攻其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯【集註】方有執曰裏虛表實惟其虛也故必先之惟其實也故可後

馬

發汗後腹脹滿者厚朴生薑半夏甘草人參湯主之【註】發汗後表已解而腹滿者太陰裏虛之脹滿也故以厚朴生薑甘草半夏人參湯主之消脹散滿補中降逆也【集註】成無己曰吐後脹滿與下後脹滿皆爲實者言邪氣虛入裏而爲實也發汗後則外已解腹脹滿知非裏實由太陰不足脾氣不通故壅而爲滿也與此湯和脾胃而降逆氣宜矣汪琥曰此條乃汗後氣虛腹脹滿其人雖作脹滿而內無實形所以用人參炙甘草等甘溫補藥無疑也張錫駒曰此言發汗而傷其脾氣也脾主腹故腹滿爲太陰主病發汗後而腹脹滿則知其人脾氣素虛今脾氣愈虛則不能轉輸濁氣不降清氣不升而脹滿作矣

〔厚朴生薑半夏甘草人參湯方〕

厚朴半劬炙

生薑半劬

半夏半升

甘草二兩

人參一兩

以上五味

以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯【註】此詳申上條互發其義以別其治也發汗後表已解腹滿不痛者乃腹滿時減減復如故之虛滿也當溫之厚朴生薑半夏甘草人參湯證也今發汗後表不解腹滿大痛者乃腹滿不減減不足言之實滿也當下之宜大承氣湯蓋以裏急先攻裏後和表也【集註】喻昌曰減不足言四字形容腹滿如繪見滿至十分即減去一二分不足殺其勢也此所以縱有外邪未解而當下無疑耳程應旆曰下之而腹滿如故即減去一二分算不得減下之不妨再下必當以減盡爲度也

劉宏璧曰太陰無可下之法也設在經則各經已無可下之理在藏則太陰尤無受下之處桂枝加大黃湯安能無

疑乎不知脾與胃相表裏也太陽誤下太陰受邪適胃有宿食則脾因胃之實而實亦即因太陽之邪而痛矣既大滿大痛已成胃實又非此湯之所能治故宜大承氣湯也。

太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯【註】太陰經病脈當浮緩太陰藏病脈當沉緩今邪至太陰脈浮不緩者知太陽表邪猶未全罷也故卽有吐利不食腹滿時痛一二證其脈不沉而浮便可以桂枝發汗先解其外俟外解已再調其內可也於此又可知論中身痛腹滿下利急先救裏者脈必不浮矣【集註】王肯堂曰病在太陽脈浮無汗宜麻黃湯此脈浮當亦無汗而不言者謂陰不得有汗不必言也不用麻黃湯而用桂枝湯蓋以三陰兼表病者俱不當大發汗也須識無汗亦有用桂枝者程知曰此言太陰宜散者也太陰病謂有腹痛下利證也太陽脈尺寸俱浮今脈浮則邪還於表可知矣故宜用桂枝解散不用麻黃者陰病不得大發其汗也桂枝湯有和裏之意焉程應旄曰此太陰中之太陽也雖有裏病仍從太陽表治方不引邪入藏

本太陽病醫反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之太實痛者桂枝加大黃湯主之【註】本太陽中風病醫不以桂枝湯發之而反下之因而邪陷入裏餘無他證惟腹滿時痛者此屬大陰裏虛痛也故宜桂枝加芍藥湯以外解太陽之表而內調太陰之裏虛也若大滿實痛則屬太陰熱化胃實痛也故宜桂枝加大黃湯以外解太陽之表而內攻太陰之裏實也【集註】趙嗣真曰太陰腹滿證有三有次第傳經之邪有直入中寒之邪有下後內陷之邪不可不辨喻昌曰太陽病之誤下其變皆在胸脅以上此之誤下而腹滿時痛無胸脅等證則其邪已入陰位所以屬在太陰也仍用桂枝解肌之法以升發太陽之邪倍芍藥者以調太陰之氣本方不增一藥斯爲神耳大實大滿宜從急下然陽分之邪初陷太陰未可峻攻但於桂枝湯中少加大黃七表三裏以分殺其邪與大柴胡湯同其義也程應旄曰誤下太陽而成腹滿時痛太陰之證見矣然表邪內陷留滯於太陰非藏寒病也仍用桂枝湯升發陽邪但倍芍藥以調和之倘大實而痛於證似可急下然陰實而非陽實仍從桂枝例升發陽邪

但加大黃以破結滯之物使表裏兩邪各有去路則表隨實去不濕而自溫矣然此二證雖屬之太陰實從大陽傳來則脈必尙浮可知。

〔桂枝加大黃湯方〕於桂枝湯方內更加芍藥三兩隨前共六兩餘依桂枝湯法。

〔桂枝加大黃湯方〕桂枝三兩大黃二兩芍藥六兩甘草炙三兩生薑切三兩大棗二十枚擘以上六味以水七

升煮取三升去滓溫服一升日三服。

〔集解〕柯琴曰腹滿爲太陰陽明俱有之證然位同而職異太陰主出太陰病則腐穢氣凝不利故滿而時痛陽明主內陽明病則腐穢燥結不行故大實而痛是知大實痛是陽明病而非太陰病矣仲景因表證未解陽邪已陷入太陰故倍芍藥以益脾調中而除腹滿之時痛此用陰和陽法也若表邪未解而陽邪陷入陽明則加大黃以潤胃通結而除其大實之痛此雙解表裏法也凡妄下必傷胃之氣液胃氣虛則陽邪襲陰故轉屬太陰胃液涸則兩陽相搏故轉屬陽明屬太陰則腹滿時痛而不實陰道虛也屬陽明則腹滿大實而痛陽道實也滿而時痛是下利之兆大實而痛是燥屎之徵故倍加芍藥小變建中之劑少加大黃微示調胃之方也。

太陰爲病脈弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也〔註〕太陰爲病必腹滿而痛治之之法當以脈消息之若其人脈弱則其中不實雖不轉氣下趨少腹然必續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以胃氣弱難堪峻攻其便易動故也由此推之可知大便鞭者不論在陰在陽凡脈弱皆不可輕下也〔集註〕程知曰此言太陰脈弱恐續自利雖有腹痛不宜用攻與建中湯相發明也喻昌曰此段叮嚀與陽明篇中互相發明陽明曰不轉失氣曰先鞭後溏曰未定成鞭皆是恐傷太陰脾氣此太陰證而脈弱恐續自利雖有腹痛減用大黃芍藥又是恐傷陽明胃氣也汪琥曰或問大黃能傷胃氣故宜減芍藥能調脾陰何以亦減之答曰脈弱則氣餘不充仲景以溫甘之藥能生氣芍藥之味酸寒雖不若大黃之峻要非氣弱者所宜多用故亦減之。

傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也【註】傷寒脈浮而緩手足熱者爲繫在太陽今手足溫故知繫在太陰也太陰屬溼溼與熱瘀當發身黃小便自利者則溼不蓄熱不瘀故不能發黃也若至七八日大便鞭則爲轉屬陽明今既不鞭雖暴煩下利日十餘行必當自止何也以脈浮緩手足溫知太陰脾家素實邪不自容腐穢當去故也【集註】程知曰言自利之證脈浮緩手足溫則爲脾實也太陰脈本緩故浮緩雖類太陽中風而手足自溫則不似太陽之發熱更不似少陰厥陰之厥逆所以爲繫在太陰也太陰溼熱相蒸勢必發黃然小便利則溼下泄而不發黃矣此雖暴煩頻利有似少陰之證然其利當自止所以然者以脈浮緩手足溫知其人脾氣實而非虛寒之比其溼熱所積之腐穢自當逐之而下也若不辨晰而以四逆法治之則誤矣程應旌曰太陰得浮緩手足溫之脈證則胃陽用事自無藏寒之痛陰鬱或有之小便不利必發黃雖發黃不爲陰黃若小便自利者不能發黃陰欲鬱而陽必驅至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止所以然者脈不沉且弱而浮緩手足不涼而自溫陰得陽以周護則不寒不寒則不虛是爲脾家實也經曰陽道實陰道虛陰行陽道豈肯容邪久住此則腐穢當去故耳汪琥曰下利煩燥者死此爲先利而後煩是正氣脫而邪氣擾也茲則先煩後利是脾家之正氣實故不受邪而與之爭因暴發煩熱也

太陰中風四肢煩痛陽微陰瀯而長者爲欲愈【註】太陰中風者謂此太陰病是從太陽中風傳來者故有四肢煩疼之證也陰陽以浮沉言夫以浮微沉瀯之太陰脈而兼見陽明之長脈則爲陰病陽脈藏邪傳府故爲欲愈也【集註】程知曰傷寒陰邪也故自利宜用四逆傷風陽邪也故煩痛見於四肢凡太陰病脈浮者多是太陰中風喻昌曰微瀯之中更察其脈之長而不短知元氣未漓其病當自愈也

太陰病欲解時從亥至丑上【註】邪之解也必於所旺之時亥子丑乃太陰所旺之時也當此旺時故邪不能勝而

自解矣。

一音切

趨七句

揭詰

腐音

穢

於慶切

辨少陰病脈證并治全篇

少陰腎經水火之藏邪傷其經隨人虛實或從水化以爲寒或從火化以爲熱水化爲陰寒之邪是其本也火化爲陽熱之邪是其標也陰邪其脈沉細而微陽邪其脈沉細而數至其見證亦各有別陰邪但欲寐身無熱陽邪雖欲寐則多心煩陰邪背惡寒口中和陽邪背惡寒則口中燥陰邪咽痛不腫陽邪咽痛則腫陰邪腹痛下利清穀陽邪腹痛下利清水或便膿血也陰邪外熱面色赤裏寒大便利小便白陽邪外寒手足厥裏熱大便秘小便赤此少陰標本寒熱之脈證也凡從本之治均宜溫寒回陽從標之治均宜攻熱救陰回陽救陰其機甚微總在臨證詳究辨別標本寒熱以急施其治庶克有濟稍緩則不及矣

少陰之爲病脈微細但欲寐也【註】少陰腎經陰感之藏也少陰受邪則陽氣微故脈微細也衛氣行陽則寤行陰則寐少陰受邪則陰感而行陰者多故但欲寐也此少陰病之提綱後凡稱少陰病者皆指此脈證而言也【集註】方有執曰少陰腎經也居於極下其脈起於小趾之下靈樞曰是主所生病者嗜臥但欲寐蓋人肖天地天地之氣行於陽則闢而曉行於陰則闔而夜故人之氣行於陽則動而寤行於陰則靜而寐凡人但欲寐者邪客於陰故也張璐曰此言少陰之總脈總證也蓋少陰屬水主靜即使熱邪傳至其經在先之脈雖浮大此時亦必變爲沉細在先之證雖煩熱不寧此時亦必變爲昏沉嗜臥但須辨出脈細沉數口中燥爲熱證脈沉微細口中和爲寒證以此明辨萬無差誤矣程應旸曰凡陰脈皆沉異乎太陽之浮不必言矣陽明脈大微者大之反少陽脈弦細者弦之反沉兼微細陰證定矣

少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯主之【註】少陰病謂但欲寐也脈沉者謂脈不微細而沉也今始

得之當不發熱而反發熱者是爲少陰之裏寒兼有太陽之表熱也。故宜麻黃附子細辛湯。溫中發汗。顧及其陽則兩感之寒邪均得而解之矣。【集註】方有執曰：發熱邪在表也。脈沉少陰位北而居裏也。以其居裏邪在表而發熱。故曰反也。以邪在表不在裏。故用麻黃以發之。以其本陰而標寒。故用附子以溫之。細辛辛溫通於少陰。用之以佐主治者。以其專經而爲向導也。程知曰：三陰表法與三陽不同。三陰必以溫經之藥爲表。而少陰尤爲緊關。故用散邪溫經之劑。俾外邪之深入者可出。而內陽亦不因之外越也。程應旆曰：一起病便發熱。兼以陰經無汗。世有計日按證者。類能用麻黃而忌在附子。不知脈沉者。由其人腎經素寒。裏陽不能協應。故沉而不能浮也。沉屬少陰。不可發汗。而始得病時。卽發熱則兼太陽。又不得不發汗。須以附子溫經助陽。託住其裏。使陽不至隨汗而越。其麻黃始可合細辛用耳。林瀾曰：傳邪與陰寒皆有沉脈。沉但可爲病之在裏。而未可專以沉爲寒也。夫少陰證中。微細而沉。與細數而沉。其爲寒熱之殊。蓋大有別矣。

〔麻黃附子細辛湯方〕

麻黃二兩

細辛二兩

附子一枚炮去皮破八片

以上三味。以水一斗。先煮麻黃。減二升。去上

沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

少陰病得之二三日。麻黃附子甘草湯微發汗。以二三日無裏證。故微發汗也。【註】此詳上條少陰病得之二三日。仍脈沉發熱不解者。宜麻黃附子甘草湯微發其汗也。蓋謂二三日不見吐利裏寒之證。知邪已衰。然熱仍在外。尙當汗之。但不可過耳。故不用細辛而用甘草。蓋於溫散之中。有和意也。此二證皆未曰無汗。非仲景略之也。以陰不得有汗。不須言也。【彙註】張璐曰：少陰無發汗之法。汗之必至亡陽。惟此一證。其外有太陽發熱無汗。其內不吐利。躁煩嘔渴。乃可溫經散寒。取其微似之汗也。程應旆曰：旣云微發汗矣。仍用以字。故字推原之。足見鄭重之意。按此二條與太陽篇發熱頭痛脈沉用四逆者同一證。彼以不差。則期過三日。可知病已入裏。雖尙冒太陽頭痛。直以少陰法律之。此少陰病在初得二三日。雖無頭痛證。不容竟作少陰治之。故仍兼太陽之法。以律之一出一入。不

啻爰書假令前條得之二三日後二條過二三日不差則四逆之與麻黃易地皆然矣。汪琥曰上條反發熱脈沉此亦反發熱脈沉但上言始得之爲急此言得之二三日爲緩病勢稍緩治法亦緩。

〔麻黃附子甘草方〕

麻黃二兩

附子一枚炮去

甘草二兩

以上三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上

沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服。

〔集解〕柯琴曰彼太陽病而脈反沉便用四逆以急救其裏是裏寒陰盛也此少陰脈而表反熱便於表劑中加附子以預固其陽是表熱陽衰也夫以發熱無汗太陽之表脈沉但欲寐少陰之裏設用麻黃開腠理細辛散浮熱而無附子以固元陽則太陽之微陽外亡惟附子與麻黃並用則寒邪散而陽不亡此裏病及表脈沉而當發汗者與病在表脈浮而發汗者迥庭也若表微熱則受寒亦輕故以甘草易細辛而微發其汗甘以緩之與辛以散之者又少間矣。

少陰病脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱瀉者復不可下之〔註〕少陰病脈微雖有發熱亦爲少陰裏寒外熱非太陽發熱者可比故不可發汗發汗則亡陽然陽已虛津液已涸卽見少陰口燥咽乾可下之證若尺脈弱瀉者復不可下之又恐亡陰也〔集註〕方有執曰微者陽氣不充故曰無陽無陽則化不行故汗不可發也尺以候陰弱瀉者陰血不足也故謂復不可下其當亟行溫補又可知矣程應旆曰少陰多自利證人固無肯輕下者但拈出尺脈弱瀉字則少陰之有大承氣湯證其尺脈必強而滑已伏見於此處矣。

病人脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利〔註〕病人脈陰陽俱緊發熱無汗者太陽傷寒證也發熱汗出不止者太陽亡陽證也今脈緊無熱而反汗出此屬少陰然少陰證法當咽痛而復吐利也上條脈微無汗不可發汗者是以脈爲主也此條有汗脈緊不可發汗者是以證爲主也從脈從證不可不察〔集註〕程知曰陰陽俱緊傷寒之脈也法當無汗而反汗出太陽之陽外亡也若以少陰亡陽之證而認爲太陽中風之證則

誤矣。少陰之表上逼則咽痛而吐下逼則下利也。

少陰病脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反去者爲欲解也。雖煩下利必自愈。〔註〕此承上條互發其義以別陰陽寒熱也。少陰病脈沉微細寒邪脈也。脈沉數細熱邪脈也。若脈緊汗出是少陰寒虛證也。今脈緊無汗乃少陰寒實證也。因循至七八日之久而自下利若寒實解則脈必緊去而暴微其證必手足由冷而反溫是知邪隨利去爲欲解也。故此時雖煩下利乃陰退陽回故知其必自愈也。〔集註〕方有執曰緊寒邪也。自下利脈暴微者陰寒內瀉也。故謂手足爲反溫言陽回也。陽回則陰退故謂緊反去爲欲解也。夫寒邪在脈而脈緊得自利脈暴微手足溫緊去爲欲解者猶之邪在陽脈數而熱得汗出脈和身涼數去爲欲愈之意同。陰陽勝復之機也。程應旆曰脈於利後頓變緊而爲微手足於利後變不溫而爲溫則微非諸微亡陽之微乃緊去人安之微蓋以從前之寒已從下利而去故陽氣得回而欲解也。雖煩下利必自愈。

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之。〔附子湯主之。〕〔註〕背惡寒爲陰陽俱有之證如陽明病無大熱口燥渴心煩背微惡寒者乃白虎加人參湯證也。今少陰病但欲寐得之二三日口不燥而和其背惡寒者乃少陰陽虛之背惡寒非陽明熱蒸之背惡寒也。故當灸之更主以附子湯以助陽消陰也。口燥口和誠二者之確徵矣。

〔集註〕程知曰言初得之證口中和不渴不燥全無裏熱也。內經曰背爲陽背惡寒則陽虛陰盛寒深可知若風寒在表而惡寒則一身盡寒矣。灸之以助陽消陰與附子湯以溫經散寒論中云傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎湯加人參主之。彼是陽熱乘陰虛而內陷之惡寒與此之陰寒感者不同。陽入陰者則口燥心煩微寒感者則不能銷鑠津液故口中和。張璐曰太陽表氣大虛邪氣得入犯少陰故得之一二日尚背惡寒不發熱此陰陽兩虧較之兩感更自不同。兩感表裏皆屬熱邪猶堪發表攻裏此則內外皆屬虛寒無邪熱可以攻擊。惟當溫經補陽以溫補其不足更灸關元以協助之。雖其證似緩於發熱脈沉而危殆尤甚焉。汪琥曰此條論仲景不言當灸

何穴常器之云當灸鬲俞關元穴背俞第三行郭雍云此有錯字當是灸鬲俞關元穴也鬲俞是背俞第二行穴按鬲俞實係背俞部第二行穴然常器之所云第三行穴者當是鬲關非鬲俞也圖經云鬲關二穴在第七椎下兩旁相去各三寸陷中正坐取之足太陽氣脈所發專治背惡寒脊強俯仰難可灸五壯蓋少陰中寒必由太陽而入故宜灸其穴又關元一穴在腹部中行臍下三寸足三陰任脈之會可灸百壯常器之所謂灸鬲關者是溫其表以散外邪灸關元者是溫其裏以助其元氣也

少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之〔註〕此承上條詳舉其證互發其義以出其治也身體痛表裏俱有之證也如太陽病脈浮發熱惡寒身痛手足熱骨節痛是爲表寒當主麻黃湯發表以散其寒今少陰病脈沉無熱惡寒身痛手足寒骨節痛乃是裏寒故主附子湯溫裏以散寒也〔巢註〕方有執曰少陰腎也腎主骨寒淫則痛程應旄曰身體痛手足寒骨節痛太陽傷寒同有此證也以脈沉辨之沉屬陰寒重著所致裏陰有餘表陽不足故以附子湯主之

〔附子湯方〕附子二枚去皮 茯苓三兩 人參二兩 白朮四兩 芍藥三兩 以上五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

〔方解〕少陰爲寒水之藏故寒傷之重者多入少陰所以少陰一經最多死證方中君以附子二枚者取其力之銳且以重其任也生用者一以壯少火之陽一以散中外之寒則身痛自止惡寒自除手足自溫矣以人參爲臣者所以固生氣之原令五臟六府有本十二經脈有根脈自不沉骨節可和矣更佐白朮以培土芍藥以平木茯苓以伐水水伐火自旺旺則陰翳消木平土益安安則水有制制則生化此誠萬全之術也其有畏而不敢用以致因循有誤者不誠可惜哉

少陰病脈沉者急溫之宜四逆湯〔註〕少陽病但欲寐脈沉者若無發熱口燥之證則寒邪已入其藏不須遲疑急

溫之以四逆湯消陰助陽可也。【巢註】吳人駒曰脈沉須別虛實及得病新久若得之多日及沉而實者須從別論。

〔四逆湯方〕 甘草二兩 乾薑一兩 附子一枚生用去 以上三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再

服強人可大附子一枚乾薑三兩。

〔方解〕方名四逆者主治少陰中外皆寒四肢厥逆也。君以甘草之甘溫溫養陽氣臣以薑附之辛溫助陽勝寒甘草得薑附鼓舞陽溫中寒有水中煖土之功薑附得甘草通關節走四肢有逐陰回陽之力腎陽鼓寒陰消則陽氣外達而脈自升手足自溫矣。【巢註】汪琥曰少陰病本脈微細但欲寐今輕取之微脈不見重取之細脈幾亡伏匿而至於沉此寒邪深入於裏殆將入藏溫之不容以不急也稍遲則惡寒身踈吐利煩躁不得臥寐手足逆冷脈不至諸死證立至矣四逆湯之用可稍緩乎。

少陰病下利白通湯主之。【註】少陰病但欲寐脈微細已屬陽爲陰困矣更加以下利恐陰降極陽下脫也故君以葱白大通其陽而上升佐以薑附急勝其陰而緩之則未脫之陽可復矣。【巢註】方有執曰少陰病而加下利者不獨在經而亦在藏寒甚而陰盛也治之以乾薑附子者勝其陰則寒自散也用葱白而曰白通者通其陽則陰自消也。程知曰此言下利宜通其陽也少陰病謂有脈微細欲寐證也少陰下利陰盛之極恐致格陽故用薑附以消陰葱白以升陽通云者一以溫之而令陽氣得入一以發之而令陰氣易散也。汪琥曰腎虛無火不能主水故下利用白通湯者溫裏以散寒也。

〔白通湯方〕 葱白四 乾薑一 附子一枚生去 以上三味以水三升煮取一升去滓分溫再服。

【集解】汪琥曰此方與四逆湯相類獨去甘草蓋驅寒欲其速辛烈之性取其驟發直達下焦故不欲甘以緩之也而猶重在葱白少陰之陰天之寒氣亦爲陰兩陰相合而偏於下利則與陽氣隔絕不通薑附之力雖能益陽不能

使眞陽之氣必入於陰中。惟葱白味辛能通陽氣。令陰得陽而利。庶可愈矣。蓋大辛大熱之藥。不過藉以益人陽氣。非有以通之。令眞陽和會。而何以有濟也耶。

少陽病下利脈微者。與白通湯利不止。厥逆無脈。乾嘔煩者。白通加豬膽汁湯主之。服湯脈暴出者死。微續者生。

【註】此承上條詳申其脈以明病進之義也。少陰病下利脈微者。與白通湯下利當止。今利不止而轉見厥逆無脈。更增乾嘔而煩者。此陰寒感極。格陽欲脫之候也。若端以熱藥治寒。寒既甚。必反格拒而不入。故於前方中加入人豬膽之陰。以引陽藥入陰。經曰。逆者從之。此之謂也。無脈者。言診之而欲絕也。服湯後更診其脈。若暴出者。如燭燼焰高。故主死。若其脈徐徐微續而出。則是眞陽漸回。故可生也。故上條所以纔見下利。卽用白通以治於未形。誠善法也。【巢註】程知曰。此言陰感格陽。用膽汁通陰法也。以白通與之。宜乎陽可救。今乃利不止。反至厥逆無脈。則陰邪愈無忌矣。乾嘔而煩。則陽藥在膈而不入陰矣。此非藥不勝病。乃無鄉導之力也。加人尿豬膽之陰寒。則可引薑附之溫。入格拒之寒。而調其逆。此內經從治之法也。程應旆曰。脈暴出者死。無根之陽驟逆諸外也。微續者生。陽氣漸交。陰育納也。

〔白通加豬膽汁湯方〕 葱白^四 乾薑^兩 附子^{一枚} 破入片 人尿^合 豬膽汁^合 以上三味。以水三升。煮

取一升。去滓。內膽汁。人尿。和令相得。分溫再服。若無膽亦可。

〔方解〕是方卽前白通湯。加入人尿豬膽汁也。加尿膽者。從其類也。下咽之後。冷體既消。熱性便發。情且不違。而致大益。則二氣之格拒可調。上下之陰陽可通矣。

少陰病欲吐不吐。心煩但欲寐。五六日自利而渴者。屬少陰也。虛故引水自救。若小便色白者。少陰病形悉具。小便白者。以下焦虛有寒。不能制水。故令色白也。【註】少陰病欲吐不吐。心中煩但欲寐。五六日自利而渴者。此屬少陰。傳邪寒熱俱有之證也。若是少陰熱而燥。乾引水之渴。小便必色赤。乃少陰燥不能生津。下焦有熱也。今爲少陰虛。

而引水自救之渴故小便則色白是少陰虛冷不能化液下焦有寒也於此可知少陰病形悉具而渴者有寒熱二端之別也。【註】成無己曰欲吐不吐心煩者表邪傳裏也若腹滿痛則屬太陰此但欲寐則知屬少陰五六日邪傳少陰之時若自利不渴寒在中焦屬太陰也此自利而渴爲寒在下焦屬少陰也腎虛水燥故渴欲引水自救下焦虛寒故小便色白下利而渴小便色白非裏熱可知矣。方有執曰此反覆申明曉人勿認煩渴均爲熱證以致誤之意。程應旸曰煩證不盡屬少陰故指出但欲寐來渴證不盡屬少陰故指出小便白來結以下焦虛有寒教人上病治在下也蓋上虛而無陰以濟總由下虛而無陽以溫也二虛字皆由寒字得來又曰吐利而渴與豬苓湯證同其別在但欲寐且豬苓證小便必不利而色赤飲水與白頭翁證同彼曰以有熱故也小便亦必不白。林瀾曰欲吐不吐心煩陽虛格越於上但欲寐自利小便白裏之真寒已深要知此渴與口燥舌乾之渴不同若兼腹滿便閉證語諸證自當作陽邪傳裏治之既裏虛自利小便白其爲虛寒明甚特曰下焦者足見陰既感於下陽必格於上豈可以煩渴而誤攻其熱哉。汪琥曰以全文觀之大似熱證惟小便色白知爲真寒之證此但欲寐與熱邪不同其寐必不昏濁其呼吸必促而細曰屬少陰也以別其非陽邪之渴乃內無津液引水自救之渴試以冷水飲之必不多也細察其小便若色白者此少陰虛寒之證悉具也非熱邪可知矣。沈明宗曰此少陰虛寒似乎熱證之辨也世但知四肢厥逆爲虛寒證詎知小便色白乃爲的驗乎。吳人駒曰陽明之欲吐則不得寐在少陰則但欲寐引此以爲感虛之別。

少陰病飲食入口則吐心中溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胸中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之宜四逆湯。【按】溫溫當是嗚嗚嗚嗚者乃吐飲之狀也。【註】此承上條欲吐不吐詳別脈證以明其治也飲食入口即吐且心中嗚嗚欲吐復不能吐惡心不已非少陰寒虛吐也乃胸中寒實吐也故始得之脈弦遲弦者飲也遲者寒也而手足寒者乃胸中陽氣爲寒飲所阻不能通於四肢也寒實在胸當因而越