

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷十四



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

齊肅

胃經
胃經
胃經
胃經

明
薛已
撰

傷或陰虛火熾或腎水
煩渴飲冷脈洪數而有

散并隔蒜灸以除濕熱

漫腫微痛渴不飲冷脉洪數而無力乃陰虛火熾當用
六味丸及補中益氣湯以滋化源若口舌乾燥小便頻
數或淋漓作痛乃腎水虧損急用加減八味丸及前湯
以固根本引火歸經若不成膿不腐潰陽氣虛也四君
加歸芪不生肌不收斂脾氣虛也十全大補湯若色黯
不潰或潰而不斂乃陰精消涸名曰腦爍為不治若攻
補得宜亦有可愈治者審焉

治驗

一婦人患前症口乾舌燥內服清熱外敷寒涼色黯不
覺胸中氣噎此內真寒而外假熱也彼疑素有痰火不
欲溫補余以參芪各五錢薑桂各三錢一劑頓然潰又
用大補藥而愈

一婦人冬間患此腫痛熱渴余用清熱消毒藥潰之而
愈次年三月其舌腫大遍身發疔如葡萄不計其數手
足尤多乃脾胃受毒也先各刺出黑血隨服奪命丹七
粒出臭汗瘡熱益甚便秘二日與大黃芩連各三錢升

麻白芷山梔薄荷連翹各二錢生甘草一錢水煎三五
沸服之大小便出臭血甚多下體稍退乃磨入犀角汁
再服舌本及齒縫出臭血諸毒乃消更以犀角地黃湯
而愈

耳瘡

耳瘡屬手少陽三焦經或足厥陰肝經血虛風熱或肝
經燥火風熱或腎經虛火等因若發熱炊痛屬少陽厥
陰風熱用柴胡梔子散若內熱痒痛屬前二經血虛用

當歸川芎散若寒熱作痛屬肝經風熱用小柴胡湯加
山梔川芎若內熱口乾屬腎經虛火用加味地黃丸如
不應用加減八味丸餘當隨症治之

治驗

文選姚海山耳根赤腫寒熱作痛此屬三焦風熱也但
中氣素虛以補中益氣加山梔炒黃芩牛蒡子治之而
愈

一儒者因怒耳內作痛出水或用祛風之劑筋攣作痛

肢體如束此肝火傷血也用六味九料數服而愈

舉人毛石峯子年二十耳內出水或作痛年餘矣脉洪數左尺益甚此屬肝腎二經虛熱也用加減八味九料一劑而愈

一男子每入房耳內或作痒或出水常以銀簪探入甚喜陰涼此屬腎經虛熱也用加減八味九而愈

一婦人因怒發熱每經行即兩耳出膿兩太陽作痛以手按之痛稍止怒則胸脇乳房脹痛或寒熱往來或小

便頻數或小腹脹悶此皆屬肝火血虛也先用梔子清肝散二劑又用加味道遙散數劑諸症悉退又以補中益氣加五味而全愈

一婦人經行後因怒氣勞役發熱寒熱耳內作痛余以經行為血虛用八珍湯加柴胡怒氣為肝火用加味道遙散勞役為氣傷用補中益氣湯加山梔而愈

一婦人耳內作痛或腫聾寒熱發熱面色素青黃經行則變赤余以為怒氣傷肝鬱結傷脾用加味歸脾湯加

味道遙散而愈

一婦人耳內癰痛寒熱口苦耳內出水燠連頸項飲食少思此肝火盛而傷脾也用小柴胡湯加山梔牡丹皮調補肝脾而全愈

一孀婦或耳內外作痛或項側結核內熱晡熱月經不調唾痰少食胸膈不利余以為鬱怒傷肝脾朝用歸脾湯以解脾鬱生脾氣夕用加味道遙散以清肝火生肝血而愈

太卿魏莊渠癸卯仲冬耳內作痛左尺洪大而澁余曰
此腎水枯竭不能生肝木當滋化源彼不信仍雜用直
補之劑余謂其壅陸時若曰莊渠不能生腎水來春必
不能起至明年季春十八日復請治昏憤不語頤耳之
分已有膿矣且卵縮便數方信余言求治辭不克用六
味丸料一鍾陰莖舒出小便十減六七神思頓醒余曰
若砭膿出庶延數日為立嗣之計否則膿從耳出死立
待矣或謂不砭可生者余因辭歸翌日果耳內出膿至

二十一日巳未火日而卒

憲副姜時川癸卯冬右手寸口浮數而有痰口內若有
瘡然余曰此胃火傳於肺也當薄滋味慎起居以禦之
甲辰秋尺脉洪數而無力余曰此肺金不能生腎水無
根之火上炎也宜靜調理滋化源以治之彼云今喉耳
不時燥痛肢體不時發熱果是無根之火殞無疑矣後
會劉古峽云姜公之病已如尊料遂拉同往視喉果腫
潰脉愈洪大又誤以為瘡毒而投苦寒之劑卒于仲春

二十八日乃藥之促其亡也否則尚能延至仲夏

鬚疽 男婦同用

鬚疽屬肝胆二經怒火或風熱血虛所致若發熱作渴者用柴胡清肝散腫舉痛甚者用仙方活命飲若大勢已退餘毒未散用參芪歸朮為主佐以川芎白芷金銀花以速其膿膿成仍用參芪之類托而潰之若欲其生肌收斂脾虛者六味丸血虛者四物加參芪或血燥或水而不能生木者用四物湯六味地黃丸氣虛者用補

中益氣湯皆當滋其化源為善

治驗

侍御朱南臯患前症腫痛發熱日晡尤甚此肝胆二經血虛火燥也用四物湯加玄參柴胡桔梗炙草治之而愈又因勞役發熱畏寒作渴自汗用補中益氣湯去柴升加五味麥門炮薑而瘥

州守胡廷器年七十患前症腫焮作痛頭目俱脹此腎水不足肝胆火盛而血燥也用六味丸料四劑瘡頭出

水而愈後因調養失宜仍瘧痛煩熱喘渴脉洪大而虛
此脾胃之氣傷也用補中益氣以補脾胃用六味地黃
丸以補腎肝而痊

瘰癧

婦人症見婦人良方
小兒症見小兒撮要

夫瘰癧之症屬三焦肝胆二經怒火風熱血燥或肝腎
二經精血虧損虛火內動或恚怒氣逆憂思過甚風熱
邪氣內搏於肝益怒傷肝肝主筋肝受病則筋累累然
如貫珠也其候多生於耳前後項腋間結聚成核初覺

憎寒惡熱咽項強痛苦寒熱熈痛者此肝火風熱而氣病也用小柴胡湯以清肝火并服加味四物湯以養肝血若寒熱既止而核不消散者此肝經火燥而血病也用加味逍遙散以清肝火六味地黄丸以生腎水若腫高而稍軟面色痿黃皮膚壯熱膿已成也可用針以決之及服托裏之劑若經久不愈或愈而復發膿水淋漓肌膚羸瘦者必純補之劑庶可收斂否則變成九癰內經曰陷脈為癰留連肉腠即此病也外用豆豉餅琥珀

膏以驅散寒邪補接陽氣內服補中益氣湯六味九以
滋腎水培肝木健脾土亦有可愈者大抵肝膽部分結
核不問大小其脉左關弦緊左尺洪數者乃腎水不能
生肝木以致膽火燥而筋攣須用前藥以滋化源是治
其本也外臺秘要云肝腎虛熱則生癰病機云癰癰不
係膏粱丹毒火熱之變因虛勞氣鬱所致止宜補形氣
調經脉其瘡自消散蓋不待汗之下之而已也其不詳
脈證經絡受病之異者下之則犯經禁病禁虛虛之禍