

女科準繩 四之三

胎前門

心腹脹滿 胎水腫 腹內鍾鳴  
積聚 孕心腹脹傷 中惡 中風  
風癰 因觸冷飲發動 驚悸 痞  
煩 乾嘔 吐 胃用六島 滯下 小便不通  
喘 瘧 霍 婦飲食 尿血  
小便不通

心腹脹滿

大全夫妊娠心腹脹滿者由腹內素有寒氣致令停飲妊娠重因觸冷飲發動與氣相平故令心腹脹滿也薛前證若外感風寒內傷飲食用藿香正氣散

雜病中風

若食傷脾胃用六君子湯若陽氣壅滯用紫蘇

飲

胎上逼心

一妊婦飲食停滯心腹脹滿或用人參養

胃湯加青皮山查枳殼其脹益甚其胎上攻惡心不食右關脉浮大按之則弦此脾土不足肝木所侮用六君子加柴胡升麻而愈後小腹痞悶用補中益氣湯升舉脾氣而瘥妊婦腹脹小便利吐逆諸

醫雜進溫胃寬氣等藥服之反吐轉加脹滿湊心驗之胎死已久服下死胎藥不能通因得鯉魚湯其論曰妊婦通身腫滿或心胸急脹名曰胎水遂去妊婦胸前看之胸肚不分急以鯉魚湯三五服大小便皆下惡水腫消脹去方得分娩死胎此證蓋因懷妊腹大不自知覺人人皆謂妊娠孕如此終不知胎水之患也

倉公下氣湯 治妊娠心腹脹滿兩脇妨悶不下飲食四肢無力

羌活

赤芍藥

甘草

檳榔

青皮

大腹皮

陳皮

赤茯苓

半夏

桑白皮

桂心

各半兩

紫蘇莖

貳兩

咬咀每服三錢水壹盞薑伍片棗壹箇煎柒分去

滓服無時

局方分心氣飲大同小異加燈心煎

訶梨勒散

療妊娠心腹脹滿氣衝胸膈煩悶四肢

少力不思飲食

訶梨勒

赤茯苓

前胡

各壹兩

陳皮

大腹皮

桑白皮

各柒錢半

枳殼

川芎

白朮

各半兩



右爲粗末每服肆錢水壹盞半薑三片棗子壹箇煎至柒分去滓溫服無時

安胎和氣飲 治胎冷腹脹痛引兩脇小便頻數大便虛滑

訶子

麵裹煨  
去核

白朮

各貳錢

陳皮

去白

高良薑

炒

木香

不見火

白芍藥

陳米

炒

甘草

炙各壹錢

右作一服水貳盞生薑五片煎至壹鍾不拘時服

忌食生冷之物

治妊娠心下滿氣急切痛

赤茯苓

陸分

桑白皮

伍分

前胡

肆分

郇李仁

檳榔

各叁分

右爲細末以水壹升煮取一半去滓夜卧服

紫蘇飲

治妊娠心腹脹滿兩脇妨悶

見胎上逼心

枳殼湯

治婦人妊娠腹脹

枳殼

叁兩

黃芩

壹兩

爲粗末每服五錢水盞半煎溫服

如胎前腹滿

身體沉重加白朮壹兩

仲景婦人懷妊六七月脉弦發熱其胎愈脹腹痛惡

寒者少腹如扇所以然者子藏寒故也當以附子湯

溫其藏

附子湯方

附子

貳枚炮去皮破掇片

白朮

肆兩

茯苓

芍藥

各叁兩

人參

貳兩

右五味以水捌升煮取叁升去滓溫服壹升日三服

婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰以上重如有水氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺瀉勞宮及關元小便微利則愈

# 胎水腫滿

產寶論曰夫妊娠腫滿由臟氣本弱因產重虛土不尅水血散入四肢遂致腹脹手足面目皆浮腫小便秘澀陳無擇云凡婦人宿有風寒冷濕妊娠喜腳腫俗呼爲皺脚亦有通身腫滿心腹急脹名曰胎水

論曰凡妊娠之人無使氣極若心靜氣和則胎氣安穩若中風寒邪氣及有所觸犯則隨邪而生病也凡妊娠經血壅閉以養胎若忽然虛腫乃胎中挾水水血相搏脾胃惡濕主身之肌肉濕漬氣弱則肌肉虛水氣流溢故令身腫滿也然其由有自或因泄瀉下



痢臟腑虛滑耗損脾胃或因寒熱瘧疾煩渴引飲太過濕漬脾胃皆能使頭面或手足浮腫也然水漬於胞兒未成形則胎多損壞及其臨產日脚微腫乃胞藏水少血多水出於外故現微腫則易生也宿有寒氣因寒冷所觸故能令腹脹腫滿也 產乳集論妊娠自三月成胎之後兩足自脚面漸腫腿膝以來行步艱辛以至喘悶飲食不美似水氣狀至於脚指間有黃水出者謂之子氣直至分娩方消此由婦人素有風氣或衝任經有血風未可妄投湯藥亦恐大段甚者慮將產之際費力有不測之憂故不可不治於

未產之前也古方論中少有言者按名醫錄宋少主  
元徽中與徐文伯微行學鍼法文伯見一妊婦足腫  
不能行少主脉之此女形也文伯診之曰此男胎也  
在左則胎黑色少主怒欲破之文伯惻然曰臣請針  
之胎遂墮男形而色黑此妊娠足腫之說見於古者  
今巢氏病源中但有子煩之論千金并產寶方亦略  
言之劉禹錫續傳廣信方以爲妊婦有水氣而成胎  
太平聖惠亦言之皆非也元豐中淮南陳景初名醫  
也獨有方論治此病方名初謂之香附散李伯時易  
名曰天仙藤散也

薛前證若胸滿腹脹小便不通

遍身浮腫用鯉魚湯脾胃虛弱佐以四君子若面目  
虛浮肢體如水氣用全生白朮散如未應用六君子  
湯脾虛濕熱下部作腫用補中益氣加茯苓若飲食  
失宜嘔吐泄瀉用六君子湯若腿足發腫喘悶不安  
或指縫出水用天仙藤散脾胃虛弱兼四君子湯如  
未應用補中益氣湯若脾肺氣滯用加味歸脾湯佐  
以加味逍遙散 一妊婦每胎至五月肢體倦怠飲  
食無味先兩足腫漸至遍身後及頭面此是脾肺氣  
虛朝用補中益氣夕用六君子加蘇梗而愈凡治妊  
娠毋泥月數但見某經證卽用本藥爲善 一妊婦

年三十八妊娠水腫以鯉魚湯加五苓散人參濕加  
蒼朮壹錢厚朴陳皮五分蘿蔔子炒車前子滑石各  
壹錢作一貼若喘急加苦葶藶小便不利加木通燈  
草甚者車前子瀘川散其濕毒自消防已治腰已下  
濕熱腫如內傷胃弱者不可用也

天仙藤散

天仙藤

洗畧炒

香附子

炒

陳皮

甘草

烏藥

不必天台者但得  
軟白辛而香者良

右等分淨秤爲細末每服叁錢水壹大盞薑叁片  
木瓜叁片紫蘇叁葉同煎至柒分放溫澄清空心

食前服日三服小便利氣脉通體輕腫漸消更不

須多服

元豐末王荆公居金陵舉家病以詩贈景初曰舉族貧兼病煩君藥石功到家何所

寄一一問征鴻因此見方得於李伯時家傳方錄于臨川張右丞宅

產實療妊娠身腫有水氣心腹脹滿小便少

茯苓

肆兩

杏仁

檳榔

各叁兩

旋覆花

郁李仁

各壹兩

右爲粗末以水陸升煮取二升去滓分溫三服小

便通卽瘥

崔氏療妊娠體腫有水氣心腹急滿

茯苓

白朮

各肆兩

旋覆花

貳兩



杏仁

黃芩 各叁兩

右細切以水柒升煮取貳升半分溫三服忌桃李

雀肉酢物

療妊娠遍身洪腫葶藶子散

葶藶子 壹兩

白朮 伍兩

茯苓

桑白皮

郁李仁 各貳兩

右爲粗末水陸升煮取貳升分三服小便利卽瘥

又方

澤瀉

葶藶 各貳兩

茯苓

枳殼

白朮 各陸兩

右細切以水陸升煮取貳升分溫兩服小便利卽瘥

澤瀉散 治妊娠氣壅身體腹脇浮腫喘急大便不通小便赤澀宜服

澤瀉

木通

桑白皮

赤茯苓

枳殼

檳榔

各壹錢半

右作一服水貳鍾生薑五片煎至壹鍾食前服

防已湯 治妊娠脾虛通身浮腫心腹脹滿喘促小

便不利

防已

壹錢半

桑白皮

赤茯苓

紫蘇莖葉

各貳錢

木香 半錢

作一服煎服法同前

千金鯉魚湯

治妊娠腹大胎間有水氣

白朮

伍兩

茯苓

肆兩

當歸

芍藥

各叁兩

右細剉片以鯉魚壹尾修事如食法煮取汁去魚不用每服肆錢入魚汁壹盞半生薑柒片橘皮少許煎至柒分去滓空心服集驗同

腎著湯

治妊娠腰腳腫

茯苓

白朮

各肆兩

乾薑

甘草

各貳兩

杏仁

叁兩

右咬咀每服肆錢水壹盞半煎至柒分食前服

指迷五皮散

治胎水尋常脾虛腫滿亦治

大腹皮

桑白皮

生薑皮

茯苓皮

橘皮

各等分

右咬咀每服半兩水貳盞濃磨木香水壹呷同煎至捌分去滓空心溫服亦治男子脾虛腫滿

治妊娠兩腳浮腫名曰脆脚因脾衰不能制水血化成水所致用生料平胃散薑棗水煎服或爲末紫蘇葉煎湯調下