

欽定四庫全書

子部

玉機微義卷二十八

五至



詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

大定功藥全集

玉機微義卷之五

文脈

經云脈格則逆
經云脈滑則逆
經云脈滑則逆

徐用誠 原輯

劉純 續增

面胃反

二金云一服人汗其人脈滑不能食而吐吐止者為下

之故不能食設言未止者此為胃反故尺為微瀉

敘吐脈證

金匱云病人脈數數為熱當消穀引飲而反吐者以發其汗令陽微膈氣虛脈乃數數為客熱不能消穀胃中虛冷故也脈弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變為胃反寒在於上醫反下之今脈反弦故名曰虛

趺陽脈浮而濇浮則為虛濇則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脈緊而濇其病難

治

論膈噎治病之因

丹溪云胃為水穀之海脾為消化之器清和則健而運
行世人以痰飲嘔吐諸氣多服香熱之藥偏助氣血沸
騰其始也胃液凝聚其久也脾氣耗敗傳化漸遲又以
烏附丹劑服之積久血液俱耗胃脘乾槁其槁在上近
咽之下水飲可行食物難入間或可入入亦不多名之
曰噎其槁在下與胃為近食雖可入難盡入胃良久復

出名之曰膈亦曰反胃大便秘小若羊屎然名雖不同
病出一體或曰千金治噎膈反胃未嘗廢薑桂等藥何
吾子之多言也予曰氣之鬱滯久留清道非借香熱不
足以行然悉有大黃石膏竹茹芒硝澤瀉前胡朴硝茯
苓黃芩蘆根瓜蒌等藥為之佐使其始則同其終則異
也病邪易伏其病自安

論五噎五膈

嚴氏云 三因同 五噎五膈者由喜怒不常七情傷於脾

胃鬱而生痰痰與氣搏升而不降飲食不下蓋氣留於咽噎者則成五噎結於胸膈者為五膈五噎之名憂思勞食氣也五噎之名憂恚寒熱氣也其病令人胸膈痞悶嘔逆噎塞妨碍飲食治法調順陰陽化痰下氣陰陽平勻氣順痰下則病無由而作矣

按膈噎之證皆由氣聚成積自積成痰痰積之久血液俱病以其為病在咽在膈故前人立膈噎二者之名三因方又分五噎五膈病狀徒有其名為治則一

而已故不敘焉又嚴氏為化痰下氣之說夫氣之不
下痰之不化必有為病之因苟不治其本而專以香
燥之藥治其標痰氣何由而自下也

論三陽結為膈病

子和云內經曰三陽結謂之膈三陽者大小腸膀胱也
結謂熱結也小腸熱結則血脈燥大腸熱結則不圓膀胱
熱結則津液涸三陽既結則前後閉滯下既不通必
反上行所以噎食不下縱下而復出也此陽火不下推

而上行也故經曰少陽所至為嘔涌溢食不下此理明
矣後世強分為十膈五噎其派既多其惑滋甚人之溢
食初未遽然也或傷酒食或胃熱欲吐或胃風欲吐醫
者不察本原投下香桂胡椒丁香之屬設如傷酒傷食
正可攻逐豈可言虛便將熱補素熱之人三陽必結食
必上潮醫氏猶云胃寒不納燔針灼艾三陽轉結歲月
彌深遂成噎病世傳五噎寬中散有姜有桂十膈散有
附有烏其可用乎今代劉河間治膈氣噎食承氣三湯

獨超近代用藥之時更詳輕重假如閉久宜先潤養小
著湯丸累累加之關扃自透其或咽噎上阻痰涎微用
酸苦涌出因而治下藥勢易行設或不行蜜鹽下導結
散陽消飲食自下莫將已豆耗却天真

按此論三陽結為膈病力開世俗言胃冷用熱藥之
誤可謂明矣但用藥專指承氣而言則失之太峻蓋
此藥有實熱者可用之其有脾胃衰虛并血液枯竭
之人皆在所禁也

論噎為諸氣所致

鍼經曰怒氣所至食則氣逆而不下勞氣所至為咽噎病為喘促思氣所至為中痞三焦閉塞為咽噎不利

論噎塞由陰中伏陽所致

發明曰噎者六腑之所生陽也氣也塞者五臟之所生陰也血也二者皆由陰中伏陽而作也

謹按噎為七情所發或因三焦傳化失常所致此即主於氣也或血液所虧胃脘乾槁或血積所致即皆

因於血也塞由填塞不通之義故發明有治幽門不通噎塞不便通幽湯例蓋陽無陰不能施化陰之失位而陽伏其中傳化不變而反上行矣然人有所擊撲墜跌內致血瘀忽即吐而食不能納此由氣血俱傷所可見也大抵始由氣致者初當從氣治之由血致者當從血治之豈可類用香熱之劑反耗氣血耶但世俗拘泥不能究乎病情遂成危證也悲夫

治吐分三焦法

病機云治吐有三氣積寒也皆從三焦論之上焦吐者
皆從於氣氣者天之陽也其脈浮而洪其證食已暴吐
渴於飲水大便燥結氣上衝胸發痛其治當降氣和中
中焦吐者皆從於積有陰有陽食與氣相假為積而痛
其脈浮而匿其證或先痛而後吐或先吐而後痛治法
當以小毒藥去其積檳榔木香行其氣下焦吐者皆從
於寒地道也其脈沉而遲其證朝食暮吐暮食朝吐小
便清大便秘而不通治法當以毒藥通其閉塞溫其寒

氣大便漸通復以中焦藥和之不令大便秘結而自愈也

按此分三法治吐以上焦為陽陽主熱下焦為陰陰主寒中焦為寒熱相半之分有陰而有陽此亦大畧之法耳蓋以其在上者則食已而暴吐在下者則食久而始吐久暴之間所以為寒熱之別難專以上下為寒熱之別也王冰曰食不得入是有火也食入反出是無火也與此同意又原病式曰嘔涌溢食不下

火氣炎上胃膈熱甚則傳化失常故也

論治噎之法并治驗

丹溪曰或云胃脘乾槁其治可得用乎予曰古方用人參以補肺御米以解毒竹瀝以清痰乾薑以養血粟米以實胃蜜以潤燥正是此意張雞峯亦曰噎當是神思間病惟內觀自養可以治之此言深中病情治法亦為近理夫噎病生於血乾夫血陰氣也陰主靜內外而靜則臟腑之火不起而金水二氣大勝陰血自生腸胃津

潤傳化合宜何噎之有因觸類而長之曾製一方治一
中年婦人以四物湯加和白陳皮去皮留尖桃仁生甘
草酒紅花濃煎入驢尿飲以防其或生蟲也與數十貼
而安又台州一匠者年僅三十勤於工作而有艾妻且
喜酒面白其脈濇重則大而無力令謝去工作臥於牛
家取新溫牛乳細細呷之每頓盡一杯一晝夜可五七
次盡却食物以漸而至八九次半月大便潤月餘而安
或口乾蓋酒毒未解間飲甘蔗汁少許或又曰古方治

膈噎未有不言寒者何也予曰古人著方必為當時抱病設也其證實因於寒故用之得效非以為定式也但今人為染此病率因痰氣久得醫藥傳變而成其為無寒也明矣

謹按反胃之證其始也或由飲食不節痰飲停滯或因七情過用脾胃內虛而作古方不察病因悉指為寒用香燥大熱之藥治之夫此藥止能逐寒邪行滯氣其於飲食痰積豈能祛逐七情之火反有所熾脾