

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷六十九



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

大正四年

薛氏醫案

和氣

胃氣

明 薛已 訂

不止者肝心內熱也用
不止者脾肺氣虛也用
虛弱也用五味異功散

黯腫不散者瘀血凝滯也用加味逍遙散肌肉作痛出血多而煩熱者血脫發躁也用獨參湯因亡血而煩躁不安者營衛俱傷也用八珍湯加柴胡牡丹皮久痛不止者欲作膿也用托裡散以指按腫而復起者膿已成也宜刺洩之膿出而反痛者氣血內虛也用十全大補湯若骨髁接而復脫者肝腎虛弱也用地黃丸如鯁餘症當參各門治之

一小兒傷臂出血作痛面色青赤此因驚而致肝經火

動脾經血傷也用加味逍遙散二劑血止又用異功散加柴胡升麻而愈後因父母責之腹痛作瀉面色純青此因忿怒所致乃肝木乘脾也又用六君加柴胡升麻而痊

一小兒登樓失足墮梯致傷其脇肋外畧青腫內不重傷旬餘其父母始覺恐為瘀血積內誤用桃仁紅花大黃諸藥而下之去血升餘又於腫處敷貼膏藥以致膏藥貼破皮膚遂成深眼月餘不愈余以為去血太多大

傷元氣用八珍湯四劑而患處漸愈朝用補中益氣湯
夕用五味異功散服及月餘而始全痊

一女子亦如前症之誤患處日流膿水惟市膏敷貼兩
月餘不瘥余先用獨參湯二劑又用補中益氣湯併服
異功散而更又以托裡散及間服八珍湯而垂愈後因
飲食失宜發熱患處大潰出膿口噤振顫或瘕癧流涎
余謂胃氣虛肝火內動先用獨參湯四劑仍如前朝服
補中益氣湯夕服五味異功散加柴胡升麻元氣漸復

佐以托裡散而瘡斂

一小兒傷指敷涼藥腫至手背膿出清稀飲食少思此血氣虛弱故也朝用異功散夕用托裡散膿水漸稠患處紅活又用八珍湯而愈

一小兒傷膝青腫不消面色痿黃仍欲行氣破血余謂此因脾氣復傷血滯而不行也不信乃服破血之劑飲食不進寒熱如瘧余朝用補中益氣湯夕用八珍湯及葱熨法而愈

一小兒臂傷潰而寒熱用八珍湯漸愈後因飲食所傷吐瀉不止搖頭咬牙此脾氣虛而肝邪內侮也用六君升麻柴胡而安又用十全大補湯而愈

一小兒跌傷腹痛作渴偶食生冷腹痛益甚大便不通血將逆上用當歸承氣湯加桃仁瘀血下而瘥此元氣不足瘀血得寒而凝聚也

一小兒墜樓腹停瘀血用大黃等藥其血不下反加胸膈脹痛喘急氣短余用肉桂木香末各二錢熱酒調服

下黑血及前服之藥而痊

一小兒跌撲傷腿青腫作痛余謂宜速砭去滯血急補元氣不信遂外敷大黃等藥內服流氣飲後湧出穢膿數碗其膿不止復求余治見其腿瘦而脉大作渴發熱辭不治後果歿

一小兒跌撲損傷患處出血不止惟用敷貼不服飲劑飲食少進身體消瘦發熱煩躁余用五味異功散加柴胡升麻當歸而安後手足微搐眉唇微動此血虛而肝

火內動也用四君芎歸釣藤釣柴胡漸愈却用托裡散
八珍湯而全愈血脫發躁若用四物之類復傷脾氣多
致不救設誤白虎湯其危尤速

一小兒跌傷臂骨出骨翌日接入腫痛發熱不食用葱
熨法其痛即止又用六君黃芪柴胡桔梗續斷骨碎補
而食進腫消又用補中益氣湯加麥門五味數劑熱退
而愈

一小兒十五歲傷腿內潰針出穢膿虛症悉具用大補

之劑漸愈後因勞動手撒眼閉汗出如雨急炒熱艾頻
熨臍腹及氣海穴更用人參四兩炮附子五錢作一劑
水煎徐徐灌服良久臂能少動再劑眼開而能言惟氣
不接續乃用參芪歸朮四味共八兩附子三錢水煎連
進二服氣少復乃減附子又三劑元氣漸復後用獨參
湯多服而痊

一女子閃右臂寅卯時發熱作痛余決其膽經血虛而
火盛先以四物合小柴胡湯四劑而熱退更以四物湯

加香附陳皮白朮茯苓各一錢山梔五分苓連甘草各三分二十餘劑腫消而愈

一小兒閃臂腫痛發熱惡寒飲食少思余謂脾胃氣虛而壅腫也朝用補中益氣湯夕用五味異功散間服八珍湯三月形氣漸充而愈

一小兒因跌傷脛漫腫作痛肉色如故服破血流氣之藥反增腹痛以手按之則痛少止余謂此因脾胃虛弱誤服破血流氣之劑而然非瘀血也未幾患處腫消色

黯飲食不入腹痛尤甚手足厥冷余用人參一兩附子
一錢數劑脾胃漸復飲食漸進患處腫痛肉色變赤蓋
始因元氣不足不能運及故腫消而色黯服藥之後元
氣漸克故脛腫而色赤也次用大補湯托裡散三月餘
而愈

一小兒閃臂腫痛面目天白恪服流氣飲之類益加腫
痛余曰此形病俱虛之症也前藥所當深戒者彼謂腫
痛為氣滯血凝非流氣飲不能疏導經絡非破血藥不

能消散壅逆余言聾牙而前症益甚發熱煩燥始請余
治余曰元氣虛憊七惡蜂生雖盧扁亦不能起矣遂歿
一小兒傷臂腫痛內服外敷皆寒涼止痛之藥半載後
潰而腫痛余謂此非托裡溫中不能生也不悟確守前
藥以致血氣滯盡而亡

一小兒跌腿青腫所服皆行氣破血之藥後骨髁內潰
青腫益深朝寒暮熱余戒之曰此氣血俱虛甚矣非調
補脾胃不可不信果歿

一小兒閃腰作痛服流氣等藥外腫不赤余曰此兒雖經閃肭然亦稟賦腎氣不足而使之者延久益虛恐為不治彼以迂緩視之後果不起

消腫定痛散治跌撲腫痛

無名異

炒

木耳

炒

大黃

炒各五分

右為末蜜水調塗腫處內有瘀血者砭去敷之患處潰者用當歸膏敷之尤效

經驗方治跌撲瘀血不散腫痛不止或筋骨傷損疼痛

黃栢

一兩半
夏錢五

右各另為末用薑汁調塗患處以紙貼之如乾再用

薑汁潤之日易新藥

神效太乙膏治一切瘡疽潰爛

玄參 白芷 當歸 肉桂 赤芍藥 大黃

生地黃

各一兩

右咬咀用麻油四十兩入銅鍋內煎至藥黑濾去渣
徐入淨黃丹一觔再煎滴水中心捻軟硬得中即成膏

矣

迴陽玉龍膏又名抑陰散治跌撲損傷因敷涼藥或人

元氣虛寒腫堅不散潰腐不斂及癰腫肉色不變或

腫而不潰潰而不斂筋攣骨痛一切冷症

方見敷寒涼之藥

乳香定痛散治杖瘡金瘡一切瘡瘍潰爛疼痛

方見作痛不止

猪蹄湯治一切癰疽杖瘡潰爛消腫毒去惡肉潤瘡口

白芷 黃芩 當歸 羌活 赤芍藥 露蜂房

孔多生甘草 各五錢

者佳