

欽定四庫全書

子部

三因極一病証方論卷十三



南京中医药大学图书馆版权所有

因極一方
 痰飲
 痰飲
 痰飲

則七
 胃
 胃
 胃

宋 陳言 撰

胃因飲食不節，停滯不化，則胃氣不和，津液不泄，蓄而為飲，為內所

血敗濁凝結而成也
 上涎涎結為飲為內所
 汗不泄蓄而為飲為外

不行聚為痰飲屬不內外因三因所成証狀非一或為喘為咳為嘔為泄眩暈嘈雜忪悞憤懣寒熱疼痛腫滿
癰癰癰閉痞隔如風如癰未有不由痰飲之所致也

痰飲証論

古方惟分四飲六証不說三因不知其因病源無自觀
夫治飲之法既用大小青龍桂枝防已五苓承氣得非
外因參苓苓朮八味參蘇得非內因十棗葶藶大小牛
夏控涎破飲不內外因理固明矣以此類推頗得倫要

今叙列諸証以為治門須原本因施用藥湯學者自宜
詳審所謂四飲者即懸飲溢飲支飲痰飲也懸飲者飲
水流在脇下咳唾引痛溢飲者水留於四肢當汗出而
不出汗身體疼痛支飲者咳逆倚息短氣不得卧其形
如腫痰飲者其人素盛今瘦水走腸間漑漑有聲又有
留飲者背寒冷如手大或短氣而渴四肢歷節疼脇下
痛引缺盆咳嗽則轉甚又有伏飲者膈滿喘咳嘔吐發
則寒熱腰背痛目淚出其人振振惡寒身潤惕故曰四

飲生六証或云五飲者即留飲伏飲合為一証是也其
脉皆弦微沉滑治之之法懸飲當治之溢飲當發其汗
支飲則隨証汗下痰飲則用溫藥從小便去之其間或
隨氣上厥伏留陽分使人嘔吐眩暈背寒或一臂不隨
有類風狀不可不知

痰飲治法

十棗湯 治懸飲咳唾引脇下痛又治支飲咳煩胸中
痛至百日其脉弦者

芫花炒甘遂炒大戟炒等分

右為末棗十個煎八分去棗調藥壯人一錢平旦溫服不下者次日更加半錢下後糜粥自養若已下不可再服

大青龍湯 治溢飲身體疼重汗不出拘急痛

麻黃七錢五分桂枝各二錢半炙甘草各二錢半石膏四十粒杏仁去皮尖
炒

右為剉散每服四錢薑五片棗二枚煎七分溫服汗

者勿再服復服汗多亡陽虛逆惡風煩躁不得眠也

小青龍湯 治溢飲支飲倚息不得卧及喘滿者

麻黃 桂枝 炙草 芍藥 細辛 炮薑

各三錢

五味子

二半夏三錢

右為剉散每服四錢煎七分渴者去半夏加花粉三

錢微利去麻黃加炒芫花噎者去麻黃加附子小便

不利者去麻黃加茯苓五錢喘者去麻黃加杏仁三

錢咳而上氣肺脹其脉浮心下有水氣者胸中痛引

缺盆加石膏二錢

防已桂枝湯 治膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色

黧黑其脉沉緊得之數十日醫吐下之不愈

防已 三兩 桂枝 二人兩 參 四兩 石膏 六兩

右為剉散每服四錢煎七分溫服虛者即愈實者復發
再服不愈宜去石膏加茯苓四兩芒硝一兩微利愈

小承氣湯 治支飲胸滿

厚朴 四兩汁炒 大黃 二兩 枳實 一兩 每服四錢

茯苓五味子湯 治支飲手足冷多唾口燥氣從小腹

上衝胸咽手足痺面熱翕然如醉狀因復下流陰股

小便難時復眩冒嘔腫

茯苓

四兩

桂心

炙草

各三兩

五味子

二兩半

右㕮咀每服四錢煎七分服之衝氣即低反更咳滿

者去桂加乾薑細辛各三兩咳滿止而後渴衝氣更

發者以細辛乾薑為熱藥此法不當逐渴反止者為

支飲也支飲法當冒冒者必嘔嘔者復納半夏二兩

半以去其飲飲去則止其人形腫與痺加杏仁二兩
半若面赤如醉以胃中熱上薰加大黃三兩須詳証
加減

大半夏湯 治膈間有飲卒嘔吐心下痞眩悸

半夏錢五茯苓錢三薑七斤煎服

小半夏湯 治支飲嘔吐不渴

半夏 薑十片煎七分服

葶藶大棗瀉肺湯 治支飲不得倚息

葶藶

炒令黃研細丸如桐子大

以水三盞煮棗十枚至一盞

去棗入藥煎至七分食後服金匱令先投小青龍湯

三服乃進此藥

五苓散 治瘦人臍下有悸者挾涎沫而癩眩者飲也

茯苓 澤瀉 桂心 白朮 猪苓 肉桂

各等分煎服

茯苓湯 治心氣不行鬱而生涎胸脇支滿目眩以胸中有痰飲故也

茯苓 澤瀉 桂心 白朮 各二兩 炙草 二兩

每服四錢利小便則愈

參苓飲 治胸中停痰宿水自吐出痰後心胸間虛氣

滿不能食

人參 茯苓 白朮 各三兩 枳實 二兩 陳皮 一兩 薑

三片煎服

八味丸 治失志腎虛鬱而生涎短氣喘咳當從小便

去之中有茯苓故也 方見消渴門

參蘇飲 治痰飲停胸中中脘嘔吐痰涎眩暈嘈雜忪悸噦逆及痰氣中人停留關節手足躄曳口眼喎斜半身不遂食已即吐頭痛發熱狀如傷寒

人參 紫蘇 前胡 茯苓 桔梗 半夏 枳

殼 陳皮 木香 甘草 嘔者加乾葛腹痛加

白芍 右剉散每服四錢加薑七片棗一枚煎七分服

破飲丸 治五飲停蓄胸腹結為癥瘕支滿胸脇傍攻

兩脇搶心疼痛飲食不下翻胃吐逆九種心疼積年
宿食不消久瘧久痢遁尸疰忤癰癩厥暈心氣不足
憂愁思慮婦人諸疾但是腹中諸病悉能治療久服
不傷臟氣

萆撥 丁香 胡椒 砂仁 烏梅 青皮 巴

豆 皮去木香

竭稍分各等

右以青皮同巴豆漿水浸一宿次日漉出同炒青皮
焦去巴豆將所浸水淹烏梅肉炊一熟飲細研為膏

丸如菉豆大每服五六丸臨卧薑湯下津唾下尤佳
控涎丹 凡人忽患胸背手脚頸項腰胯隱痛不可忍
連筋骨牽引鉤痛坐卧不寧時時走易不定俗醫不
曉謂之走注便用風藥及針灸皆無益又疑是風毒
結聚欲為癰疽亂以藥貼亦非也此乃是痰涎伏在
心膈上下變為此疾或令頭痛不可舉或神意昏倦
多睡或飲食無味痰唾稠粘夜間喉中如鋸聲多流
唾涎手脚重腿冷痺氣不通誤認為癰瘕亦非也凡

有此疾但服此藥數劑其疾如失

甘遂

去心

炮薑

紫大戟

去皮

白芥子

真者各等分

右為末糊丸桐子大晒乾食後臨卧淡薑湯下三五丸如疾猛氣實加數丸不妨

強中丸 治胃脘虛寒冷痰留滯痞塞不通氣不升降口苦無味不思飲食

良薑

炮薑

陳皮

青皮

各一兩

半夏

二兩

為末生薑自然汁煮糊為丸桐子大每服二十九至

三十丸生薑湯下凡中滿氣痞服之甚效

凡例

前証用藥多出漢方但古料劑與今不同已詳酌改從
今為用其如校定備是前說惟外所因証候難明風燥
寒凝暑爍濕滯皆能閉諸絡鬱而生涎不待飲水流入
四肢而致支溢痛疼也當以理推無謬軌轍

喘脉証治

夫五臟皆有上氣喘咳但肺為五臟華蓋百脉取氣於