

欽定四庫全書

子部

玉機微義卷

六五



詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

大定回春全書

玉機微義卷五

泄下

經曰腸澼便血身熱則死
生者則死腸澼之屬身不

徐用誠 原輯

劉 純 續增

則生腸澼下白沫脉沉

脉不懸絕滑大者生懸

滑者死以脈期之又曰陰陽虛腸澼死又曰泄而脫血

大定回春全書

玉機微義

一

金匱要略卷五
脉實皆曰難治

按此云生死亦是大槩言之必須更兼證以詳審之
下同

脉經云腸澼下膿血脉沉小流連者生數疾且大有熱
者死又腸澼筋攣其脉小細安靜者生浮大緊者死

嚴氏云凡下利之脉微小者生浮洪者難治腸澼下膿
血者脉宜滑大若弦急者死

仲景治痢大法

下痢脉沉弦者下重脉大者為未止脉微弱數者為欲
自止雖發熱不死下痢手足厥冷無脉者灸之不溫若
脉不還反微喘者死 下痢有微熱而渴脉弱者令自
愈下痢脉數有微熱汗出令自愈設脉緊為未解 下
痢脉數而渴者令自愈設不差必清膿血以有熱故也
下痢反弦發熱身汗者自愈 下痢氣蔽者當利其
小便 下痢腹脹滿身體疼痛先溫其裏乃攻其表溫
裏宜四逆攻表宜桂枝湯 下痢脉滑而數者有宿食

也當下之 下痢脉遲而滑者實也痢為未止急下之
下痢脉反滑當有所去下之安 下痢不欲食有宿食
者當下之 下痢腹滿痛為寒實當下之 下痢腹堅
者當下之 下痢譫語有燥屎當下之 下痢三部脉
皆平按之心下堅急下之 下痢已差至其時復發者
此為下未盡更下之安 下痢脉大浮弦下之當自愈
風寒下痢者不可下下後心下堅痛脉遲此為寒宜
溫之 下痢脉浮大此為虛強下之故也設脉浮革者

因而腸鳴當溫之 下痢脉遲緊痛未欲止當溫之
下痢心痛急當救裏可與理中四逆附子輩 下痢大
孔痛宜溫之

按丹溪曰仲景治痢可下者十法可溫者五法或解
表或利小便或待其自已區別易治難治不治之證
至為詳密但與泄痢衮同立論而未分今載於滯下
門內故於瀉痢條內不載宜於此通考焉

東垣治痢法

病機機要云後重則宜下腹痛則宜和身重則除濕脉
弦則去風膿血稠粘以重劑竭之身冷自汗以毒藥溫
之風邪內縮宜汗之驚澹為利當溫之又云在外者發
之在裏者下之在上者湧之在下者竭之身表熱者內
疎之小便濇分利之又曰盛者和之去者送之至者止
之兵法曰避其銳氣擊其惰歸此之謂也

秘藏云假令傷寒飲食臌脹滿而傳飧泄者宜溫熱之
劑以消導之傷濕熱之物而成膿血者宜苦寒之劑以

內疎之風邪下陷者升舉之濕氣內勝者分利之裏急者下之後重者調之腹痛者和之洞泄腸鳴無力不及拈衣其脉弦細而弱者溫之收之膿血稠粘至圓而不能使其脉洪大而有力者寒之下之

按此分風寒濕熱表裏溫補寒下等治至為切當學者尤宜熟玩但其裏急後重腹痛之義未詳今別論於左

太陰受濕傳腎為膿血痢

機要云有太陰經受濕而為水泄虛滑身重微滿不和穀味久則防變而為膿血脾經傳腎謂之賊邪故難愈者若先利而後滑謂之微邪故易痊此皆脾土受濕之所為也

再有風寒二證在泄痢條下

論風寒暑濕皆能作痢

陳無擇云滯下之證內經所載血溢血泄血便注下古方則有清膿血近世呼為痢疾其實一也多由脾胃不

和飲食過度停積於腸胃不能尅化又為風寒暑濕之氣干之故為此疾傷熱則赤傷冷則白傷風則純下清血傷濕則下如豆汁冷熱交併赤白兼下治法當先用通利之藥疎滌臟腑

嚴氏云以巴豆等劑推其積熱後辨以冷熱風濕之證用藥調治熱赤者清之冷白者溫之傷風而下清血者則祛逐之傷濕而下豆汁者分利之冷熱相併溫涼以調之仍須先調胃氣切不可驟用罌粟訶子之藥止之

澁之使停滯不泄多致危殆

按赤白分冷熱之說河間論之甚詳其云風下清血
濕下豆羹汁者蓋謂風喜傷肝肝主血故下清血者
為風也濕喜傷脾胃為五穀之海無物不受常兼
四臟蓋豆汁之色如五色之相雜故下豆羹汁者為
濕也又云治法當先通利此迎而奪之之義若有虛
者亦宜審之使果有積滯在腸胃者方所當通利然
嚴氏謂巴豆等藥使用之於傷冷物則可若用之於

熱者為害非輕又云風則祛逐所謂祛逐者果何法
何藥與若以邪氣當祛逐則豈獨於風而寒濕熱為
不可耶此又失於明白

論滯下分三因

陳無擇云古方風停膚腠下瘀血或下鮮血濕毒下如
豆羹汁皆外所因之明文也古方有五洩因臟氣鬱結
隨其所發使利膿血作青黃赤白黑色一一不同即內
所因也又飲食冷熱酒醴醢醢縱情恣慾房室致傷精

血腸胃粘溢久積冷熱遂成毒痢皆不內外因治之先
推其歲運以平其外察其鬱結以調其內審其所傷以
治不內外條然明白不致妄投也

按此所分三因治法其理甚當但外因六淫所傷者
古方用藥則多有之內因臟氣鬱結與夫飲食房勞
而得者諸方則未之見也凡三因所傷皆能干犯腸
胃而為痢今陳無擇立論有三因之分而用藥無三
因之別此又所當分而治者失於開示焉

時疫作痢

大全良方云有一方一家之內上下傳染長幼相似是疫毒痢也治法雖當察運氣之相勝亦不可押泥當先察其虛實冷熱首用敗毒散加人參甘草陳皮隨證用之

按時疫作痢歲常有之其謂當察其運氣之相勝與病冷熱虛實之不同誠為確論蓋欲學者知五運六氣有太過不及勝負之不同以分風寒暑濕燥火為

病而平治之也然首專用敗毒散之義何其自狎泥也

論食毒作痢

陳無擇云飲服冷熱酒醴醢醢腸胃粘溢久積冷熱遂成毒痢

嚴用和云或有飲服冷酒寒物房室勞傷精血而成久毒痢則宜化毒以保衛之

按人之飲食過傷恣食辛熱寒冷之物皆能致傷腸

胃腸胃一傷不能運化傳送遂蓄積停滯而為痢經
日飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入五臟
臍滿閉塞下為飧泄久為腸澼是也治法當先消化
食毒或可攻伐然後隨寒熱溫涼以調之此二論本
諸內經而世所未言者也

論裏急後重

病機云裏急後重脉大而洪實為裏熱甚而閉是有物
結墜也若脉浮大甚不宜下雖裏急後重而脉沉細弱