

內科新說

內科新說卷下

英國醫士合信氏著

江甯管茂材同撰

東西本草錄要

人身血脈運行、時有消耗、全賴飲食補其缺乏、試觀健飯之人、精神充足、力壯體肥、全身功用各司其職、百病不生、前卷所論、致病之故多端、而食物不合、或食不滿量、亦爲諸病之一、夫人身一處有病、他處易累、甚則徧體爲之不適、譬諸鐘表、一齒一軸失度、因而處處不靈也、然病證紛繁、皆有的當之藥、可以療治、良醫審察病原、對證發藥、自然奏效、但此理精微奧妙、非聰明敏哲之人、不能習學、中土本草所載藥性、淡薄者多、偶然誤投、其害猶緩、番藥則各有功力、用之得當、取效甚速、苟或誤施、關係非輕、西醫略論已將方劑分門開列、茲更選錄東西藥性合用者、詳述於後。

西國

藥名欲用唐字翻譯
甚難故採用不多

藥有專治某病確有速效者如鐵酒治虛弱黃證、礪哪信石酒治寒熱、此屢試不爽者也。但此類甚少，須知草本金石各有專長，或補或瀉，或入肝瀉膽汁，或歛汗或減血，平日講明功用，臨證投之，自然應驗。但病有不能速愈，須緩以圖之者，藥雖對證，未必即瘳，不必因功效稍遲，遂疑而妄易他劑也。

化工妙用，令人以病醫病，試觀寒熱得汗則愈，良醫因製爲發表之劑，以助其汗，肺病喘促，痰出則安，良醫因製爲嘔吐安肺之劑，以出其痰，胃病不消化，食物少，愈後時欲食，以補缺乏，良醫因製補劑以彌其虛，有時他處生病，而此處病勢遂輕，皮肉生病，而臟腑病勢遂減，所以有釣膿外治等法，有時望生新病，以療舊病，如灸證用減血瀉法，卽是此理，醫者於此參悟，自能治療合宜矣。

某藥治某病，其初原由歷試而知，或醫者自服，或用以治病有效，屢試不

爽因而筆之於書如中國本草是也又如山泉之下有硫磺鐵元明粉人飲其水卽能治病此理之確者若專以色香氣味分配臟腑則影響無據矣。

藥所以治病昔人取金石草木之屬考驗其性情功力或發汗或吐或瀉或減血或補血或補精神或去風氣或搓擦皮熱引病外出有此功力方謂之藥至於鳥獸蟲魚間有用以入藥者如鹿茸麝香猪油魚膠之類大抵專取其一物如鹿取其角麝取其蒂猪取其脂魚取其膠是也若夫猪牛羊肉及雞鴨魚鮮與夫穀果蔬菜日食所需養育身體不得不用非可治病卽不應概名爲藥若夫狗馬之肉食之傷人龍骨虎骨犀牛角羚羊角象牙象皮鱉鱓蠶退龜板鱉甲金銀箔雲母石磁石琥珀珍珠白石石英紫石英滑石各物中土所習用其實毫無功力又有污穢之物如人中黃金汁人中白童便秋石紫河車紅鉛兔屎夜明砂龜尿鵝糞怪毒之物如

蛇蠍蜈蚣五靈脂蜥蜴之類卽無大害亦斷無益皆不應收入本草醫者切勿妄用。

藥有略其功力而華人信用過當者如燕窩海參阿膠鹿膠之屬功力止於能潤不過與豬蹄魚膠雞蛋白等物相似因其價貴奉爲至寶殊可不必。

唐人有因身虛弱或年老買食人乳者不知人乳止合小兒吮食大人應食牛乳驢乳有益食人乳毫無功力徒令乳母母子俱損戒之戒之。

凡用草木入藥或取其汁或取其葉或取其皮或取其花或取其根或取其果或取其子均須曝乾秤準雨露中不宜採藥用葉應待花已開果未熟之前收採用花應乘新開收採用果用子應俟已熟收採有殼者連殼收採臨用時剝去不論花葉皮幹根果並以本年新者爲佳陳久則失功力收採後曝乾或烘乾貯大玻璃甌或甕中緊塞其口勿著溼勿泄氣勿

透光用時或作散須篩取細末或作酒須用濃味能消化樟腦之酒將藥浸入時常搖動或作水須用雨水更蒸水妙不可用井水若有須泡煮者沸後不過一刻卽須取起不宜久沸至一切香物如八角油薄荷油之類不可煎煮恐泄香氣。

方劑中凡稱散者合幾味而成者也稱末者一味獨研者也。

凡藥須眞材方有功力僞者陳壞者概不可用每有人聲色賭博揮霍浪費及身病購藥任意不擇希圖價賤愚之甚矣。

藥有合二質而成一物或合數質而成一物者如養氣一與輕氣二合則爲水磺強水與礪咁合則爲元明粉與鐵合則爲青礪與銅合則爲膽礪與啞礪礪哪合則爲白礪鉛與炭氣合則爲鉛粉與養氣合則爲蜜佗僧水銀與硫磺合則爲珠砂硫磺三與信石一合則爲雄黃或人工配合鍊製而成或有產於山者蓋造化主配合鍊製者也若以兩物共置一器其

性合者則相愛而相連，性不合者則格拒而不入。凡酸味喜與金類相連，

如青礬膽礬是也。尤喜與啹唎相連。啹唎者與酸相對之味也。噉吓、咻吓

吵。中土噉吓沙、啊摩呢啊中皆有此味。與苦相對曰甘，與鹹相對曰淡。此

無名今用西國名曰噉唎。有時酸味已與金類相連，及遇啹唎，復離去金類而與啹唎

相連。若中有炭氣，酸水一入，炭氣偏出，勢如沸騰。

酸味與啹唎相對，以色試之可見。法用藍色紙，須藍草所染者不驗。浸入啹

唎水中，其藍不變。若浸入酸水中，即時變紅。試更浸入啹唎水中，仍返轉

藍色。又用黃色紙，須萎黃草所染者不驗。浸入酸水中，其黃不變。若浸入啹唎

水中，即時變為深紅。試更浸入酸水中，仍返轉黃色。凡溺病欲知溺味變

酸否，法試以草藍紙浸入溺器中，若變紅色，即知溺味酸也。欲知溺中有

啹唎味否，試以草黃色紙浸入溺器中，若變深紅色，即知溺中有啹唎味

也。蓋常人溺中酸與啹唎配合適中，是為無病之溺。若偏多偏少，即恐生

沙淋也。

補劑

藥有以補爲用者。補精神、補腦、補腦髓筋。氣筋爲一類。中國稱補火是也。

有飲者。如茶酒之屬。蓋腦胃相關。故飲入於胃。功力能感腦補精神也。有

齏者。如麝香、冰片、濃醋、阿摩尼阿之屬。意令由鼻達於腦也。或外治。有以

熱物。如芥末等物貼胃位者。於搓擦外皮令熱者。有下身或兩腳浸入熱水中。

者。有以藥水貯水節射入肛門者。諸法意皆主於保護腦氣筋。使暖性由

腦氣筋而傳及腦。腦安卽心安。而精神亦振也。有人傾跌昏暈。急用冷水

灑面而甦。有小兒初生不呼吸。亦用水灑。或拍胃臂等處。而呼吸大通者。

意令腦氣筋遞傳至腦髓。由腦髓而傳至膈內。呼吸功用。卽時靈動。大氣

一通而復也。凡補精神之藥。卽能補脈。脈絕能復。脈微能有力。蓋補精神

卽是補火。故須診定確係虛證。方可少用試之。如果藥與病合。漸次加多。

若炎證之類、病屬血多火旺、治應減血滅火、誤用補劑、關係非輕、凡飲茶酒吸煙、藥皆能令精神卽時振作、但能暫而不能久、蓋人之精神、貴得其平、困倦者宜振之、飲茶酒吸煙、藥皆所以振其困倦也、但振之太過、藥力一退、困倦更甚、故吸煙飲酒之人、往往有癮、有癖、如魔鬼之不能驅除、皆精神愈振而愈敗之徵也、善養精神者、調適性情、勿憂怒悲恐、醫者須令信任倚賴、自希望愈、保重調攝、或時聞快意新聞、最爲有益、或借光熱電氣器機以醒困、或用水洗面以安腦氣筋、皆補神良法也、至若開胃補胃爲一類、如黃連人參之屬、胃健則能食、養育身體、令人壯健、又補血爲一類、如鐵酒之屬、與補胃補火藥合用、則爲全補、大概補胃補血全補、須緩圖見功、非如補精神卽時速效也、草木之類、味苦者多補、如雞、哪、黃連是也、金石之類、味酸者多補、如硝、強水、酸醋是也、凡開胃藥多能補胃、胃以健運消化爲補也、久病虛弱人宜

出外游玩，宜居通風之室，或以海水澡身，或以冷水洗面，皆能令人身體壯健，勝於服藥。

病有宜補不宜補，須辨別準確。如頭痛屬於腦氣筋者，痛在一處，此虛證，宜補者也。若身壯熱，滿頭皆痛，是血熱血太多爲患，切不可補。又如發熱後瀉，後身虛弱，懶於行動，操作言語者，宜補。若初起時困倦無精神，病勢方張，切不可補。久欬身虛弱，可補。若肺經炎證，身熱脈數欬嗽，切不可補。餘可類推。今略述補劑一二於後。

補火之劑：樟腦半錢，桂皮酒四錢，八角油或丁香油二三滴，薑

湯二三錢，薄荷水五兩，能補火，補精神，暖胃去風。每服一兩，日二

三次。又法：阿摩尼阿，或鰵或服五釐至十釐，一二次，能保腦補精神。

小兒暖胃之劑：蜜尼沙末二三分，或石粉二三分，丁香油四滴，或八

角油四滴，鴉片酒五滴，糖水四錢，薄荷水一兩五錢，每服一

二錢，每二時服一次。小兒瀉利後，腹內有風氣者，服此能暖胃補胃，去風氣，止腹痛。一法：蜜尼沙或石粉半錢，白糖二三分，桂皮散一分半，鴉片酒二滴至四滴。小兒不可食鴉片，六月上可略服，但須當心，不可誤多。八角油二滴，至四滴，水一兩六錢，攪和，每服一二錢，日服三次，治小兒腹痛嘔吐瀉泄，尿綠色。

補喉之劑：喉病聲低啞，因於喉軟弱無力者，用沒石子酒一錢，水六兩，及胡椒酒四錢，至八錢，漱喉，日二三次，能收斂補喉，傷風喉痛者，用朴硝二錢，蜜四五錢，大麥水六兩，日漱三四次，或用礬砂二錢，沒藥酒二錢，蜜三四錢，水五六兩，日漱三四次。

補胃之劑：黃連水四兩。江浙黃連價貴，不易購，西人參功力略同，亦可用。桂皮酒一二錢。

噤口二三分。如無噤口，用石粉亦可。大黃末一分，作水，每早晚服四分之一兩。

日服畢，治胃不消化有酸水，或用大黃噤口。牡蠣末亦可。黃連末各一錢。

薑末二分、蜜和爲丸、五十粒、每服二三粒、日服二次、功力亦同、

補散 鐵鏞大黃黃連末各一錢、薑末四分、共研細作三十二分、每

服一分、日服三三次、能補血、治黃病腦氣筋痛、一法青礬一錢、

一分、沒藥一錢、啊囉末半錢、蜜和分爲三十九丸、日服二三粒、

補虛微利、婦人黃證、經不調、宜之、或用青礬末三分、大黃末半錢、

黃連膏一錢、蜜和分爲二十九丸、每服一二粒、日服二次、治婦人身

虛流白帶、

收斂之劑

藥有以收斂爲用者、或斂汗管之口、或斂血管受傷之口、皆是有時在內、收斂如瀉泄服收斂藥則便結是也、身虛弱久病者、用之最效、若身熱脈數、有新炎病證據者、不可收斂、誤用則病更劇、淡礬強水收斂而補、最有功力、其次則鉛散、鐵散、膽礬、白礬、鴉片、皆收斂要藥、鴉片合他藥並用、

能助藥力，取效尤多。

白礬兒茶散 白礬末一分，兒茶末一分，共研細，每三時服一次，能止血，治久瀉、流白帶。一法：黃連水一兩，兒茶酒一錢，
訶囉末五七釐，或加入鴉片酒二三十滴，能止內出之血、欬血、吐血、瀉血，皆宜，日服二三次。

水銀訶囉散 水銀散五七釐，訶囉散一分至一分四釐，置舌上，兒茶水送嚥，治痢最效。一法：訶囉末二釐，白礬六七釐，每二時服一次。又法：大黃末四分，桂皮散二分，鴉片末二三釐，共研作六分，每二三時服一分，用石粉一二錢，兒茶酒一錢，或兒茶末一分，或鴉片酒十滴至二十滴，或鴉片膏二釐，每二時服一次，或用訶囉散三分，桂皮散二分，攪勻作四分，每二時服一分，並治久痢瀉泄，能止血。

鉛散 鉛散三四釐、或合鴉片末一二釐、或合吡嘑啫散一分、每日早晚服、能止血止瀉、或用鉛散一分、醋二錢、雨水四兩、腹痛加鴉片酒一錢、或鴉片膏三四釐作四分、每一分一兩、每二時服一分、日服二三次、能止血、凡血自肺胃大小腸膀胱出者、並宜服、一法鉛散二分、鴉片膏二三釐、甘草末二分、蜜和十二丸、每半時服一粒、能止瀉止汗、霍亂證將作之先服之佳。

膽礬鴉片丸 膽礬二三釐、鴉片二三釐、蜜和爲丸四粒、每服一粒、日服二三次、久瀉久痢有膿出者宜之、白礬兒茶水、喉軟弱聲低不出者、用白礬一錢、蜜二三錢、兒茶水六兩漱之。

發表之劑

病有得汗而減者、應用發表之劑、蓋發表藥與收斂藥相對、其功力能令

皮暖、加增皮之精液、服此藥後、無汗者即得汗、汗少者能令多、故發熱、肺經炎證、身熱、傷風、風溼等證、汗出則病減、並須用此藥助令速出、又如瘡證、其初血不流佈、而聚於內、則發冷、面色白而皮皺、及血散出、則發熱、熱則血運愈速、而汗生焉、病者得汗後、即覺快適、此病自醫法也、凡天熱暴冷、人多不適、是因汗流忽止、不更暢出之故、又天冷則小便多、而汗少、天熱則小便少、而汗多、蓋小便與汗、同此津液、有人小便太多、聚膀胱內、不得出、皮乾口渴、服發汗藥、能減少小便、是令津液由汗管分泄也、凡欲發表者、服藥後、食熱粥、或熱茶水、或用熱水吞吃、曄散十四釐、以熱水貯盆內、兩腳浸入、然後擁厚被安臥、即有多汗、夜晚服發表藥、汗出更易、同時勿被冷風吹襲、勿服酸藥、酸則收斂、汗不得出也、勿瀉、勿利小便、瀉利則汗少也、勿飲冷水、冷水能斂汗也、若發表太多、欲止之者、先將兩手放出被外、擁護勿過密、汗即漸止、然後用布巾週身拭乾、另換乾淨衣被、避

風爲宜。汗出後，厚被擁蓋太密，溼氣不得出，次早身必軟弱。凡皮膚病如癬疥之類，宜冷水洗淨，服發表藥。臟脹得汗則病減。凡瀉劑利小便之劑，皆血多欲減少之意，發表亦是此理。

瀉劑

瀉與補相對，減血滅火之意。蓋胃小腸大腸中血管甚多，管中之水有時與血相離而泄出，流於大小腸中，或自瀉，或飲藥而瀉，身必軟弱，與發汗同理。更有瀉膽汁，或瀉腸胃中津液者，所宜詳辨。藥之功力，有大瀉者，有微利者，有瀉小腸者，有瀉大腸者，有自胃至肛門全瀉者，醫應分別病勢輕重，或大瀉，或微利，斟酌用之。發熱、炎證、臟脹、中風病、大便秘結，不得不瀉。若身虛者，止應微利，不宜大瀉。大便時而難，時而瀉者，亦應微利。凡婦人產孕及小兒病證，皆不宜猛瀉。服輕瀉微利之藥可也。

瀉劑 瀉者，以藥推之使出也。凡病有自瀉而愈者，是病自醫也。有自瀉

不止而身虛弱委頓者應服收斂藥止之若遇應瀉之病以藥瀉之大
概三四次無有不止者不必疑畏 渣臘末十五釐至二十釐

無渣臘用大黃

三分 迦路米或水銀散五七釐 桂皮散四五釐 白糖攪和置舌上

溫水吞送不久即瀉水出 或用大黃末二三分 迦路米五七釐

薑末三四釐亦可 一法水銀散五七釐或迦路米四五釐置舌上大

黃水吞送或以水銀散五七釐合大黃末一分蜜糖攪和吞嚥夜晚服

明早服草麻油六錢至八錢或元明粉五錢至八錢即瀉病未除者更

服二三次可也 若欲速者服巴豆油一滴即時大瀉或用巴豆油一

滴丁香油一滴大黃末三四釐共作一粒吞嚥亦效 身熱脈壯有力

舌根有厚白苔腹內有風大便秘結腦炎眼炎並宜用瀉法

微利之劑 微利者大便難以藥輔之而出也法用大黃末二分 桂皮

糖一分 薄荷水一兩服一二次後即瀉 或用大黃末一二分

多至三分