

成方切用



成方切用卷二十目錄

經帶門 正方二十一 附方七

溫經湯

膠艾湯

方見胎產門

柏子仁丸

升陽舉經湯

東垣升陽舉經湯

固經丸

通瘀煎

連附四物湯

四物加芩朮湯

四物加芩連湯

熱六合湯

寒六合湯

氣六合湯

風六合湯

正氣天香散

調經飲

毓麟珠

啟宮丸

抑氣散

五物煎

牡丹皮散

芎歸六君子湯

逍遙飲

如聖散

人參荆芥散

固下丸

白芷散

當歸煎丸

婦寶丹

見理血門

成方切用卷二十

經帶門

婦人諸病本與男子無異而其有異者則唯經帶胎產之屬不得不另詳方論此外雜證但與男子相同者自有各門方治故不以男女分而資贅於此○

凡行經之際大忌寒涼諸藥飲食亦然

溫經湯

金匱

治婦人少腹寒久不受胎兼治崩中去血或月水來過多及

至期不來

金匱曰婦人年五十所病下利數十日不止暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也曰

此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之

其唇口乾燥故知之當以溫經湯主之徐忠可註曰此段言

歷年血寒積結胞門而甚焉者也故就婦人之年暮經水斷

絕者而亦必據證斷之以立法也謂婦人年五十其天癸已

絕應不從經血起見矣然而病證下利數十日不止知非偶

感矣暮即發熱病屬陰矣少腹裏急明乎病屬下焦矣因而

腹滿是雖脾病而根于下焦矣手掌煩熱掌屬心心主血血鬱則煩熱也唇口必得脾家營氣而津潤營氣鬱則陰火從之故乾燥非渴也渴則為胸中熱胸無熱而但陰分有鬱火故不渴而乾燥也然皆非相因的對之證故疑而問仲景乃略其下利發熱腹滿而斷之為帶下且決其曾經半產瘀血在少腹不去謂下利而發熱陰虛者有之因而少腹裏急下多亡陰者有之腹滿脾虛者有之手掌煩熱陰虛者有之若唇口乃營氣所主下利之病不應見此然而有是證又合之少腹裏急手掌煩熱明是血瘀而火鬱所以心得之而掌熱脾得之而唇口燥故曰其證唇口乾燥故知之藥用溫經湯者因半產之虛而積冷氣結血乃瘀而不去故以歸芍芎調血吳茱萸桂枝以溫其血分之氣而行其瘀肺為氣主麥冬阿膠以補其本土以統血參甘以補其虛丹皮以去標熱然下利已久脾氣有傷故以薑半正脾氣名曰溫經湯治其本也唯溫經故凡血分虛寒而不調者皆主之

吳茱萸

三兩

當歸

芍藥

芍藥

人參

桂枝

阿膠

丹

皮

生薑

甘草

二兩

麥冬

去心

半夏

升一

右十二味

以水一

升

斗煮取三升分溫三服

膠艾湯

金匱

治婦人陷經漏下黑不解或損傷衝任月水過多淋瀝不斷
方見胎產門

婦人之經雖從下出實由心胃之氣主之故升降有期今日
漏下是無期也所漏者黑是下有因寒而滯之物故曰陷經
陷者有降無升久則爲黑色故以膠艾湯主之四物通調肝
血加甘膠峻補之病本於寒故以艾溫而行之也

丹溪謂婦人之經淡

爲有水紫爲熱黑爲熱極故兼水化假令其人素從熱病來者容有之然而仲景之言道其常也

栢子仁丸

良方

戊方切月

膠艾湯

栢子仁丸

升陽舉經湯

二

經帶門

治經行復止血少神衰

女子善懷每多憂思憂多則傷心心傷則不能生血而血少血少則肝無

所藏而衝任之脈枯故經閉不行也○經曰月事不來者胞脈閉也胞脈者屬心而絡于胞中今氣上逼肺心氣不得下降故月事不來

栢子仁

去油

牛膝

酒浸

卷栢

五錢

澤蘭

續斷

二兩

熟地黃

一兩

蜜丸

米飲下

栢子仁安神而養心地黃續斷牛膝補肝腎而益衝任卷栢

澤蘭活血脈而通經閉

升陽舉經湯

東垣

治崩漏身熱自汗短氣倦怠懶食

此由勞傷所致

補中益氣湯

見治氣門

加白芍黑山梔薑棗煎

補中湯以益氣升陽退熱收汗加芍藥以斂陰黑梔以清熱

又東垣蘭室秘藏升陽舉經湯黃耆當歸白朮各三錢羌活防

風藁本各二錢獨活附子炮甘草炙各錢半人參熟地川芎各一錢細

辛六分桃仁十箇去皮尖研紅花肉桂芍藥各五分每服三錢漸加五錢

治經水不止原文曰如右尺脈按之空虛是氣血俱脫大寒之證輕手其脈數疾舉指弦緊或濇皆陽脫之

證陰火亦亡見熱證於口鼻眼或渴此皆陰燥陽欲先亡也當溫之舉之升之燥之當大升浮氣血切補命門之下脫也

固經丸良方

治經行不止及崩中漏下紫黑成塊衝任為經脈之海若無損傷則陰陽和平氣血

調適矣若勞動過度損傷臟腑衝任之氣虛不能約制經血故經多暴下或由陰虛陽搏為熱所乘攻傷衝任血得熱則

妄行也脈數疾小為順大者為逆紫黑成塊者熱甚而反兼水化非寒也玉機微義曰血得寒則凝既行而紫黑故知非

也寒

龜板

炙四兩

芍藥

酒炒

黃蘗

酒炒三兩

黃芩

二兩

香附

童便浸炒

樗皮

兩半

酒

丸

經多不止者陰氣不足以制胞絡之火故越其常度也崩中漏下者虛而挾熱也紫黑成塊者火極似水也黃芩清上焦之火黃蘗瀉下焦之火龜板芍藥滋陰而養血皆壯水以制陽光也香附辛以散鬱樗皮瀉以止脫

通瘀煎

治婦人氣滯血積經脈不利痛極拒按及產後瘀血實痛并男婦血逆血結等證

歸尾三五錢 山查 香附 紅花新者炒黃二錢 木香七分 烏藥一二錢 青

皮 澤瀉一錢五分 水煎加酒一二小鍾 兼寒滯者加肉桂

一錢或吳茱萸五分 火盛內熱血燥不行者加炒梔子一

二錢 微熱血虛者加芍藥二錢 血虛滯加牛膝 血

瘀不行者加桃仁二十粒去皮尖 或加蘇木延胡之類 瘀極

而大便結燥者加大黃一二三錢或朴硝蓬朮亦可

連附四物湯 丹溪

治經水過期紫黑成塊紫血熱也黑熱甚也過期而成塊氣滯也或風冷乘之也若淡白者虛也

或挾痰停水以混之也如煙塵豆汁屋漏水混濁糝糊者淫痰也

四物湯理血門 加香附黃連四物以益陰養血加黃連以清血熱香附以行氣鬱

四物加芩朮湯

亦名溫六合丸

治經水過多

黃芩抑陽白朮補脾脾能統血

四物加

芩連湯治經水適斷五心煩熱經來色黑或如豆汁

如豆汁者熱兼

溼也芩連苦燥溼而寒勝熱

四物加梔連為熱六合湯加薑附名寒六合

湯加陳朴名氣六合湯加羌芎為風六合湯皆經產通用之

藥也

調經飲

治經脈阻滯氣逆不調多痛而實者

當歸

三五錢

牛膝

山查

二錢

香附

青皮

茯苓

一錢五分

如因

不忌生冷而寒滯於內加肉桂吳茱萸之類

如脹悶者加

厚朴一錢或砂仁亦可

氣滯者加烏藥一錢或痛在小腹

者加小茴香一錢五分

正氣天香散

紺珠

治一切諸氣氣上湊心胸攻築脇肋刺痛月水不調

婦人多憂

鬱故氣病爲多氣爲血帥氣滯則血亦不能行故月候不調

香附

八錢

烏藥

二錢

陳皮

蘇葉

乾薑

一錢

每五六錢煎

五分

烏藥陳皮專入氣分而理氣香附紫蘇能入血分而行氣引以乾薑使入氣分兼入血分用諸辛溫以解鬱散肝令氣調而血和則經行有常自無痛壅之患矣

毓麟珠

治婦人血氣俱虛經脈不調或斷續或帶濁或腹痛或腰痠

或飲食不甘瘦弱不孕服一二筋即可受胎凡種子諸方無以加此

甘草 川芎一兩熟地蒸菟絲子製當歸四兩杜仲酒炒人參 白

朮土炒茯苓 芍藥酒炒鹿角霜 川椒二兩為末蜜丸彈子大

空心嚼服一二丸用酒或白湯送下或為小丸吞服亦可

如經遲腹痛宜加破故紙酒炒肉桂各一兩甚者再加吳茱萸

五錢或加龍骨一兩醋煨如子宮寒甚或泄或痛加製附子

或炮薑宜隨有鬱怒氣不順而為脹為滯者宜加香附酒炒二

兩或甚者再加沉香五錢 血熱多火經蚤內熱者加川斷

地骨皮各二兩或另以湯劑暫清其火而後服此或以湯引

送下亦可 男子製服宜加枸杞胡桃肉鹿角膠山藥山茱

萸巴戟肉各二兩

啟宮丸

治子宮脂滿不能孕育

婦人肥盛不孕往往因此

芎藭 白朮 半夏麴 香附一兩 茯苓 神麴五錢 橘紅 甘

草

二錢

粥丸

橘半白朮燥溼以除其痰

肥而不孕多由痰盛故以二陳爲君而加氣血藥也

香附神

麴理氣以消其滯川芎散鬱以活其血則壅者通塞者啟矣

茯苓甘草用以去溼和中也

抑氣散

嚴氏

治婦人氣盛於血變生諸證頭運膈滿

凡人血氣和平則無諸疾苟血少氣多壅

於胸膈則滿上攻於頭則運

香附

四兩

陳皮

二兩

甘草

炙

茯神

一兩

每服二錢

經曰高者抑之香附能散鬱氣陳皮能調諸氣茯神能安心

氣甘草能緩逆氣氣得其平則無亢害之患矣

氣盛於血固當抑氣若過

用行氣之藥則真氣耗散陰火愈盛而氣血兩虛矣是方雖和平祇可暫用須用滋血之藥使陰血充足則陽火自平乃正治之法蓋補其不足即所以制其有餘也

五物煎

治婦人血虛凝滯蓄積不行小腹急痛產難經滯等證此即

四物湯加肉桂也