

寒戰咬牙

寒戰、森然若寒、振振然搖動、咬牙、上下片牙相磨而鳴、

○痘瘡寒戰

白朮、芪、歸、苓、

咬牙呵欠乃肝虛

十全大補湯、

○初熱多欠咬牙頓悶乃肝藏風熱

七味羌活湯、

目上竄咬牙乃心藏熱

導赤散加酒炒黃連、惡實、

俱不可妄用辛熱之劑

咬牙面赤作渴至夜為甚

六味地黃丸、

○痘初出寒戰

柴葛桂枝湯、

○痘已出或已成漿寒戰乃表氣虛

養衛化毒湯、

○憎寒因倦或發寒戰能令痘縮伏

十二味異功散、

痘稠密、炊發、腫痛、轉動艱難、身體振搖、勿作寒戰、待膿成、痛止、自解。

○收靨時、痂皮圓淨、或時戰慄、此正氣將復、須臾自定、手足自跳、膚肉自動、乃血為痘耗、非寒戰、十全大補湯

○陽氣虧損、咬牙寒戰、獨參湯、參附湯

○血氣不榮、不能靨、悶亂不寧、臥則哽氣、泄瀉寒戰、咬牙、十二味異功散、倍木香、當歸

○寒戰、咬牙黑陷、紫草膏、如七八日、石羔、丹皮、生地、黃連、連翹、知母之類

○手足冷、渴飲熱湯、泄瀉、乃陽氣虛寒、宜熱補、加減調中湯

○手足不冷、大便不利、渴飲溫湯、乃脾氣虛熱、宜調補。
參芪大造散、加減用。

○手足不熱、大便不利、渴飲熱湯、乃脾胃虛弱、宜溫補。
寒戰咬牙湯。

○痘已壞、寒戰咬牙、加喘促悶亂、不治。

厥逆 痘家惡候

○逆者手足逆而不溫、厥又甚於逆、手足為諸陽之本、宜和煖、若指頭微寒、陽氣衰、足心冷、陰氣勝、

○痘焦黑煩渴頓悶、喘促厥逆、此陽毒內陷、熱氣逆伏、故手足冷、所謂熱深厥亦深、火極似水者、

○痘灰白泄利而厥逆、此元氣虛憊、陰陽不接、故手足冷、

○痘疹頭宜涼、足宜溫、若頭溫足冷、不治、

○熱深而厥、大便不通、及痘黑、紫草膏、甘草膏、

○泄利氣虛而厥、十一味木香散、十二味異功散、十指頭微寒、四君理中、加桂

○發熱時手足冷乃吐瀉傷脾宜和中兼發表黃芪建

中湯加防風羌活或四君子加黃芪桂枝防風以

發之發後宜補脾胃養氣血四君子加黃芪白芍當歸桂心

○痘始出手足冷先曾吐利乃脾胃氣弱理中湯加桂

○痘正盛手足厥冷蓋覆不溫乃六腑氣絕不治

○灌漿時手足厥逆自利不止或吐脈沉細微弱或虛

大乃陽氣欲脫宜溫之理中湯加熟附子或十二

味異功散服藥後手足和煖者生厥者死

○痘後手足厥冷乃氣血虛脾胃困參芪飲加當歸熟

腰痛 腰者腎之府

○痘疹初熱及二三日腰痛最忌乃邪由膀胱入腎宜

解毒發表

先服人參敗毒散次服五苓散加細辛獨活

○痘疹腰痛目睛多白名折腰痘乃腎經虛怯相火內
燥真陰不能勝邪急服六味地黃丸以防黑陷癢
塌

腹痛

痘疹腹痛乃毒鬱三陰

○臍以上屬太陰當臍屬少陰小腹屬厥陰

○腸鳴自利腹痛為虛寒腹滿不大便而痛為實熱

○腹脹乃毒聚腸胃當升發解毒利小便使毒上下分消則痛與脹自止

○乳食停滯不消而腹脹當升發解利兼消食所傷之物當審其寒熱

○痘疹已出未出身熱手足冷腹痛大便不通乃熱毒

在裏水煎蟬蛻末

○痘疹始發、或腹中有宿塊而痛、勿悞作食積下之、

○初熱及二三日腹痛、乃毒內攻、宜發表疎裏、桂枝大黃湯

○發熱三日後、大便不通而腹痛、乃燥屎與毒相併、紫

草膏七物升麻丸選用

○譫妄狂亂而腹痛、紫草膏因飲冷水而腹痛、理中湯

○因多食而腹痛、微則木香大安丸甚則丁香脾積丸

○自利後腹痛為虛、問傷何物原物湯下黃芪建中湯、加木香、青皮、

○發熱自利腹痛、毒也、黃芩湯加木香、青皮、或行氣化毒湯

○腹痛痘乍出乍隱為伏，先用七物升麻丸，大發之痘

不出，勿治。

○痘未出腹疼，或腹中有塊，乃腹中先出，勿用疎利藥，

以戕胃氣，當勻氣發散，升麻湯、參蘇飲之類。

○痘始出腹痛，或身痛，脉洪數，或作渴飲冷，手足熱，為

熱痛，升麻湯、連翹升麻湯、雙解散之類。倍芍藥，甘

○痘已出腹痛，乃毒在裏未出透，紫草膏、甘草膏。

○起發不透腹痛，乃陷伏，紫草膏。

○痘已出腹痛，不熱躁，不飲冷，大便不實，乃元氣虛弱，

人參白朮散、參苓白朮散之類補之、

痘出不快而腹痛、白芍為末、姜湯下、

便血日夜無度、腹痛啼哭、乃陽毒入胃、牛黃散、

痘毒未出時、或受風寒、氣粗熱甚、身戰動、腹急疼、此

欲成內潰、宜散寒邪、開腠理、使毒出、升麻湯、若不

早治、胃必潰爛成膿、口舌皆白、

身不甚熱、或時發寒、或嘔吐、六脉虛細、手足逆冷、或

作渴飲湯而腹痛、為寒、十一味木香散、

腹痛面青、手足冷、乃脾胃虛寒、益黃散、或理中湯、加

○痘作膿時、腹痛不大便、乃燥屎、當歸丸、燭導之便清、

乃受冷、理中湯、加桂、或黃芪建中湯、加木香、

○痘出盡、發透、膿成、表無邪、能食、小便清、大便潤、裏無

邪、忽腹脹作痛、煩躁喘促、痘色變如灰木、此必傷

食、先服丁香、香脾積丸、原物湯下、後服人參白朮散、

去葛根、加青皮、陳皮、橘紅、與養脾丸、間服、

○收靨時、傷食腹痛、勿用巴豆、大黃、宜平胃助氣、平胃

散、木香、大安丸、或三味橘皮湯、俱原物湯下、

○愛腐吞酸、大便穢臭、乃乳食停滯、保和丸消之、

○靨後傷食、發搐、嘔吐腹痛、治法見驚搐條、

○ 醫後熱多，大便實，糞黑，腹痛，乃畜血。四味犀角地黃湯

○ 痘後傷食，腹痛便秘，乃胃虛不能消穀。丁香脾積丸

○ 便利。木香大安丸

○ 痘後腹痛，大便未通，乃燥屎。四順飲子

○ 燥屎痛，病在下焦，傷食痛，病在上焦，俱手不可按。

○ 食少便潤，腹痛，乃虛寒，病在中焦，必喜用手按摩。黃

芪建中湯

○ 發熱時，心腹絞痛，煩悶，叫呼，或痘陷伏，脹滿疼痛，喘促，乃毒攻腸胃，燔灼臟腑，不治。

腹脹

○凡痘腹中宜寬舒，為裏無邪。

○傷食腹微滿不痛，木香大腹滿腹痛甚，丁香脾積丸。

○腹脹小便不通，五苓散去白朮，宣風散。

右四證皆實脹，故利之。

○自利腹脹為虛脹，十一味木香散。

○腹脹渴瀉，乃脾胃虛寒，十二味異功散，參芪內托散。

○腹脹氣促體倦，乃脾氣虛，人參白朮散，加木香。

○腹脹作喘，大便利，小便秘，手足冷，乃脾氣虛，先用葶。

麝木香散次用五味異功散

○初熱腹脹痛有表證，乃毒氣與外邪相搏，欲出而不得出，參蘇飲去參苓加砂仁陳皮

○身熱脉數，大便秘而腹脹，此熱毒壅遏，當微下之，

或痘半未出而喘息腹脹，大便不通，煩躁作渴，譫

語不安，當急下之，

俱用紫草膏陳枳殼湯

或枳桔湯二

虛弱自利，手足厥冷，腹脹發噦，乃裏氣虛，

姜附理中

○痘既出腹脹有二證，

○一則不能食，二便利，腹中虛鳴，乃陰陽不和，或因作

熱煩渴、飲冷過多、或悞投涼劑、熱為冷激、欲出不
能、毒不能發、當溫中逐冷氣。五味異功散、十一味
木香散、
甚者氣喘發厥、痘白無血色、多致不救。十一味木
香散、
勿用宣瀉藥、

一則煩躁大渴、或二便秘、或啼哭不止、乃毒氣陷伏
入裏、當溫平解毒快氣。人牙散、一味活血散、

○小便赤澀、心腹脹滿、乃伏熱在胃。四聖散、

○痘出太盛、面黃、大便黑、煩躁喘渴、腹脹、乃瘀血在裏、

治法見渴條、

○痘出太盛，當結膿窠，痂疔而不結，能食而喘，腹脹，譫語，不大便。治法見喘條。

○痘起發而腹脹，二證同前。陰陽不和者，痘正發，熱毒盛，必煩渴。葛根解毒湯。人參麥門冬散。人參白朮散之類。傷冷。益黃散，去甘草，加姜製厚朴。勿用峻下藥。

毒氣陷伏入裏者，紫草飲子。

若腹脹目閉，口中如爛肉臭，大惡證。

○靨後腹脹喘渴，大便利，小便澀。治法見喘條。