

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百五十二



南京中医药大学图书馆版权所有

世濟方卷一百五十一

周王朱櫛 撰

熱病所
總論

熱者皆傷寒之類也冬傷寒者皆傷風寒之類也
為暑者執重于溫也
熱病者小便利赤黃腹痛多
痛手足熱躁不能安

凡熱病者必先不舉身重身熱盛則卒心痛煩熱欲

嘔頭痛面赤無汗脾熱病者先頭重煩痛心煩欲嘔身
熱熱盛則腰痛腹滿溏泄肺熱病者先淅淅然毛起惡
風舌上黃身熱熱盛則喘欬胷背不得大息頭痛不汗
出而寒腎熱病者先腰痛脛痠大渴數飲水身熱熱盛
則項痛而強脛寒足下熱不欲言肝熱病者左頰赤心
熱病者面先赤脾熱病者唇先赤肺熱病者右頰赤腎
熱病者頤先赤病雖未發見色者療之名曰治未病一
日汗不出大泄發者死二日泄而腹滿甚者死三日目

不明熱不已者死四日老人嬰兒熱而腹滿者死五日
汗不出嘔血者死六日舌本爛熱不已者死七日欬血
而衄汗出不至足者死八日髓熱者死九日熱而瘥者
死凡有此候者皆不可治也熱病已得汗脉靜者生脉
躁者難治熱病脉常盛躁而不得汗者此陽之極也得
汗者生不得汗者難差熱病已得汗脉上躁喘且即復
熱喘盛者死熱病七八日脉不躁不數後三日當有汗
若不汗者難治熱病七八日其脉微小者生脉代舌焦乾

黑者死熱病已得汗常熱不去脉靜者生脉躁者難治
熱者脉常躁此氣之極也亦死熱病腹滿常喘熱不退
者死熱病多汗脉虛小者生緊實者死矣 又云熱病
者皆傷寒之類是也或愈或死皆以六七日之間其餘
以十日以上者何不知其解願聞其故岐伯曰巨陽者
諸陽之屬也其脉連于風府故諸陽主氣也人之傷寒
也則為病熱熱雖甚不死其兩感于寒而病必不能免
于死矣帝曰願聞其狀岐伯曰傷寒一日巨陽受之故

頭項疼腰背強二日陽明受之陽明主肌肉其脉夾鼻
絡于目故身熱目痛鼻乾不得卧也三日少陽受之少
陽主膽其脉循脇絡于目故胃脇痛而耳聾三陽經絡
皆受其病而未入于藏故可汗而已四日太陰受之大
陰脉布胃中絡于噤故腹滿而噤乾五日少陰受之
少陰脉貫腎絡于肺系于舌本故口燥舌乾而渴六日
厥陰受之厥陰脉循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮三陰三
陽五藏六府皆受病榮衛不行五藏不通則死矣其不

兩感于寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰
身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹
減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已
而嚏十二日厥陰病衰囊縱小腹微下大氣皆去病日
已矣帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏脉病日衰
矣未滿三日可汗而已其滿三日可下而已

熱病一日

論

夫熱病一日病在太陽主表表胃皮膚也病在皮膚之間故頭項腰脊皆痛宜汗之則愈也

方

解肌散

出聖惠方

治熱病一日頭痛身熱四肢煩疼宜服

麻黃

去根節

川升麻

甘草

炙微赤剉

赤芍藥

柴胡

去苗

桔梗

去蘆頭

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麤炒微黃各一兩

右為粗散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至

五分去滓不計時候熱服衣覆取汗未汗再服

石膏散出聖惠方

治熱病一日頭痛壯熱宜服

石膏 麻黃去根節 黃芩 桂心 赤芍藥 柴

胡去苗各一兩

右為粗散每服三錢以水一大盞入生薑半分煎至

五分去滓不計時候熱服衣覆取汗未汗再服

葛根散出聖惠方 治熱病一日頭痛項強身熱如火宜服

葛根剉 赤芍藥 麻黃去根節 石膏各二兩 白芷 柴

胡去苗 黃芩 桂心各一兩

右為粗散每服四錢以水一大盞入葱白五寸生薑

半分煎至五分去滓不計時候熱服衣覆取汗

柴胡散

出聖惠方

治熱病一日頭痛壯熱煩悶宜服

柴胡

去苗

赤芍藥

葛根

各一兩

梔子仁

黃芩

各半兩

石膏

二兩

右為散每服四錢用水一大盞葱白二莖豉半合煎

至五分去滓不計時候溫服

梔子散

出聖惠方

治熱病一日頭痛壯熱心中煩悶宜服

梔子仁

黃芩

各三分

石膏

葛根

剉

柴胡

去苗

麥門

冬

去心焙
各一兩

右為粗散每服四錢以水一中盞入豉五十粒葱白

二莖煎至五分去滓不計時候溫服

麻黃散

出聖
惠方

治熱病一日頭痛壯熱宜服

麻黃

一兩去
根節

川大黃

三分剉
碎微炒

黃芩

桂心

甘草

炙微
赤剉

赤芍藥

各半
兩

右為細散每服不計時候以新汲水調三錢服後蓋

衣取汗未汗再服

治熱病一日壯熱頭痛宜服

出聖惠方

甘草

一兩炙微赤剉

生薑

三分切

蘇蘇

二枚大者細剉梔中盛之

右先將甘草生薑以酒一大盞半煎至八分去滓熱投入蘇蘇梔中絞取汁不計時候分溫二服衣覆取汗

桃柳湯浴方

出聖惠方

治熱病一日身體壯熱頭痛骨肉

痠楚背脊強口鼻乾手足微冷小便赤黃宜用

桃枝并葉

五斤 細剉

柳枝并葉

五斤 細剉

右以水一石煮取一斗去滓帶熱避風處淋浴浴後于

密室中刺頭并眼後兩邊及舌下血斷以鹽末塗針

處便宜服葛豉粥

葛豉粥方

出聖惠方

葛根

二兩 剉

葱白

五莖并 鬚白

豉

一合

生薑

一兩 切

右藥以水三大盞煎至一盞半去滓下粳米二合煮

作粥乘熱頓服衣蓋取汗

麻黃粥方

出聖惠方

治熱病一日宜服發汗

麻黃

一兩去根節

豉

半合

右藥用水一大盞半煎至一盞去滓下粳米半合煮作稀粥乘熱頓服衣蓋取汗

治熱病疫毒病一日兩日頭痛壯熱渾身發熱如火眼目昏眩項背強急診其脉寸口浮數總三部俱浮數宜發汗若洪大緊急有骨力即不可汗也但熱病疫毒病不可以時日為定只看脉氣可汗即汗可取即取不可

差誤凡陽毒傷寒三日後其用藥取病與治熱毒疫病只一般也惟初間兩日所治小有不同但傷寒在表須當發之熱病疫毒病往往有不須發也若見得不仔細須俟三日後方可下疏藥也

治疫毒在表發汗方

萬金護命方

麻黃

去根三分

牡丹皮

去心

桔梗

羌活

獨活

細辛

荊芥穗

各一分

右細杵羅為末每服五錢水一椀椒五十粒茶末半

錢煎取濃汁用調下藥末非時和滓喫厚蓋衣被發
大汗一服安効

治時行熱病初得

本
草

以蒸菜搗絞汁飲之得差

熱病二日

論

夫熱病二日陽明受病病在肌肉故內熱鼻乾不得眠
也故可瘳膏火灸發汗而愈也

方

麻黃散

出聖惠方

治熱病二日頭痛壯熱肢節不利宜服

麻黃

二兩去根節

川大黃

剉碎微炒

葛根

剉

桂心

柴胡

去苗

赤芍藥

各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候熱服衣蓋取汗

前胡散

出聖惠方

治熱病二日口苦咽乾頭痛壯熱宜服

前胡

去蘆頭

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃各一兩

葛根

剉

桂心