

傷寒真方歌括卷三

閩長樂陳念祖脩園著

冶南林壽萱校

少陽上篇

提綱有口若咽乾目眩之症三者能開能合相火為害故病法當清火

少陽主半表半裏寒熱相雜若邪在半表其寒熱往來於外宜以小柴胡湯解半表之虛邪以大柴胡湯解半表之實熱若邪在半裏其寒熱相搏於中則為嘔吐腹痛以黃連湯主之其寒熱互結於心下則為痞滿嘔逆以半夏瀉心湯主之其寒熱相阻於心下則為拒格食即出以乾薑黃芩黃連人參湯主之若邪全入於裏則膽

脘受病。膽火下攻於脾。而為自利。有黃芩湯法。膽火上
逆於胃。利又兼嘔。有黃芩加半夏生薑湯法。此皆少陽
正治方法也。

蓋少陽為樞。職司開合。而轉運其樞。全賴胃氣充滿。
則開合有權。其邪不能內犯。胃氣不振。則闕鑰廢弛。
邪得出入矣。

小柴胡湯

豚弦脅痛。小柴胡。夏草。薑苓。參棗。枳。和解少陽為正法。
陽明兼症。豈殊途。

柴胡 四錢。人參黃芩炙草生薑 各一錢五分。半夏 二錢。

大棗 二枚。水二杯煎一杯半去滓再煎八分。溫服。

此方以二劑合作一劑。方稱原方。三服之一。今易作小劑。徇時好也。深於醫者必照古法。不待余贅。小陽介於兩陽之間。須兼顧三經。故藥不宜輕去。渣再煎者。此方乃和解之劑。再煎則藥性和合。能使經氣相融。不復往來出入。古聖不但用藥之妙。其煎法具有精義。

加減法 若胸中煩而不嘔者。去半夏。人參加括

姜二錢。若渴者去半夏。加人參五分。括蕞根二錢。若腹中痛者。去黃芩。加白芍藥一錢五分。若脇下痞。去大棗。加牡蠣二錢。若心下悸。而小便不利者。去黃芩。加茯苓二錢。若不渴。外有微熱者。去人參。加桂枝一錢五分。溫覆取微似汗。○若欬者。去人參。大棗。生薑。加五味子七分。乾薑一錢。

大柴胡湯

脈弦而沉。沉有力。相火結熱。下宜亟。芩芍棗夏枳柴薑

大柴湯是小柴翼。

柴芎

曲錢

半夏黃芩芍藥枳實

各一錢五分

生薑

二分錢五分

煎法同小柴胡湯。

此方本無大黃。所云結熱。非實熱也。下解其熱。非導其便也。小柴胡湯治半表之虛。此治半表之實。即小柴胡湯之翼也。今活人書每以此方代承氣湯。取大便微利。重在大黃。畧變中景之法。不可不知。

黃連湯

胸中有熱胃邪麗黃連甘草乾薑桂。人參夏草理陰陽。嘔吐腹疼為妙劑。

黃連炙草乾薑桂枝各一錢五分。人參五分。半夏一錢。

大棗二枚。水煎分二服。日三夜二。

即柴胡湯以桂枝易柴胡以黃連易黃芩以乾薑易生薑此症雖無寒熱往來於外而有寒熱相搏於中所以寒熱攻補並用仍不雜少陽和解法也。半夏瀉心湯。

滿而不痛則為痞。心隔難開何所以。夏草參連芩棗薑。

宣通膠滯同歡喜。

半夏三錢。黃芩乾薑炙草人參各一錢五分。大棗二枚。

黃連五分。水煎溫服。

乾薑黃芩黃連人參湯

厥陰寒格用乾薑吐下芩連是所長誤治致虛參可補分途施治不相妨。

人參黃連黃芩乾薑各一錢五分。水煎服。

入口即吐是火炎之象故苦寒倍於辛熱。但吐下誤後中外之氣索然故以人參補其中氣並以助

乾薑之辛。衝開格逆而吐止。食入矣。凡嘔家夾熱。不利於桔半者。服此方而晏如。

黃芩湯

黃芩湯用甘芍草。太陽少陽合病討。下利只須用本方。

兼嘔薑夏加之好。

黃芩二錢。炙草芍藥各二錢。大棗三枚。水煎服。日二夜

一。

黃芩加半夏生薑湯。即前湯加半夏二錢。生薑三錢。煎服法同。

二陽邪入少陽之裏。膽火下攻於脾。故自下利上

逆於胃故兼嘔也。此湯苦甘相濟調中以存陰也。兼嘔者加半夏以降逆。生薑以散邪也。

少陽中篇

少陽雖有汗吐下三禁。而法中又有口不渴身有微熱

以微熱驗其表邪尚在。去人參加桂枝以取汗。傷寒六七日發

熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結。支撐也若有物在胸脇間外

症未去者以柴胡桂枝湯汗之。下後胸結脇滿微結

小便不利渴而不嘔頭汗出。和鬱於經不得外越但升於頭而汗出也往來

寒熱用柴胡桂枝乾薑湯以汗之。又有柴胡症具而

反下之心下滿而鞭痛。此為結胸。大陷胸湯主之。本
柴胡症。醫以丸藥下之。微利。胸脇滿而嘔。日晡熱者。小
柴胡加芒硝湯下之。是汗下之法。不可不審用也。

柴胡桂枝乾薑湯

寒熱往來。頭汗出。心煩。胸脇滿而室。柴芩薑蠓括樓甘
花粉。桂枝加減七。

柴胡

四錢

桂枝

黃芩

各一錢

五分

括萋根

二錢

乾薑

牡

蠣

炙草

各一錢

水煎服

初服

微炊

再服

汗出

而愈

按本方用乾薑一以散脇之微結。一以濟芩萋之

苦寒使陰陽和而寒熱已也

大陷胸湯 見太陽救誤篇

柴胡加芒硝湯

少陽邪入陽明府日晡熱潮脇滿吐甘夏參苓柴草薑
芒硝加上病方愈

柴胡一錢二分。黃芩炙草生薑人參各一錢。半夏七分。
棗一枚。芒硝一錢。水煎後入芒硝一二沸服。

按胸脇滿而嘔。少陽之邪正盛也。日晡所發潮熱
陽明之熱已結也。本宜大柴胡兩解之。因以丸藥

誤下。強逼溏糞。胃氣大傷。大柴胡中有大黃枳寔之峻。必不堪受。不如小柴胡湯有人參甘草以扶之也。加芒硝者。勝熱攻堅。速下不停。無傷胃氣。是以峻攻之藥。為補養法也。

柴胡桂枝湯

太陽未罷。少陽多支結。煩疼寒熱。過津液。一通營衛。治小柴方內桂枝加。

柴胡二錢。黃芩桂枝芍藥生薑各八分。人參一錢五分。

炙草五分。棗二枚。煎服。

按此太陽邪輕少陽邪甚之方。故湯名以柴胡為
冠也。活人往往取代桂枝湯。看似變通。實亂仲景
之法。余推活人所以取代之故。以論中有和其營
衛。以通津液。後自愈十一字也。

少陽下篇

少陽失治。壞症最多。非有補天浴日手段。不足以語此。
論云。傷寒八九日下之。胸滿煩驚。小便不利。譫語。一身
盡重。不可轉側也。柴胡加龍骨牡蠣湯主之。

紫胡加龍骨牡蠣湯

太陽誤下心煩驚譫語身沉水不行。芩夏參枝柴薑棗。

伏丹龍牡定神明。

柴胡、龍骨、牡蠣、生薑、人參、茯苓、鉛丹、黃芩、桂枝、半夏。各

一錢五分。大棗二枚。水煎。入大黃二錢。二三沸。溫服。

此乃正氣虛耗邪已入裏而復外擾三陽故現症。

錯雜藥亦隨症施治。真神化無方也。借治癲癩。

症神效。

傳經發明。

按宋元以後醫書皆謂邪從三陽傳入。俱是熱症。

唯有下之一法論中四逆白通理中等方俱為直
中立法。何以謂之直中。謂不從三陽傳入。徑入三
陰之臟。唯有溫之一法。凡傳經俱為熱症。寒邪有
直中而無傳經。數百年來相沿之說也。余向亦深
信其然。及臨症之久。則以為不然。直中二字。傷寒
論雖無明文。而直中之病。則有之。有初病即見三
陰寒症者。即宜大溫之。有初病即見三陰熱症者。
即宜大涼之。大下之。是寒熱俱有直中也。此謂直
中皆為寒症者。非也。有謂逆次傳入三陰。盡無寒

症者亦非也。蓋家熱二氣盛則從化。余揆其故。則有二。一從病體而分。一從誤藥而變。何則。人之形有厚薄。氣有盛衰。臟有寒無。所受之邪。每從其人。之臟氣。而為熱化寒化。今試譬之於酒。酒取諸水泉。寒物也。酒釀以餅藥。又熱物也。陽藏之人。過飲之不覺其寒。第覺其熱。熱性迅發。則吐血面瘡。諸熱症作矣。陰藏之人。過飲之不覺其熱。但覺其寒。寒性凝滯。則停飲腹脹泄瀉。諸寒症作矣。知此愈知寒熱之化。由病人之體而分也。何謂誤藥而變。