

欽定四庫全書

子部

急救仙方卷

四至
六



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

急救仙方卷四

痔證

痔二十四證歌

皆因酒色氣風食五事過度而起

痔證分三八憑君仔細看莫教年日久見者膽心寒菱

角有形怪蓮花不可觀穿腸并鼠妳酒色兩相干莫謂

此怪蜂窠亦不寬雌雄同氣血子母及腸盤元珠尤

可怪勾腸痛若針板梳與流涎見者便心酸栗子於中

大雞心在外安珊瑚形可惡那更脫肛難內痔紅不出
搭腸裏內盤垂珠更難治日久有雞冠切莫輕刀火令
君性命殘用工無半了去病更除根

紅肉膏 治痔方

辰砂

錢一

乳香

半錢
別研

白礬

兩一

黃丹

錢一

砒

兩半

用白礬鋪地
火煨七分

右為末每用二錢再用斑貓三箇巴豆三箇香油一
兩同煎以斑貓巴豆赤為度去二味只用油調藥

末成膏子看大小貼之一二日一換藥至六七日
看焦黑不用塗用催藥未破已破以紙撚子任藥
入瘡為妙

金花散 洗痔

無名異 半錢

黃蘗 一兩

黃連 半兩生

烏黑豆 半升

右為末水煎待溫洗了用海蛤散傳

龍骨海蛤散

蕪荑 一兩

龍骨 一錢

海蛤 一錢煨

蜜陀僧 半錢

右為末先摻次用貼痔膏日一次貼

乳香膏 貼痔

茱萸 白芨 白薇 黃連 黃檗 當歸

各等分

右為末用香油四兩入柳枝三尺四寸長同煎以柳

枝黑為度入前藥末同煎紫色用絹濾去滓再煎

數沸次入黃丹乳香一二錢熬成膏以瓦瓶貯之

用少許貼瘡上立效凡下痔先服通血積藥一日

二次方用換痔藥

當歸飲 通血積

黃連

火麻子

當歸

各半兩

右為末每用一錢嚼溫酒下又將通真丸一粒臨卧

再服

通真煨薑丸

良薑

炮

訶子

炮

肉桂

去皮

木香

肉豆蔻

破故紙

茴香

胡蘆巴

各一錢

末

一錢

右為末研勻醋和丸如梧桐子大每用一錢再用木

瓜生薑同約以濕紙裹煨令香熟溫酒下

下膈散 治不思飲食

苦參

蓬莪朮

炮

荊芥穗

炒

益智

各一兩
去皮

右為末每服一錢水一盞薑蜜同煎八分入鹽虛心

服

洗湯犀角散

骨碎補

穿山甲

二兩
蛤粉炒

延胡索

半兩
生

甘草

根

一兩

右為細末茶調半錢空心服

止痛麥煎散

滑石

三錢

鼈甲

半兩

川烏

一兩去皮尖

秦艽

半錢

前

胡

半兩

右為末每用二錢小麥三十五粒同煎至七分通口

服不拘時三四服見効

黑神黃耆散

京墨

黃牛角

一隻

蛇蛻

一條全

檳榔

三箇

豬牙

皂角

十箇

穿山甲

蔓荊子

各一兩

黑狗脊

一兩去毛

黃京子

半兩

枳殼

半兩

右為末以瓜萐五箇去子入藥在內用新瓦瓶盛之

後用黃泥封固火煨烟盡再入沒藥青木香末各

一錢白蕪荑末半兩荊芥末一兩同前藥末拌勻

每服二錢胡桃酒下日三服茶亦可

宣風散

巴豆

去油

大黃

炮

朴硝

枳殼

陳皮

去瓢

右各等分為末每服二錢水一盞煎至七分溫服如服藥後大便結澀二三日再服

木通散

人參

一錢

斑猫

炒去足翅

鶴蝚

大黃

牡礪

煨

枳殼

各等分

萆澄茄

半兩

丁香

少許

右為末糯米糊為丸如梧桐子大每服五丸煎沙糖

湯下此藥恐不可用

又方

生薑切薄片放在痔上痛甚處以熱艾作炷於薑上灸三壯黃水即出自消若肛門上有兩三箇痔三五日後如前法逐一灸之屢試甚效

收膿膏

海金砂

乳香

白芨

雄黃

各等分

右為末入瘡口次以乳香膏貼之

車前散

食茱萸

車前子

雄黃

乳香

赤石脂

龍

骨

各一錢
生用

右為末糝瘡口以乳香膏壓之一日二次如瘡口乾
只用乳香膏貼有清水出用後藥注青膏

注青膏

五倍子

三箇
生

延胡索

白礬

各一錢

右為末服少許如清水出即以紙貼為膏藥入瘡口

內

金花散

鬱金 甘草炙

白薑炮

槐花炒各二兩

右為末每服二錢空心陳米飲下

山甲散 治痔瀉血水者

五倍子生

穿山甲

炒存性各一兩

右為末每服二錢空心陳米飲下

解腸散 治臟毒瀉血

威靈仙

一分

麤仁

一分

貫衆

一分

右為末每服二錢麝香酒調服

神驗治痔方

信

錢半

白礬

兩一

朴硝

兩一

沒藥

錢半

乳香

錢半

麝

許少

綠礬

兩一

右用鐵銅鍋先以信鋪鍋底以白礬覆之又以綠礬

覆之又以硝覆之以火炙之候成水投乳香末攪

勻候乾如石放地上一宿出火毒研末方入麝同

研加片腦少許研極細用唾調塗附瘡口上四邊

一日三次其痔自然焦落

治痔方

白礬

四兩

綠礬

一分

朴硝

半兩

信

半兩

右礬硝各先作末以少半入盞內以信成塊入中以
餘藥覆上用炭約二斤許四圍燒之候沸將乾再
覆藥末磁甌收貯此藥經年火熟黃色則效而不
疼赤色則不可用如傳外痔白礬減半欲速效用
津液調傳欲不疼用甘草湯調傳先用茅根煎湯
熱洗然後傳藥日夜三五易凡疼發必大腸祕結

服寬腸丸以通大便不可燒烟熏入腸反為害暑
月加百草霜黃丹調傳如痔已落肛門腫痛用槐
皮煎湯洗用津滴瓦上磨枳殼拌藥傳如肛門不
收木賊朴硝煎湯洗調傳各一次二次即效未落
已前黃皮薄荷煎湯洗唾津調傳肛門夏月用此
尤佳

洗藥初用此洗

木通 黃芩 黃柏 黑豆

等分