

迎此散亂之機爲之舟楫以載神而反其宅若含此而用養血安神之品皆緩不濟事卒難救逆也

問用龍骨牡蠣借彼飛伏之意迎此散亂之機古人未有此論其說有所本與答曰龍純陽之物也。潛極而飛以神用者也。牡蠣則沉潛水底體用皆陰矣合而用之其能挽飛越而爲安定又何疑焉總之此證之驚狂與桂枝甘草龍骨牡蠣湯之煩躁證皆心神爲病不比太陽之煩少陰之躁但有甚有不甚故皆以安神爲先此以上焦之邪滯故用蜀漆薑棗彼以上焦之邪滯已微故去三物耳

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝
一兩 甘草 炙龍骨 牡蠣

各二兩熬

上四味以

水五升。煮取二升半。去滓温服八合。日三服。
此證之煩躁。是天君未動。而僅擾擾不寧。且外
邪雖未盡。而上焦之邪滯已微。故但用龍骨牡
蠣之鎮定。而去蜀漆之輕揚。因旣經火逆。又下
且針脾中津液。不堪再宣。故并去薑棗。而但以
桂枝甘草微和其表。所謂因時制宜。稱物平施
也。

甘草乾薑湯

此卽四逆湯去附子也

甘草

四兩

乾薑

二兩

上三味咬咀。以水三升

煮取一升五合去滓分溫再服
脈浮自汗出固是在表之風邪而小便數心煩
則邪亦在裏加以微惡寒則在裏爲寒邪更加
腳攣急則寒邪頗重矣乃用桂枝獨治其表則
陽愈虛陰愈無制故得之便厥桂枝且誤其可
用麻黃大青龍乎陰寒內凝總無攻表之理也
故用甘草乾薑湯以調中而復其陽者卽所以
散其寒也若仲景論證象陽旦誤治而厥逆者
於桂枝湯加附溫經增桂令汗矣又飲以甘草

乾薑湯以桂走表附溫下中氣未安非甘草乾薑專溫其中則夜半之陽回足熱政可知耳。

辛甘合用專復胸中之陽氣其夾食夾陰而赤足冷發熱喘欬腹痛便滑外內合邪難於發散或寒藥傷胃合用理中不便參术者並宜服之真胃虛挾寒之聖劑也若夫脈沉畏冷嘔吐自利雖無厥逆仍屬四逆湯證。

芍藥

甘草湯

洗酒

甘草

炙各四兩

上二味咬咀以水三升煮

取一升半去滓分溫再服

前用甘草乾薑湯厥愈足溫不但不必治寒且

慮前之辛熱有傷其陰而足攢轉銅故隨用芍藥甘草以和陰而伸其腳若陽旦誤治證增桂加附子而又用乾薑乃胫仍不伸似平陰盛然咽乾譫語熱證相錯其非重陰汙寒可知故亦以芍藥甘草和其陰也

甘酸合用專治營中之虛熱。其陰虛陽乘至夜發熱血虛筋攣頭面赤熱過汗傷陰發熱不止或誤用辛熱擾其營血不受補益者並宜用之真血虛挾熱之神方也。設見脈浮自汗營衛不和縱非外感仍屬桂枝湯證矣。

調胃承氣湯

入後太明上篇

四逆湯

入後太陰全篇

茯苓四逆湯

茯苓

六兩

人參

二兩

甘草

二兩

乾薑

半兩

附子

一兩

生用

去皮破八片

上五味以水五升煮取三升去滓溫

服七合日三服

汗出煩躁風證之常也。不汗而煩躁卽爲大青龍證。然脈弱汗出諄諄相戒。謂挾風表虛而又汗之。其亡陽最易也。今汗下不解。轉增煩躁。是正虛不能勝邪。雖與之爭。而有欲負之勢。故用茯苓最多。并人參甘草乾薑。生附彷誤用大毒。

龍施真武之例而去芍藥加參甘。俾溫補兼施。
以安其欲亡之陽使虛熱自退。煩躁自止。而風
寒之邪在所不計耳。此證惑人在病仍不解四
字。仲景恐人因此而疑煩躁爲風邪。未服恣意
表散。危機一蹈噬臍無及也。

過汗則亡陽而表虛誤下則亡陰而

裏虛陰陽表裏俱虛乃生煩躁故用人參
茯苓入心以除煩附子乾薑入腎以解躁

黃連湯

黃連 甘草 乾薑 桂枝各二兩 大棗十二枚 上七味以水一斗煮取六升

半升

洗枝劈

去滓溫服一升日三服夜二服

人身之所恃以升降陰陽調和寒熱者全憑中氣故卽有偶感之寒偶感之熱稍緩自化邪一而不爭也今胸有熱風邪在上也胃有邪邪者寒也寒熱之邪勢均力敵則心下胃上竟爲越吳戰場往來不通乃人身自然之陰陽反各從賊勢爲消長而不能勝調和之任欲嘔吐者熱邪上逼也然止言欲非真能嘔吐也爲抗而已腹中痛者非胸中之熱能入腹與爭也盜據中

原而下土告陷失救援之望爲困而已故以黃連合半夏清熱而降逆乾薑同桂枝溫胃而散寒人參甘草大棗爲維持調護之主庶陽精無擾而陰精奉上矣其不用生薑者生薑止嘔功在辛散上陽陷於賊熱下陰陷於賊寒而精氣不貫病在兩頭故設法除賊以升陰降陽邪不在中間無取辛散焉耳雜病欲嘔而不吐胸上覺熱者亦當以此方推之

成氏

日溼家

下後舌

上如胎者

以丹田有

熱者

胸中有寒

是邪氣入裏

而爲下寒

上熱也

此

傷寒邪氣傳裏而爲下寒上熱也

胃中有邪氣

使陰不得升而獨治於下爲下寒腹中痛陽不得降而獨治於上爲胸中熱欲嘔吐宜與此湯以升陰降陽

小青龍湯

麻黃

芍藥

乾薑

甘草

炙桂枝

細辛

各三

兩

五味子

半夏

各半升
湯洗

上八味以水一斗

先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升

加減法

若微利者

水滿行也

去麻黃之發汗

加蕘花如雞子大

熬令赤色

以利水。水去則利。止時珍曰。蕘花、蓋亦芫花之類。氣味主治大略相近。

若渴者

津液不足也

去半夏

之燥津液

加栝蔞根三兩

微以徹

生津而熟

若嘔者

水寒之氣而散

去麻黃

加附子一枚炮

以利

以利水微徹

生津而水寒

若小便不利

少腹痛水停下焦

去麻黃

加附子一枚炮

以利水微徹

以利水微徹

加茯苓四兩

以通竅而利水道

若喘者

水氣射肺而聲息不行也

去麻黃

以潤肺而下行氣

麻黃加杏仁半升

去皮尖

以潤肺而下行氣

人身水飲停蓄心下

則變證不一

蓋水氣爲陰

邪。故逆上則爲喘

爲咳爲嘔

注下則爲腸鳴自

利小腹滿小便不利

以心下爲通衢無所不至

也。至若在傷寒表未解時。災變尤急。攻表則遺
裏。攻裏則遺表。豈不兩難乎。不知太陽之邪。由
皮毛而入。皮毛爲肺之合。水飲之逆。因氣爲使。
肺爲氣之宗。故仲景一見水氣證。如乾嘔。微利。
咳。發熱。不問全備與否。竟於桂枝麻黃中。加五
味之酸。以收肺氣之逆。乾薑之辛。以瀉肺氣之
滿。半夏細辛之辛。入陰消飲下逆瀉肺耳。蓋細
辛能入心瀉肺。補肝潤腎而助其宣散。故於風
藥中獨爲入陰之劑。更合五味芍藥乾薑半夏。

以遂其內搜之性雖有桂枝麻黃不能直達表分而但助其擴清矣蓋取小青龍者欲其翻波逐浪以歸江海不欲其興雲升天而爲淫雨之意後人謂小青龍爲發汗輕劑昧其旨矣

白虎加人參湯

於白虎湯內加人參兩餘依後白虎湯法白虎湯但能解熱不能解表故必無表證而裏熱者宜之煩渴裏熱之徵也至欲飲水知陰火燥爍而液乾故加人參以瀉陰火也若背微惡

寒而口燥心煩者。蓋背爲至陰之地。今表熱少。裏熱多。挾虛故。雖表退而有寒。比通身惡寒不同。故亦加人參。若汗煩渴脈洪大者。則雖熱而虛可知。故亦加人參。若傷寒七八日。至大渴熱燥而煩者。甚至欲飲水數升。其熱何如。特以熱結在裏。所以表熱不除。而時時惡風。乃氣傷於熱而餒不可泥爲表邪。亦宜白虎加人參湯。以表之。微風爲輕。裏之因寒變熱。結爲重也。設脈但浮而不滑證。兼頭疼身痛。則雖表裏俱熱。而

在表之邪渾未退。白虎湯不可用。若加人參。不。

更助其邪耶。

白虎解熱。人參生津。凡身發熱爲熱在表。渴欲飲冰爲熱在裏。身熱

飲水。表裏俱有熱。身涼不渴。表裏俱無熱。

白虎湯

石膏一觔

碎

知母六兩

碎

甘草二兩

合

粳米六

合

上四味以

水一斗

煮米熟湯成去滓

溫服一升

日三服

白虎湯不能解表。此主傷寒脈浮滑。表有熱。裏有寒。然則仍主表裏雙解耶。不知傷寒以滑脈爲實熱。故陽明病譫語發潮熱一證。脈滑而疾。

者卽與小承氣觀彼則知此之脈浮滑爲宜涼之表而非當解之表矣故曰表有熱明非發表不遠熱者比也寒喜傷陰陰傷生熱故曰裏有寒寒者邪也寒變之熱也表裏俱熱肺之困極矣故以石膏之辛合知母之苦而治之名曰白虎者白虎爲西方之金暑熱得秋金而清肅以是爲救肺之功臣也然石膏知母之救肺實以救胃也以胸胃爲肺之堂奧內外俱熱肺無容身之地故不得不假上以消其炎熱石膏實爲