

馮氏錦囊秘錄痘疹全集卷五

姪 謙益恭存

海鹽馮兆張楚贈甫纂輯

門人陳成斌質菴全較

孫 人章國英

發熱諸論

初發悠悠身熱。尤宜氣息和平。二便自調。而容不改。兼之
睡臥安寧。見點尖紅光潤。飲食如常。便見症來順候。初熱
而吐瀉腹疼。昏迷而不省人事。悶亂喘急。或連熱齊敷。色
不光潤。及紫泡黑陷。固已皆爲逆症。更如肌色青面晄白。
精神少而倦怠。視此當作虛看。痘出決然不振。再見便痛。

見乳只須補益爲先。若還熱盛而氣粗煩燥而不寧。譫語狂言均爲內熱。如加喘滿腹膨。便秘須知熱擁肌膚燥而毛色焦。口氣熱而身燔灼。此則蓄熱鬱遏內症固重。而外症尤烈。腹脹口張而喘急。啼聲不絕而嘔嘔五竅不通。須防失血。點來隱隱。出恐復顛。吐乳更兼搭眼。而青又見搖頭狂亂。忽生此乃發驚先兆。然熱甚者只宜清涼發散。不可峻用。若寒發散則毒得外出而熱自解。若寒則毒反水伏而出。愈難其發散之劑。輕則如升麻乾葛以疎其熱。則煩燥壯盛者非此何以定其標。重則有麻黃桂枝以間其壅。則喘急腹脹者非此何以救其危。未萌先泄有熱症。

莫作虛看。無熱症便爲虛論。熱瀉投以清涼。更加發散。虛瀉投以溫補。仍佐開提。內虛誤用寒涼。不特助伊作瀉。實熱如投補劑。必致轉增煩劇。安靜而能食。勿謂便實而可下。泄瀉而煩渴。莫言熱症。以投涼。

痘之爲候。必先火熱如烙。然後痘暴於外。蓋天地化育萬物。雖賴土以生息。然土發育而無火。則偃匿而不克振故矣。人身一小天地。故痘若不壯熱熏蒸。焉能振拔於外。發洩其腎窖之梟鬱哉。故曰五穀不熟不秀。實痘疹不熟不透。徹徹則肌鬆竅利。痘出粗肥勻淨。而無細密連片之虛。但太過者。則真元耗燦。以有限之血。抵無涯之火。鼎沸於

內輕變重重變危矣。然有當熱者如痘未出之前宜大熱以逐其毒。若反頭溫足冷則毒不能發越在外反致內潰而死矣。不當熱者如毒既出則宜表裏和平以長養氣血助毒成漿。如反壯熱則氣血煎熬往來不寧不能拘收其遷是以毒無出路變爲紫黑乾枯失血狂擾脹滿而斃矣。凡發熱一日而見點者爲鬼箭。此正不勝邪痘毒妄行集逸肌表凶之兆也。然鬼箭者驚厥又爲上乘蓋痘從心經火性疾速雖見點而亦漸次出濟粗肥磊落者也。如稠密湖小者大凶。若熱三四日而見點者爲正候是氣血交會拘毒出於肌表之間邪正不相抗搏故乃熱退身涼見點。

紅潤立成窠穴。顧之兆也。若熱六七日而見點者，爲愆期。是氣血凝滯，梟毒煩蒸，凶之徵也。至若乍涼乍熱，嬉笑如常，飲食如故，潮熱多日而見點者，此又最爲順候。因毒輕質厚，邪火難於感動，痘出必稀，又不可作愆期論也。痘之毒非熱不能發，痘之出非熱不能損，蓋痘雖必因熱而始出，然熱太甚則血氣虛損而出，愈難故發熱之初宜爲表散，見點之後宜爲清解。但痘疹熱者發生之機，也不可過用寒涼以損陽氣。若熱甚便秘者，可微利之。如微熱者，只當解毒過發散，則表虛過寒涼則凝滯，驟補益則助火。是以表後宜補，補中兼表，此通變之術也。若起脹熱甚。

而無漿者則宜清火退熱熱退而漿日行若氣血虛而作潮熱不止者則宜十全大補湯主之更有痘後潮熱者之猶產後氣血大虛所謂火從虛發必於午後臉赤發熱也宜保元湯合四物湯加減服之

凡熱之時外者外治內者內治中外皆和其痘自出然又當審察天時如時大寒則腠理閉密氣血凝滯防其發泄得遲而有毒氣壅遏之變治宜以辛熱之藥發之如時太熱則腠理開張氣血淖澤防其發洩太急而有潰爛之變治宜以辛涼之藥發之若在乎候則以溫和之劑加治故宜順四時之氣勿伐天和如春肝旺治宜折風木之勝以

補脾之受制如夏心旺宜補肺之不足如秋肺旺治宜清散肺中之邪如冬腎旺治宜以勝表裏之寒兼有暴寒暴熱久晴久雨又宜變通凡熱因於痘治痘爲先痘因於熱治熱爲要熱必有本求本治之然痘在初熱何能預識其輕重乎凡發熱而乍進乍退氣色明勞精神如故大小便調能食不渴目清唇潤此毒輕也痘必稀疎卽多而必易發易靨如壯熱不減氣色慘黯精神昏悶且不能食二便不調目赤唇焦此毒盛也痘必稠密若出疎者防其有伏但看身熱口渴俱止精神爽快便調能食更無他若者是眞疎也然旣識其候何以解之夫諸瘡皆屬於心心之華

在面。故初發熱。如青筋現露。目中淚出。此毒發於肝。夫肝木生心火。是從後來者。故爲實邪。肝爲水泡。風火相扇。必作搔癢。其治宜夫解脾之毒。如面赤如錦。譫妄多驚。額上紅筋現露者。此毒發於心。夫心火自旺。是爲正邪。君主不明。多有陷伏不治。如口乾唇焦。面黃而燥者。此毒發於脾。夫心火生脾土。是從前來。故爲虛邪。脾爲癰。心爲疹。故必夾癰夾疹。兼脾主肌肉。爲火所灼。又必潰爛。治宜先解心脾之毒。如面色眊白。鼻中乾燥。或清涕或衄出者。此毒發於肺。夫心火刑肺金。是乘其所勝。故爲微邪。治宜解肺金之毒。如而色黑氣。而如烟浮。目中見鬼頭。熱足冷者。此毒

發於腎。夫腎水尅心火。故爲賊邪。必成黑陷不治矣。

書曰瘡疹發熱。熱氣微者。其毒必少。痘出自疎。易發易靨。熱氣甚者。其毒必多。痘出自密。難發難靨。且多他變。然有熱微而痘出反密者。其人則必口燥渴。唇焦裂。小便赤大便秘。是毒深而熱亦深。故表不大熱。而裡熱甚也。或有熱甚而痘出反疎者。其人則必口不渴。唇色潤。二便調。是身雖大熱。毒淺而熱亦淺。此表熱而裡氣和也。若至遍身如火。晝夜不休。此是心火尤甚。脾土益燥。乃尖其常。又見口渴。目赤唇焦。二便不利。煩躁咽痛。則尤其是表裡俱熱之症矣。寧可不投以黃連解毒湯之類。消散於六日之前。否則

熱壅不清。後變壞症。若外雖大熱。但面青而睛不黃赤。大便不秘。小便清者。此裡無蘊熱。不特黃連宜禁。卽生地丹皮升麻芩草亦不可多與。有傷陽氣。以致寒中。譬諸草木。必賴冬月潛藏。而陽春一轉。萌芽自生。但陽氣不可過於亢甚耳。

夫初熱之際。時時惡寒。其身振振搖動。如瘡之狀者。其人衛氣必虛。榮血亦弱。不能逼毒快出。乃使毒邪留連於經絡之中。欲出不出。與正相爭。邪火外射。乃化爲寒振振者。火之象也。不可誤作寒戰。妄投辛熱。以致誤人。然痘瘡必不免於熱者。蓋毒邪在裡。煎熬氣血。熏蒸臟腑。而然若旣

現形則毒洩而熱解矣。故凡瘡出而熱即退者必疎。瘡出而熱尚甚者必密。然亦有身熱白始至終而不退者。是多得於毒氣太盛。始未宜兼清解。若內症不退者。當看大小便如何以治之。如雖熱而精神不減。飲食二便如常。痘瘡依期起。灌順美者。此又性稟偏陽所致。亦當順其自然。但調其氣血。節其飲食。痘既收功而熱自退。勿過求全。反致有損。所以有火裡苗一種之痘。卽此是也。

米厚三尺。非一日之寒。痘瘡蘊熱。非一日之熱。其所受最深也。然痘之發藏於內者。有各臟所屬之不同。彰於外者。有時日形症之自異。何以言之。假如連二三日而在寅卯。

辰時潮熱呵欠頓悶者。是肝旺寅卯潮熱者毒乃運動也。預知其必多水泡。其瘡之色青而小也。如連三日而在巳午未時潮熱時作驚悸者。是心旺巳午預知其瘡有斑。其色赤而小也。如連在申酉戌時潮熱面赤咳嗽嘔噎者。是肺旺在申酉預知其必有膿泡。其瘡色微白而大也。如連在亥子丑時乍發乍涼手足冷而多睡者。是脾氣旺動所發爲疹。其瘡色黃赤也。惟腎在腑下不受穢氣。惟內虛歸腎變黑者。屬腎症而難治。然有今日潮熱在於申酉來日在於寅卯者。是必膿水二疱相雜而出。其餘可做類推。更有熱勢相同其出則有遲速輕重之別者。此表熱裡熱深。

淺之有不同也。須於初熱之時，以手按顙門之下。如輕按暑熱，重按久而反不熱者，則必由遲。如初輕按暑熱，重按久而大熱者，則必出速。再看眼中神光，清如秋水，洞澈到底，黑白分明，則必出輕。若瞳人暗晦，則必出重也。

論氣虛血熱熱毒壅遏症治法三則

凡氣虛之症初發，必身重，手足厥冷，乍熱乍涼，精神倦怠，肌肉眈白，飲食減少，四肢困倦，睡臥安靜，便清自調，是屬虛症無疑。其治法於未見點前，用參耆飲加輕劑發散。如紫蘇防風之屬，見點之後，亦用參耆飲加輕劑升托。如用芎桔梗之類，見點四日之後，則重用參耆，隨病加減處治。

七八日漿足之後。則用保嬰百補湯調養氣血而已。如至
塌陷黑靨者。則多用木香異攻散以收功。若夫血熱之症
初發。則必身熱壯盛。腮紅臉赤。毛焦色枯。煩燥渴欲飲水。
日夜啼哭。睡臥不寧。好睡冷處。小便赤澀。是屬熱症無疑。
其治法於未出之前。升麻葛根湯。或升麻流氣飲。雖皆可
服。總不若十神解毒湯爲穩。及至見點三四日後。熱勢悉
平。勢將行漿。則用太乙保和湯加減。至八九日漿足之後。
則有保嬰百補湯調養之。若至七八日間。或爲紫黑乾枯
及青灰乾黑陷者。則有奪命百祥猪尾等方。皆可審用。惟
經泄瀉之後。有黑陷乾紅者。則從木香異攻散以救之。若

夫熱毒擁遏之症初發則必身熱壯盛腮紅臉赤皮燥毛焦氣粗喘滿腹脹煩燥狂言譫語睡臥不寧大便秘結小便赤澀面浮眼殷多啼多怒是屬熱毒壅遏之症無疑其治之法如未見點時先服升麻葛根湯一服隨服羌活散湯湯時至況點三日之後諸症悉平勢將行漿不過照前調治血勢之法而已。

論血熱痘症禁忌

血熱痘症初發身體如烙而熱毒彌盛則毒氣無所分消治宜重用升提發散使毒以達表而從外解引以滲泄疏利使熱得以潤下而從內消佐以清涼解毒行血涼血之

劑則痘雖稠密亦能消散。白易火而易化也。所謂輕其表而涼其內。平其實而清其熱。故痘有安表和中解毒三者。如初發熱及見點之際。毒氣壯盛。或外爲風寒所抑。或肌肉粗厚。腠理堅閉。肌竅不通。經絡阻塞。使清氣不得引毒達表。循竅而出。則熱毒擁遏於內。爲腹脹爲喘急爲秘結。爲狂煩爲驚搐爲失血。皮燥毛直。喘急眼脹。睡臥不寧。驚啼多哭。此皆熱毒擁遏之症。辨認不差。竝卽以羌活散鬱湯投之。蓋用芎羌活白芷防風。有升提發散之力。桔梗有開提勻氣之能。荆芥連翹鼠粘。善解鬱熱。地骨皮消擁熱。於筋骨之間。且能肅清臟腑。紫草滑肌通竅。大腹皮引熱。