

天津市药品标准

1982年版

天津市卫生局

天 津 市

药 品 标 准



1 9 8 2 年 版

天 津 市 卫 生 局 编

天津市药品标准 (1982年版) 正误表 (续)

页	行	误	正	页	行	误	正
4	10	应为7.0~9.0	应为4.0~7.0	230	2	在氯仿中微溶	在氯仿中极微溶解
6	倒6	肝浸膏粉	肝浸膏				
16	倒9	均应符合规定。	均应符合规定。 特性粘数应为 10.6~16.0	240	倒12	本品为棕色液体	本品为棕色澄明液体
40	16	在326±2nm	在236±2nm	263	6	加甲酸15ml	加甲酸1.5ml
49	9	用氯仿提取4次	加水10ml, 用氯仿提取4次	263	6~7	再加醋酸汞试液25ml	再加醋酸汞试液5ml
54	倒2	2ml:125mg	2g:125mg	263	7	加α-萘酚的苯甲醇指示液…	加α-萘酚苯甲醇指示液……
60		$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{OCOCH}_2\text{CH}_3 \\ \\ \text{C}=\text{O} \\ \\ \text{---} \text{OCOCH}_2\text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{OCOCH}_2\text{CH}_3 \\ \\ \text{C}=\text{O} \\ \\ \text{---} \text{OCOCH}_2\text{CH}_3 \\ \\ \text{---} \text{CH}_3 \end{array}$	263	倒4	自“加甲酸15ml起”	自加“甲酸1.5ml”起
60	倒9	加N/500碘液	加N/50碘液	276	倒4	各加巴比妥缓冲液(巴比妥15g……)	各加巴比妥钠缓冲液(巴比妥钠15g……)
63	倒3	3.45mg的Cl	3.545mg的Cl	282	1	0.75ml	1.5ml
64	倒5	2.5 μg	25 μg	286	1	10分钟内	10秒钟内
107	倒8	(补脑干糖浆正文后遗漏)	钼酸铵试液的配制: 取钼酸铵10g, 加水至100ml溶解后, 徐徐加入硫酸150ml与水100ml的冷混合液中, 即得。	286	倒4	不显颜色	至不显颜色
		(补脑干糖浆正文后)		286	倒14	每次加入后均摇匀, 加稀盐酸1ml,	每次加入后均摇匀, 在约40°放置10分钟, 置冰浴中冷却2分钟, 加稀盐酸2ml,
108	倒7	本品20ml	本品2ml	286	倒17	本品在水中溶解, 在乙醚中不溶,	本品在水中溶解, 在乙醇中极微溶解, 在乙醚中不溶,
141	倒10	pH值应为3.5~5.0	pH值应为5.5~7.0	316	倒2	水中溶解物及蛋白质	水中溶解度及蛋白质
143	5	49.5mg	495mg	317	倒6	$\dots \times \frac{25}{15 \times 1000} \times$	$\dots \times \frac{25}{10 \times 1000} \times$
145	6	6.43g	64.3g	318	倒7	加N/1盐酸……	加6N盐酸……
155	5	70.0%以上	80.0%以上。	331	倒5	取4-硝基苯胺50mg	取4-硝基苯胺0.5g
187	6	扑热息痛10g	扑热息痛100g				
187	倒13	(前勘误表有误) 约相当于扑热息痛0.05g	约相当于扑热息痛0.5g				
187	9	亚硫酸氢钠	焦亚硫酸钠				
215	倒9	±12%	±20%				

天津市药品标准(1982年版)正误表

页	行	误	正	页	行	误	正
7	倒4	本品	本品	140	3	PHENOL PH-	PHENOLPH-
9	倒5	12.5mg	12.5mg			THALEINI	THALEINI
12	倒1	氯化钠	氢氧化钠	142	9	$C_{10}H_{14}O_{13}N_5$	$C_{10}H_{14}O_{13}N_5$
18	4	附录20页	附录37页			P_3Na_2	P_3Na_2
21	5	97.01—03.0%	97.0—103.0%	143	倒17	500的nm波长处	500nm 的波长处
22	倒17	鉴别(1) 取品	鉴别(1)取本品	148	倒15	$\frac{T_1+T_2-S_1-S_2 \times 1}{T_1+S_2-T_1-S_1}$	$\frac{T_1+T_2-S_1-S_2 \times 1}{T_2+S_2-T_1-S_1}$
32	11	加水1μl	加水1ml				
34	倒6	即将	即得				
40	12	亚硝酸钠	亚硝酸钠	156	倒13	$(C_{72}H_{100}N_{18}$	$(C_{72}H_{100}N_{18}$
43	倒5	当相于	相当于			$O_{17}CoP)$	$O_{17}CoP)$
45	5	加橙黄Ⅵ	加橙黄Ⅳ	161	7	标签	标签
47	4	$C_{22}H_{24}O_8N_2 \cdot HCl$	$C_{22}H_{24}O_8N_2 \cdot HCl$	165	16	〔贮藏〕	〔贮藏〕
47	倒9	$C_{22}H_{24}O_8N_2 \cdot H_2O$	$C_{22}H_{24}O_8N_2 \cdot HCl$	172	倒2	量50ml的量瓶中	置50ml的量瓶中
50	18	$C_{21}H_{26}O$	$C_{21}H_{26}O_5$	181	倒11	(每1ml/的N10	(每1ml的N/10
61	1	(95:5:02)	(95:5:0.2)			...)	)
68	4	$C_6H_{13}ON_2Cl$	$C_{16}H_{13}ON_2Cl$	186	倒12	相当于25.49mg	相当于2.549mg
79	结构式			205	倒4	$C_{14}H_{18}O_2N_4$	$C_{11}H_{18}O_3N_4$
80	倒7	$C_{10}H_{11}O_8N_4P$	$C_{10}H_{11}O_8N_4$	208	倒3	15μg	15μg
		Na ₂ 的吸收系数	$PNa_2 \cdot 7\frac{1}{2}H_2O$	209	6	用无水硫酸钠脱	用无水硫酸钠脱
		($E_{1cm}^{1\%}$)为	的吸收系数			水	水
		313.6计算	($E_{1cm}^{1\%}$)为	209	7	全部附吸剂	全部吸附剂
			233.2计算	215	10	置水溶上蒸干	置水浴上蒸干
84	2	高氯酸滴液定	高氯酸液滴定	217	3	FLUORCOR-	FLUDROCOR-
104	倒1	降用压	降压用			TISONI	-TISONI
107	9	用N110硫代硫	用N/10硫代硫	217	倒13	Kulsu...	kuisu.....
		酸钠	酸钠	223	6	Yaoyoug tan	Yaoyong tan
107	倒7	补脑汁	补脑汁	235	4	本品	本品
121	倒1	$C_{17}H_{26}O_3S_2$	$C_{17}H_{26}N_4O_3S_2$	236	3	INDOMETA-	INDOMETH-
123	4	使非西丁与咖啡	使非那西丁与			HACINC	ACINI
		因	咖啡因	240	2	取10其片	取其10片
132	倒13	$\eta_{sp} = \eta_r - 1$	$\eta_{sp} = \eta_r - 1$	250	倒7	(1.32% 枸橼酸	(1.32g 枸橼酸
						钠液与0.48% 枸	钠, 0.48g 枸橼酸
						橼酸液)	加水溶解至 100
							ml)

页	行	误	正	页	行	误	正
275	倒13	90.0—110.0%	90.0—110.0%	索引	右 3	葡萄糖氯化钠注	葡萄糖氯化钠注
276	倒9	加冰醋酸0.1ml	加冰醋酸0.1ml	10		液射	注射液
278	3	在无色火燃中燃烧, 火燃显鲜黄色	在无色火焰中燃烧, 火焰显鲜黄色				
288	倒9	1.5mi	1.5ml				
291	4	密坏菌	密环菌				
293	6	放冷至室湿	放冷至室温				
294	倒2	糠醛2滴	糠醛2滴				
308	17	100—200ug	100—200μg				
321	倒2	qH值	pH值				
331	倒9	pH值为5.0—7.0	pH值为5.0—7.5				
332	12	愈创本酚甘油醚	愈创木酚甘油醚				
333	3	040.4g	醚0.4g				
333	4	醚ml	40ml				
340	倒13	用N/10 硫氰酸铵液滴定, 即得 (每1ml的N/10 硫氰酸铵液相当于……)	用N/10硫氰酸铵液滴定, 并将滴定的结果用空白试验校正, 即得 (每1ml的N/10 硝酸银液相当于……)				
342	倒15	分别置25m	分别置25ml				
345	倒15	上行展开至点处	上行展开至点样处				
351	倒13	单硬脂酸甘油脂	单硬脂酸甘油酯				
354	5	(2%水液液…)	(2%水溶液…)				
364	倒15	$C_5H_4O_6N_6SNa \cdot 2H_2O$	$C_5H_4O_4N_6SNa_2 \cdot 2H_2O$				
365	倒13	32.06mg的S	1.603mg的S				
366	16	精密量取本品2ml	精密量取本品20ml				
索引	左10	葡萄糖氯化钠注射液	葡萄糖氯化钠注射液				
7							

前

言

药品标准是药品质量规格及检验方法的技术规定。制订和颁发药品标准是加强药政管理、保证人民用药安全有效、促进药品生产发展的一项重要措施。

天津市药品标准（1982年版）系根据我市药品生产发展的情况，以天津市药品标准（1974年版）为基础，结合整顿药厂、整顿药品品种，对1981年10月31日以前审批的药品标准进行整理、修订和补充而成。共收载药品370种。这项编订工作由天津市药品检验所负责组织，并得到有关药厂的积极配合。

本版标准由我局发文公布施行，自施行之日起，我市药品的生产、供应、使用、检验和监督管理部门均应按所载各项规定严格执行，使其在提高药品质量、保障人民用药安全有效方面起到积极的作用。

天津市卫生局

凡 例

一、本标准分正文和索引二部分，正文中所收载各药品的先后次序，均按中文名称笔画顺序排列；索引列有中文索引、汉语拼音索引与拉丁文索引。

二、凡属《中华人民共和国药典1977年版》、《中华人民共和国卫生部药品标准1963年版》和《中华人民共和国卫生部抗菌素标准1972年版》已收载而本市又有生产的品种，本标准不再重复收载。但规格不同的也不收载，列名于后，盐酸胃复安注射液、安钠咖注射液、氨茶碱注射液、维生素C注射液、盐酸3-羟酪胺注射液、甲状腺片。

三、中华人民共和国药典1977年版凡例中所列应注意各点（三）至（十七）及附录部分，均适用于本标准。

四、本标准收载的药品，分子量均按1971年国际原子量表计算。

五、本标准内凡属参照其他品种检定方法的药品，若遇某一品种作修订时，未经指名修订的药品，仍按原订参照标准为准。

六、本标准的解释和修订权属天津市卫生局。

目

录

正文

乙胺丁醇片.....	(1)
乙酰水杨酸片(肠溶衣).....	(2)
乙酰肿胺注射液.....	(3)
二羟丙茶碱注射液.....	(4)
人丹.....	(4)
九华膏.....	(6)
力勃隆胶囊.....	(6)
十滴水.....	(7)
十维他片.....	(8)
丁维葡萄糖.....	(9)
小儿止咳糖浆.....	(10)
小儿复方阿斯匹林片.....	(11)
小儿复方苯巴比妥片.....	(12)
小儿咳嗽糖浆.....	(13)
小儿胺.....	(14)
小儿消食片.....	(15)
小分子右旋糖酐葡 萄糖注射液.....	(16)
三硅酸镁片.....	(17)
三磷酸腺苷二钠注射液.....	(17)
山梨醇注射液.....	(18)
大黄酊.....	(19)
大黄碳酸氢钠片.....	(20)
叉癫宁.....	(21)
叉癫宁片.....	(22)
叉癫宁胶囊.....	(23)
马钱子酊.....	(24)
口服蜂乳.....	(24)
六合维生素片.....	(25)
水杨酸软膏.....	(27)
水杨酸毒扁豆碱注射液.....	(27)
双复磷注射液.....	(28)
双酮嗉.....	(29)

双酮嗉片.....	(30)
牙痛水.....	(30)
开塞露.....	(31)
止血敏片.....	(32)
止咳片.....	(32)
止咳祛痰片.....	(33)
乌洛托品片.....	(34)
乌洛托品注射液.....	(35)
风湿松片.....	(35)
风湿松注射液.....	(36)
气喘气雾剂.....	(38)
甲亢平滴丸.....	(39)
甲哌力复霉素.....	(40)
甲哌力复霉素胶囊.....	(41)
甲砒霉素.....	(42)
甲砒霉素胶囊.....	(43)
甲氧咪胍.....	(44)
甲氧咪胍片.....	(45)
生乳药.....	(46)
四环素泼尼松眼膏.....	(47)
去咳片.....	(48)
去咳露干糖浆.....	(48)
去氢可的松.....	(49)
对氨基水杨酸钠片 (肠溶衣).....	(50)
右旋糖酐(小分子).....	(51)
正痛片.....	(52)
卡氮芥注射液.....	(54)
甘油栓.....	(55)
甘氨酸.....	(55)
甘露醇注射液.....	(57)
叶酸注射液.....	(58)
丙谷胺片.....	(59)
丙酸倍氯美松.....	(60)

长压定..... (61)
白凡士林..... (62)
伤风止咳糖浆..... (63)
异搏定..... (64)
异搏定片..... (65)
异搏定注射液..... (66)
安妥碘注射液..... (67)
安定注射液..... (68)
安钠咖片..... (69)
安痛定片..... (70)
安痛定注射液..... (71)
安泰乐注射液..... (72)
安搏律定..... (73)
安搏律定片..... (75)
肌苷..... (76)
肌苷片..... (77)
肌苷注射液..... (78)
5'-肌苷酸钠..... (79)
5'-肌苷酸钠注射液..... (80)
多种钙糖片..... (81)
多维葡萄糖..... (81)
优托品片..... (82)
优托品注射液..... (83)
优降糖..... (84)
优降糖片..... (85)
吐根酊..... (86)
灰黄霉素灭癣液..... (87)
延通心..... (88)
延通心片..... (89)
百咳灵片..... (89)
百喘朋片..... (90)
红汞软膏..... (91)
红细胞保存液..... (91)
红霉素软膏..... (94)
次碳酸铋碳酸氢钠片..... (95)
色甘酸钠粉雾剂胶囊..... (96)
地巴唑片..... (97)
关节止痛膏..... (98)
吗导敏气雾剂..... (99)

肝宁片..... (100)
肝荣片..... (101)
肝炎膏..... (102)
肝泰乐片..... (103)
利血平注射液..... (104)
补血生..... (105)
补脑干糖浆..... (106)
补脑汁..... (107)
远志糖浆..... (109)
抗炎灵片..... (109)
抗感灵片..... (110)
抗蛲灵软膏..... (111)
抗坏血酸钠..... (112)
芳香氨醌..... (113)
芳香蓖麻油..... (114)
苏非咳..... (114)
尿崩灵..... (115)
鸡眼膏..... (117)
呋喃西林..... (118)
呋喃苯胺酸片..... (119)
呋喃硫胺..... (120)
呋喃硫胺片..... (121)
克感敏片..... (122)
克霉唑栓..... (123)
克霉唑软膏..... (124)
含碘喉症片..... (125)
泛酸钙片..... (126)
豆蔻酊..... (127)
男宝..... (127)
吡哌酸..... (129)
吡哌酸片..... (130)
杜仲酊..... (130)
谷氨酸钠..... (131)
低分子羟乙基淀粉代血浆..... (132)
苯巴比妥钠注射液..... (135)
 γ -苯丙氨基甲酸酯..... (136)
L-苯丙氨酸..... (137)
苯甲醇注射液..... (138)
奋乃静注射液..... (139)

（果子露润肠片.....	（140）	（复方土槿皮酊.....	（179）
（果导片.....	（140）	（复方五味子酊.....	（180）
（注射用三磷酸腺苷二钠.....	（141）	（复方甘油磷酸钠注射液.....	（180）
（注射用L-一天门冬酰胺酶.....	（142）	（复方甘草片（含阿片）.....	（182）
（注射用延通心.....	（144）	（复方甘草合剂.....	（182）
（注射用氢化可的.....		（复方叶酸注射液.....	（183）
（松琥珀酸钠.....	（145）	（复方四环素片.....	（184）
（注射用乳糖酸红霉素.....		（复方长效氨茶碱片.....	（185）
（（冷冻干燥品）.....	（146）	（复方扑热息痛注射液.....	（187）
（注射用促皮质素.....	（147）	（复方罗布麻片.....	（188）
（注射用枸橼酸钠.....	（149）	（复方鱼肝油药羔.....	（189）
（注射用盐酸平阳霉素.....	（150）	（复方秋水仙碱注射液.....	（190）
（注射用盐酸呋喃硫胺.....	（153）	（复方降压片.....	（191）
（注射用维生素C.....	（154）	（复方咳必清糖浆.....	（192）
（注射用辅酶A.....	（155）	（复方茶碱片.....	（193）
（注射用腺苷辅酶维生素B ₁₂	（156）	（复方胚宝胶囊.....	（194）
（注射用癌敌.....	（157）	（复方维生素B ₂ 片.....	（196）
（医用羊肠线.....	（159）	（复方益康宁片.....	（197）
（肤净药羔.....	（161）	（复方益康宁注射液.....	（198）
（乳酸生片.....	（162）	（复方维生素B ₁₂ 注射液.....	（200）
（依地酸钙钠注射液.....	（162）	（复方维生素U片.....	（201）
（松节油擦剂.....	（163）	（复方黄体酮注射液.....	（203）
（刺五加片.....	（164）	（复方氯化钠注射液.....	（204）
（单糖浆.....	（164）	（复方硫酸庆大霉素注射液.....	（205）
（垂体后叶注射液.....	（165）	（复方新诺明片.....	（206）
（宝塔糖.....	（165）	（复方碳酸氢钠片.....	（207）
（氢化可的松软膏.....	（166）	（复方醋酸肤轻松软膏.....	（208）
（氢化泼尼松.....	（167）	（复合维生素B注射液.....	（209）
（氢化泼尼松片.....	（169）	（食母生片.....	（211）
（氢化泼尼松注射液.....	（170）	（咳必清糖浆.....	（212）
（氢化泼尼松磷酸钠.....	（171）	（度米芬喉片.....	（213）
（氢化泼尼松磷酸钠注射液.....	（172）	（保赤一粒金.....	（213）
（氢氧化铝片.....	（173）	（脉通.....	（214）
（冠心舒.....	（174）	（胆影钠注射液.....	（215）
（冠心舒片.....	（175）	（氟氢可的松皮炎羔.....	（217）
（胃友新片.....	（176）	（氟奋乃静癸酸酯注射液.....	（217）
（胃复康片.....	（177）	（L-亮氨酸.....	（218）
（胃蛋白酶片.....	（178）	（重酒石酸胆碱.....	（220）
（胃得宁.....	（178）	（胖得生.....	（221）

胎盘片.....	(221)	盐酸黄连素软膏.....	(256)
毒毛旋花子甙K注射液.....	(222)	L-盐酸赖氨酸.....	(257)
药用炭片.....	(223)	盐酸麻黄碱滴鼻液.....	(258)
烫伤药膏.....	(223)	盐酸羟基钴胺.....	(259)
氧化镁碳酸氢钠片.....	(224)	盐酸羟基钴胺注射液.....	(261)
脑宁片.....	(225)	盐酸精氨酸.....	(262)
脑益嗪.....	(226)	盐酸精氨酸注射液.....	(263)
脑益嗪片.....	(228)	烟酸肌醇酯.....	(264)
脑益嗪胶囊.....	(228)	烟酸肌醇酯片.....	(265)
桂皮酊.....	(229)	益康宁片.....	(266)
倍他美松.....	(229)	益康宁注射液.....	(267)
倍他美松片.....	(231)	调经益灵丹.....	(268)
倍他美松混悬注射液.....	(232)	羟乙基淀粉代血浆.....	(269)
氨制八角茴香酊.....	(233)	γ -羟基丁酸钠注射液.....	(272)
γ -氨基酪酸片.....	(233)	脚气灵.....	(273)
消炎药膏.....	(234)	维生素B ₄	(274)
消炎眼药水.....	(235)	维生素B ₄ 片.....	(275)
消炎痛片.....	(236)	维生素B ₆ 软膏.....	(276)
消炎痛片(肠溶衣).....	(236)	维生素D ₂ 片.....	(277)
消炎痛栓.....	(237)	维生素K ₃ 片.....	(277)
消炎嗽口片.....	(238)	维生素K ₃ 注射液.....	(278)
消炎镇痛膏.....	(239)	维生素U.....	(279)
消咳喘.....	(240)	维他钙片.....	(280)
消痛宁注射液.....	(240)	维体舒片.....	(281)
烧烫宁油膏.....	(242)	康肤药膏.....	(282)
莨菪浸膏片.....	(242)	痔疮药膏.....	(283)
核黄素-5'-磷酸酯钠.....	(243)	脱脂纱布.....	(284)
核酪注射液.....	(245)	脱脂绷带.....	(285)
桑椹蜜.....	(246)	脱脂棉.....	(285)
盐酸山莨菪碱注射液.....	(247)	DL-蛋氨酸.....	(286)
盐酸吗啉双胍.....	(248)	L-蛋氨酸.....	(287)
盐酸吗啉双胍片.....	(249)	探亲避孕丸.....	(289)
盐酸吗啉双胍注射液.....	(250)	眼明注射液.....	(290)
盐酸吗啉双胍眼药水.....	(251)	密环片.....	(291)
盐酸呋喃硫胺.....	(252)	淀粉酶.....	(291)
(粉针用原料).....	(252)	裂伤药膏.....	(292)
盐酸依米丁注射液.....	(254)	氯化钙葡萄糖注射液.....	(293)
盐酸苯海拉明注射液.....	(255)	氯化氨甲酰胆碱注射液.....	(294)
盐酸溴己胺注射液.....	(255)	氯化钠注射液.....	(295)

氯化钾片.....	(296)
氯霉素注射液.....	(297)
氯磷定注射液.....	(298)
烧虫药膏.....	(299)
喘咳宁片.....	(299)
喘静片.....	(300)
痤疮乳膏.....	(301)
舒筋灵.....	(302)
舒筋灵片.....	(303)
舒筋灵注射液.....	(304)
舒筋灵胶囊.....	(305)
舒喘灵.....	(306)
舒喘灵气雾剂.....	(307)
强筋松片.....	(308)
普鲁卡因肾上腺素注射液.....	(309)
硝苯吡啶.....	(310)
硝苯吡啶片.....	(311)
硝酸毛果芸香碱注射液.....	(312)
葡萄糖注射液.....	(313)
葡萄糖醛酸注射液.....	(314)
葡萄糖氯化钠注射液.....	(315)
硫桐脂软膏.....	(316)
硫酸软骨素.....	(316)
硫酸软骨素片.....	(318)
硫酸舒喘灵.....	(319)
硫酸舒喘灵片.....	(320)
硫酸舒喘灵注射液.....	(321)
硫酸氢黄连素.....	(322)
硫酸镁葡萄糖注射液.....	(323)
硫糖铝片.....	(324)
蛔虫丹.....	(325)
蜂王精.....	(327)
腺苷辅酶维生素 B ₁₂	(327)
催奶片.....	(329)
催乳片.....	(330)
愈创木酚甘油醚.....	(331)
愈咳片.....	(332)
解热止痛散.....	(333)
新婴儿胺.....	(335)

酰胺松眼膏.....	(336)
碘化钾片.....	(337)
滴耳油.....	(338)
滴鼻净.....	(338)
鼻通药膏.....	(339)
睾丸片.....	(341)
镇风湿片.....	(341)
镇咳宁.....	(343)
醋酸可的松眼膏.....	(343)
醋酸去炎松.....	(344)
醋酸去炎松混悬注射液.....	(346)
醋酸去炎松软膏.....	(347)
醋酸地塞米松皮炎膏.....	(348)
醋酸地塞米松混悬注射液.....	(349)
醋酸氢化可的松.....	(350)
醋酸泼尼松软膏.....	(351)
醋酸氟氢可的松软膏.....	(352)
L-缬氨酸.....	(353)
缬草酊.....	(355)
樟脑软膏.....	(355)
樟脑酊.....	(355)
樟脑搽剂.....	(356)
潘生丁.....	(357)
潘生丁片.....	(359)
潘生丁注射液.....	(359)
鲨肝醇片.....	(360)
避孕栓.....	(361)
磺胺二甲基嘧啶钠注射液.....	(362)
橙皮酊.....	(363)
橙皮糖浆.....	(363)
癌敌.....	(364)
癣药水.....	(366)
癣药膏.....	(366)
癣敌.....	(367)
麝香回阳膏.....	(368)

索引

中文索引.....	(索引 2)
汉语拼音索引.....	(索引 12)
拉丁索引.....	(索引 18)

乙胺丁醇片

Yiandingchun P

TABELLAE ETHAMBUTOLI

本品含盐酸乙胺丁醇 ($C_{10}H_{24}O_2N_2 \cdot 2HCl$) 应为标示量的95.0—105.0%。

【性状】 本品为白色片。

【鉴别】 (1) 取本品细粉适量 (约相当于盐酸乙胺丁醇0.1g)，加水10ml，振摇，滤过，滤液中加硫酸铜试液2~3滴，摇匀，加N/1氢氧化钠液2~3滴，呈兰色。

(2) 本品的水溶液显氯化物的鉴别反应 (中国药典1977年版二部附录36页)。

【检查】 2-氨基丁醇 取本品的细粉适量，加甲醇制成每1ml中含盐酸乙胺丁醇50mg的溶液，滤过，做为供试品溶液。精密称取2-氨基丁醇，加甲醇制成每1ml中含0.5mg的溶液，作为对照溶液。照薄层层析法 (中国药典1977年版二部附录29页) 试验，吸取上述两溶液各2 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以醋酸乙酯—冰醋酸—盐酸—水 (11:7:1:1) 为展开剂。展开后，晾干，在105°烘5分钟，放冷，喷以镉—茚三酮溶液 (取醋酸镉50mg溶于水5ml与冰醋酸1ml的混合液中，加丁酮使成50ml，使用前溶解适量茚三酮使成0.2%溶液) 喷雾显色后，在105°烘30分钟，样品所显紫红色斑点不得比对照品更深。

其他 应符合中国药典1977年版二部附录1页片剂项下有关的各项规定。

【含量测定】 取本品10片，精密称定，研细，精密称出适量 (约相当于盐酸乙胺丁醇0.1g)，加冰醋酸20ml微热使溶解，放冷，加醋酐5ml、醋酸汞试液5ml与结晶紫指示液1滴，用N/10高氯酸液滴定至溶液显兰色，并将滴定的结果用空白试验校正，即得 (每1ml的N/10高氯酸液相当于13.86mg的 $C_{10}H_{24}O_2N_2 \cdot 2HCl$)。

【作用与用途】 抗结核病药。用于对其他抗结核病药产生耐药或不能耐受的结核菌感染。

【用法与用量】 口服 一日0.75~1.0g 一日1~2次。

【注意】 (1) 必须与其它抗结核病药 (如利福平、链霉素、异烟肼等) 合并使用，但剂量不宜过大，服药时间不宜过长，肾功能减退者，宜减少剂量。

(2) 服药期间注意观察白细胞和视力的变化。

(3) 孕妇及幼儿在医生指导下使用。

【规格】 0.25g

【贮藏】 置遮光容器内，密闭，干燥处保存。

乙酰水杨酸片 (肠溶片)

Yixianshuiyangsuan Pian

TABELLAE ACIDI ACETYLSALICYLICI

本品含乙酰水杨酸 ($C_9H_8O_4$) 应为标示量的95.0~105.0%。

【性状】 本品为肠溶片，除去肠溶衣后，显白色。

【鉴别】 (1) 取本品除去肠溶衣后，研细，称出适量 (约相当于乙酰水杨酸0.1g)，加水10ml，煮沸，放冷，加三氯化铁试液1滴，即显紫堇色。

(2) 取本品除去肠溶衣后，研细，称出适量 (约相当于乙酰水杨酸0.5g)，加碳酸钠试液10ml，振摇后，放置5分钟，滤过，滤液煮沸2分钟，放冷，加过量的稀硫酸，即发生白色沉淀，并发生醋酸的臭气。

【检查】 游离水杨酸 取本品除去肠溶衣后，研细，称出适量 (约相当于乙酰水杨酸0.1g)，加无水氯仿3ml，不断搅拌2分钟，立即用无水氯仿湿润的滤纸滤过，残渣用无水氯仿2ml、2ml、1ml洗涤三次 (滤过及洗涤操作应在10分钟内完成)，合并滤液与洗液，用吹风机冷风在20分钟内吹干，残渣立即以无水乙醇4ml溶解，加5%乙醇使成100ml，摇匀，分取溶液50ml，立即加新制的稀硫酸铁铵溶液 (取硫酸铁铵指示液2ml，加N/1盐酸液1ml，加水至100ml，摇匀，即得) 1ml，30秒钟内如显色，与对照液 (精密称取水杨酸0.1g，加水溶解后，加冰醋酸1ml，混匀，再加水使成1000ml，摇匀，精密量取2ml，加无水乙醇2ml，加5%乙醇使成50ml，再加上上述新制的稀硫酸铁铵溶液1ml制成) 比较，不得更深。

其他 应符合中国药典1977年版二部附录1页片剂项下有关的各项规定。

【含量测定】 取本品10片，小心除去肠溶衣后，精密称定，研细，精密称出适量 (约相当于乙酰水杨酸0.3g)，置锥形瓶中，加中性乙醇 (对酚酞指示液显中性) 20ml与酚酞指示液3滴，滴加N/10氢氧化钠液至溶液显粉红色，再精密加N/10氢氧化钠液40ml，置水浴上加热15分钟并时时振摇，迅速放冷至室温，用N/10硫酸液滴定，并将滴定的结果用空白试验校正，即得 (每1ml的N/10氢氧化钠液相当于18.02mg的 $C_9H_8O_4$)。

【作用与用途】 解热、镇痛、抗风湿药。用于发热、头痛、神经痛、牙痛、月经痛、肌肉痛、活动性风湿病及类风湿性关节炎等。

【用法与用量】 解热镇痛 一次0.3~0.6g 一日0.9~1.8g

抗风湿 一次0.6~1g 一日3~4g

【规格】 0.3g

【贮藏】 密封，在干燥处保存。

乙酰肿胺注射液

〔剧〕

Yixishenan Zhusheye

INJECTIO ACETARSONI

本品为乙酰肿胺的灭菌水溶液。含乙酰肿胺 ($C_8H_{10}O_5NAs$) 应为标示量的93.0—107.0%。

本品中可加氢氧化钠作助溶剂和加适量的无水亚硫酸钠与乙二胺四醋酸二钠为稳定剂。

【性状】 本品为无色或淡黄色的澄明液体。

【鉴别】 (1) 取本品1ml，加氢氧化钠试液5ml，加乙醇2—3滴与硫酸2ml，加热，即发生醋酸乙酯的香气。

(2) 取本品1ml，加氢氧化钠试液5ml，再加水5ml与连二亚硫酸钠1g，置水浴上加热20分钟，即发生黄色沉淀，倾去上层液体，沉淀能在过量的氢氧化钠试液中溶解。

【检查】 pH值 应为5.5—7.0 (中国药典1977年版二部附录37页)。

其他 应符合中国药典1977年版二部附录3页注射剂项下有关的各项规定。

【含量测定】 精密量取本品适量 (约相当于乙酰肿胺0.2g)，置凯氏烧瓶中，加硫酸25ml与无水硫酸钠12g，用小火加热，至溶液炭化并发生白色的浓烟后，稍微加大火力，加热至溶液成无色澄明，放冷，注意缓缓加入等容的水稀释，加甲基橙指示液2滴，保持70—80°的温度，用N/10溴酸钾液滴定，至近终点时，再注意缓缓滴定，至红色恰消失，并将滴定的结果用空白试验校正，即得 (每1ml的N/10溴酸钾液相当于13.75mg的 $C_8H_{10}O_5NAs$)。

【作用与用途】 抗肿瘤药。对某些肿瘤有缓解症状和延长生命的作用。用于食道癌、宫颈癌、胃癌和肺癌等。

【用法与用量】 常用量 皮下、肌肉或静脉注射 一日1次0.1—0.2g
极量 0.5g

连续注射5—10日，然后停药3—5日为一疗程。或遵医嘱。

【注意】 (1) 肝、肾、脑癌或久病体弱等患者宜慎用。

(2) 如发生高热、皮疹、浮肿、剧痛或脱落性皮炎，应暂停使用。

(3) 如有中毒现象，可用50%葡萄糖注射液、二巯基丙醇及硫代硫酸钠注射液进行解救。

【规格】 (1) 1ml: 0.1g (2) 2ml: 0.2g (3) 5ml: 0.5g

【贮藏】 遮光，密闭保存。

二羟丙茶碱注射液 (喘定注射液)

Erqiangbing Chajian Zhusheye

INJECTIO DIPROPHYLLINI

本品为二羟丙茶碱的灭菌水溶液。含二羟丙茶碱 ($C_{10}H_{14}O_4N_4$) 应为标示量的 95.0~105.0%。

【性状】 本品为无色的澄明液体。

【鉴别】 (1) 取本品 2 ml, 加鞣酸试液数滴, 即发生白色沉淀。

(2) 取本品 2 ml, 加盐酸 1 ml 与氯酸钾 0.1g, 置水浴上蒸干, 残渣遇氨气即显紫色, 再加氢氧化钠试液数滴, 紫色即消失。

【检查】 pH 值 应为 7.0~9.0 (中国药典 1977 年版二部附录 37 页)。

其他 应符合中国药典 1977 年版二部附录 3 页注射剂项下有关的各项规定。

【含量测定】 精密量取本品适量 (约相当于二羟丙茶碱 0.25g), 置锥形瓶中, 置水浴上蒸干, 在 105° 干燥后, 精密加新制的醋酐与吡啶混合液 (精密量取醋酐 2 ml, 置 50ml 的量瓶中, 用吡啶稀释至刻度制成) 8 ml, 附回流冷凝器, 置水浴上回流 1 小时, 放冷, 用水 30ml 洗涤冷凝器, 洗液并入锥形瓶中, 加酚酞指示液 3 滴, 用 N/10 氢氧化钠液滴定, 并将滴定的结果用空白试验校正, 即得 (每 1 ml 的 N/10 氢氧化钠液相当于 12.71 mg 的 $C_{10}H_{14}O_4N_4$)。

【作用与用途】 支气管与血管扩张药, 也有利尿作用。主用于支气管哮喘, 也用于心绞痛及心脏性水肿的治疗。

【用法与用量】 肌肉注射 一次 0.25g, 可用等量的盐酸普鲁卡因注射液稀释。

【规格】 2 ml: 0.25g

【贮藏】 密闭, 避光保存。

人 丹

Rendan

PILULAE RENDAN

本品含挥发油不得少于 5.0%。

【处方】

儿茶

6.0g

桂皮 (肉桂)

4.0g

冰片	3.0g
干姜	2.5g
薄荷脑	4.0g
豆蔻	2.5g
丁香	3.0g
小茴香	1.5g
越雋木香	1.5g
白胡椒	1.5g
苯甲酸钠	0.1g
黄胶粉	5g
甘草粉	61.4g
朱砂	1.3g
食用香料	0.5g
桃胶	0.5g
滑石粉	2.0g
水	适量
全量	100g (约3850粒)

【性状】 本品为棕红色、光亮的朱砂衣丸。

【检查】 丸重差异 取本品5份，每份100粒，分别称定重量，与规定重量（2.6g）差异不得超过 $\pm 4\%$ 。

水分 照中国药典1977年版二部附录41页水分测定法项下的甲苯法测定，含水分不得过8.0%。

灰分 不得过8.0%（中国药典1977年版一部附录15页）。

酸中不溶性灰分 不得过3.0%（中国药典1977年版一部附录16页）。

【含量测定】 照中国药典1977年版一部附录16页挥发油测定法项下甲法测定，即得。

【作用与用途】 清凉祛暑药，用于头昏眩晕、晕车、晕船、消化不良及由于气候闷热引起的不适。

【用法与用量】 需要时服4—8粒，吞服或含服。

【贮藏】 置密闭容器内，在干燥凉暗处保存。

注： 处方中如豆蔻短缺，可改用草蔻3.5g代替。