

下

木香丸 治證同前

乳香

沒藥

全蝎 各半

釣藤

舶上蘂香

木香 各一

右先將乳香沒藥另研次入諸藥末和畢取大蒜

少許研細和丸桐子大每服二九釣藤湯下

張渙嬰兒眠卧著忽啼哭驚覺面赤口舌乾狀若神

祟即非夜啼乃風熱邪氣乘於心臟名曰驚啼宜用

牛黃膏方 常服除胎熱

牛黃

奸牡蠣 股粉各一分

人參

甘草

炙各半兩

已上並為細末次入

辰砂

雄黃

各一分並細研水飛

龍腦半斤

右件諸藥一處研細勻煉蜜和成膏如鷄頭實大每服半粒至一丸薄荷湯化下乳食後

青雲散

石蓮心一分

天南星炮

殭蠶

取直者

全蝎

鬱金

皂角煮各一分半

雄黃一分

粉霜

半斤

右件為末每服一字半錢看大小蜜湯調下

聖惠犀角散

治小兒驚啼

犀角屑

鈎藤

升麻

黃芩

甘草

炙各一分人參三分

右咬咀每服一錢水一盞煎至五分量見服之

羚羊角散

羚羊角屑

黃芩

犀角屑

甘草

茯神

炙各一分

麥門冬

半兩

右件藥搗羅為散每服一匙以水一小盞煎至五分去滓量見大小分減服之

龍齒散 治小兒驚啼煩熱眠卧不安

龍齒

麥門冬

各半兩

白芍藥

川升麻

川大黃炒

甘草炙各一分

右件藥咬咀每服一朶以水一小盞煎至五分去

粗溫溫服量小兒大小加減服之

亦治軀啼

栝子仁散 治小兒驚啼狀如物刺

栝子仁

一兩持細羅為散

右件藥一二歲兒每服一字用粥飲調服三四歲

兒每服半朶一日三四服量兒大不加減

治小兒五邪驚啼悲傷鯁鯉甲燒之作灰以酒或水

和服方寸匕

出本草

仙人水鑑見生下多驚啼声噎庸醫誤是氣急此誤

煎至四分去粗

嬰孺黃芪散

治月花陰乾搗散入馬牙黃連四分

黃芪

神方力莫加

乾薑

各四分

一字至一錢服之立効

右爲末二十日忽驚啼不識母母喚之搖頭方

一五十日兒一不識母者是夢中見母棄之去謂

毒若無黃芪可令人抱坐于暗中令母從外把大

不吐服之甚佳止所以然者謂母去還來也此方

水煮飲之如肥居効方

節度無苦

於頤門上寫泥丸二字於丹田上

劉氏治胎氣弱陰

在胎時其母將養傷於風冷邪氣

好乳香

水中

見生之後邪猶在兒腹內邪動與

木香

故兒軀張感氣而啼

右先將後三味

乾啼後軀方見腹滿

成劑收之每一

時其母將養一切不如法及取涼

煎釣藤湯化下

入兒腸胃使胎氣不強致生下羸

魏香散

啼名曰軀啼宜用養臟湯方

蓬莪茂

半兩

沉香

丁香

右先用溫水化

桂心

川芎

各半兩

末每服半錢前

末每服一錢水八分入生薑二片

人命宜使此方

溫時時滴見口中

收取黃葵四

小胎寒腹痛癰啼

加黃檗四味

當歸

芎藭

右以冷水調下

甘草三分

黃芩陸分

嬰孺治小兒夜睡兒用乳汁和一胡豆大一日三夜

右小兒忽驚啼小豆大百日二小豆大藥溫中無

母實故啼去但餵也見生便服使寒氣不得生亦

火入來喚之即止服妙若寒氣疔痛啼不可忍以

天下未之知隱理中丸法服藥補益之可數十倍

一法寫天心二字

巢氏云小兒陽不調晝夜嘔啼不已

入胞傷見臟腑故

坐乳鉢細研

沒藥

細研

止氣相搏則腹痛

薑黃

各四

木鼈子

二拾箇去殼

釣藤膏

治小兒

同為細末次研人上二味煉蜜和

張渙嬰兒在胎之

歲兒可服半皂子大餘以意加減

飲冷過度冷氣

無時次用魏香散

弱多病俛仰多

川當歸

一兩

濕紙裹煨

真阿魏

一兩

白朮

阿魏浸逢莪茂一晝夜切焙乾為

石件搗羅為細

紫蘇米飲空心調下嘔啼稍愈服

開胃丸

開胃丸

白朮

木香

蓬莪朮

人參

當歸

各半兩

白芍藥

一分

右爲細末湯浸煑餅爲丸如黍米大每服五七丸
空心食前煎麝香湯下

白朮當歸煎丸

治胎寒腹痛遇夜啼叫身體軀張

膚

有如癰狀吐衄不止大便酸臭乳食雖多不生肌

白朮

當歸

大木香

右等分爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服一九煎
木香湯化下

六神散 治腹痛啼哭而青口中冷氣四肢亦冷曲
腰而啼或大便泄瀉及不吮乳

人參

山藥

白朮 各半兩

甘草 二錢

茯苓

扁豆 炒各一兩

右爲末每服二錢薑二片聚一枚煎服一方用當
歸白芍藥人參各二錢半甘草桔梗陳皮各一錢
爲散每服二錢水煎時服

夜啼三因小兒夜啼有四證一曰寒二曰熱三曰重

舌口瘡四曰客忤寒則腹痛而啼而青白口有冷氣
腹亦冷曲腰而啼此寒證也熱則心躁而啼面赤小
便赤口中熱腹煖啼時或有汗仰身而啼此熱也若
重舌口瘡要吮乳不得口到乳上卽啼身額皆微熱
急取燈照口若無瘡舌必重也客忤者見生人氣忤
犯而啼也各隨證治之

曾夜啼者有驚熱夜啼有心熱夜啼有寒疝夜啼有
誤觸神祇夜啼此四者詳具于後驚熱者爲衣衾
太厚或抱于極暖處久坐致生煩悶邪熱攻心心主
神神亂則驚心與小腸爲表裏故啼泣而遺溺者是

也治法退熱鎮心則自安矣用百解散驚急牛勞湯咽

三解散

熱潮

主之

心熱者見燈愈啼面紅多淚無燈

則稍息蓋火者陽物也心熱遇火兩陽相搏才有燈

而啼甚故經曰火疾風生乃能雨此其義也宜涼心

安神用百解散或五苓散俱加黃芩甘草水煎服次

牛勞湯

咽

三解散

熱潮

及琥珀抱龍丸

驚

爲治

有遇

黃昏後至更盡時哭多睡少有啼聲不已直到天明

乃胎中受寒遇夜則陰勝而陽微故畧曲頷汗眼中

無淚面瑩白而夾青伏卧而啼入盤腸內弔之證名

爲寒疝治法去宿冷溫下焦白芍藥湯疝烏梅散腹

及冲和飲

傷寒

加鹽炒茱萸茴香水薑煎服及釣藤

亦佳

誤觸

神祇者面色紫黑氣鬱如怒呼時若有

恐懼及睡中驚惕兩手抱母大哭不休此誤觸禁忌

神祇而得或因惡祟所侵蓋嬰孩目有所覩口不能

言但驚哭無時指紋俱隱故玉環集云忽然兩手形

無見定知唐突惡神靈治法先解其表宜百解散

驚

次驅邪鎮心用蘇合香丸

客琥珀抱龍丸

驚

投之自

効

演山王氏舉水鏡先生云天蒼蒼地王王小兒

夜啼踈客堂又云啼而不哭是煩哭而不啼是躁無

辜賦云夜多啼而似祟凡初生見日夜煩啼如有祟

或謂熱在心驚藥與疎利或謂寒停臟腑與服溫煖
醫者察而治之乃善也若見啼哭曾堂仰突首反張
喜見燈者心經有熱宜疎利服三黃丸或洗心散加
燈心麥門冬子良若見啼哭頭低身曲眼閉肚緊者
臟腑留寒宜與溫之胃風湯加黃芪煎効若不識證
候但以蟬蛻二七枚全者去大脚為末加朱砂一字
蜜調於吻立効 薛夜啼有二曰脾寒曰心熱也夜
屬陰陰勝則脾臟之寒愈盛脾為至陰喜溫而惡寒
寒則腹中作痛故曲腰而啼其候面青白手腹俱冷
不思乳食是也亦曰胎寒用釣藤散若見燈愈啼者

心熱也心屬火見燈則煩熱内生兩陽相搏故仰身而啼其候而赤手腹俱緩口中氣熱是也用導赤散若面色口黑睛少屬腎氣不足至夜陰虛而啼也宜用六味丸若兼泄瀉不乳脾腎虛弱也用六神散若兼吐瀉少食脾胃虛寒也用六君炮木香大便不化食少腹脹脾氣虛弱也用異功散心血不足者秘旨安神丸木火相搏者柴胡梔子散肝血不足者地黃丸大抵此證或因吐瀉內亡津液或稟賦腎陰不足不能滋養肝木或乳母恚怒肝火侮金當用六君子湯補脾土以生肺金地黃丸壯腎水以滋肝木若乳

母鬱悶而致者用加味歸脾湯乳母暴怒者加味小
柴胡湯乳母心肝熱搏柴胡梔子散仍宜參客忤驚
啼覽之

心鑑治小兒一百二十日內夜啼用蟬蛻四十九箇
去前截用後截爲末分四服釣藤湯調灌之

普濟蟬花散 治小兒夜啼不止狀若鬼祟用蟬蛻
下半截爲末一字薄荷湯入酒少許調下或者不信
將上半截爲末前湯調下卽復啼也古人立方莫知
其妙

寒夜啼錢山論夜啼云脾藏冷而痛也當與溫中