

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三十八



南京中醫藥大學圖書館版權所屬

詳校官太醫院院使_臣張肇基

編修_臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷二

人

明

周王朱橚撰

大腸腑門

臟風下血

治腸毒下血

五倍子不拘

鯽魚

一枚約重四五兩

右以藥置魚腹中入藏瓶

煨微欲煙盡取出為

末酒送下

又方

一名香連散

治臟毒下血久遠不差

百一選方

黃連

木香

各等分

右為末蠟茶同調下

治酒毒下血多至升斗者 廬州郭醫云趙俊臣帥合

肥日其壻司馬機宜患此服四物湯每料加炒焦槐花二兩如常法煎服止久之復作得此方遂效

獭猪肚

一枚洗淨

黃連

四兩去鬚

右以酒醋各二升半文武火煮候乾控出將肚並黃

連研杵極爛九梧桐子大每服五十九米飲調下

治腸風下血

出危氏方

猪臟

一條控乾

槐花

好淨者炒為末

右將槐花填入臟內兩頭線縛好米醋磁器內慢火細煮爛熟切片子砂鉢內研爛九彈子大日乾每服用一九空心食前當歸煎酒下

治便紅如傾水

經驗良方

羊屎子根

生者一片所在有之夏秋生紅花結子如羊屎樣又名為鐵箱草子

右將羊尿子根煮生白酒一斗逐日隨量空心服
至酒盡而可其生葉搗爛能煽合瘡口散血膿未漿
水調用有一客在樟樹鎮胡元八郎家下如廁忽
下血如傾水全行扶策卧牀病不能起店主請醫方
用羊尿子

神應丸

經驗良方

治積年便紅

大黃連

去鬚洗淨稱八兩剉碎如黃豆大分作二分一分用薑四兩搗爛絞取汁浸一宿陰

乾生薑連皮洗淨用最妙

右為末用糕糊丸梧桐子大每服五六十丸空心米

飲下

蒜連丸

出本
事方

治腸風臟毒

黃連

一兩

獨頭蒜

五枚煨
香熟

右將蒜研爛和黃連末丸桐子大每服三十九陳米

飲下

治便血

經驗
良方

黃連

四兩

朴硝

二兩

右同炒地上出火毒研為末如糞前紅先挑藥於磁
盞內用酒調服如糞後紅先盛酒於盞內後挑藥浮
於酒上調服

槐花散

經驗良方

治臟毒酒病便血

槐花

半兩生半兩炒

山梔子

一兩去皮炒

右為末每服二錢新汲水調下食前服

治臟毒寬大腸

經驗良方

枳殼

淨二兩麩炒

郁李仁

一兩溫水浸去皮

右為末煉蜜九梧桐子大或如彈子大細嚼空心溫

酒下

枳殼散

出楊氏家藏方

治腸風下血及治大便急澀

木饅頭

細判焙

枳殼

去白炒各等分

右為末每服二錢空心槐花煎酒下一方無槐花煎

治腸風瀉血

出本草

以野猪肉炙食不過十頓差或將外腎燒灰酒調下亦

得

治下鮮血

出本草

以梔子仁燒灰水和一錢每服量其大小服之

治積年久病腸風下血不止

一名溫腸丸治下血當日止一名綠礬丸出聖惠方

綠礬

四兩入砂鍋內用新瓦蓋覆鐵線扣定鹽泥固

一兩同礬研過入砂鍋內依法封固再煨通紅候冷取出再研細令勻

附子

一兩炮去皮臍別研為末

右以粟粥丸梧桐子大生地黃汁下溫酒米飲下亦

可每服三十丸此是氣血虛寒人服如少壯者用青

蒿調水酒又臟腑虛弱下血用四物湯加防風烏梅

煎服一月病源頓除久服益臟腑

治腸風臟毒方

一兩茱萸半兩連 二味同炒不同研

糞前茱萸調酒下 糞後却用酒調連

究原方

一名烏犀方

治痔疾下血等證

百一選方

淡豉

十枚重研

大蒜

二枚煨剥去皮同搗研

右丸如梧桐子大每服二十九煎香茱萸湯下不拘時服一方鹽湯下遇發時絕早空心用陳米飲先下五

十九午時再服一百丸以病安而止可以永絕病根
一無所忌廬州彭知錄大辯亦云此藥甚妙其方所
用大蒜先蒸九次然後用以和藥仍以冷蘆水送
下病止即輟藥昔朱解元成言兄子雲及陸子揖提
刑皆服之數十年之疾更不復作

猪臟丸

出直
指方

治大小兒大便下血日久多食易饑腹

不痛裏不急名曰野雞痔先用海螵蛸炙黃去皮白
者為末以木賊草煎湯調下服之三日後效

黃連

二兩
判研
嫩猪臟
去肥

右以黃連塞滿猪臟縛兩頭煮十分爛研細添糕糊

九梧桐子大每服三五十九米飲下

鯽魚方

出聖
惠方

治腸風血痔及下痢膿血積年瀉血面色

萎黃

大活鯽魚

一個不去鱗肚下穿
孔去其腸穢入白礬

白礬

一塊如
金橘大

右用敗棕皮重包外用厚紙裹先煨令香熟去紙於

熨斗內燒帶生存性為末每服

錢空心溫米飲調

下一方用瓦瓶內蓋定炭火燒為灰軟飯丸梧桐子
大每服二十九粥飲下

治下血二十年者

地榆 鼠尾草

各二兩

右水二升煮半頓服不斷水漬屋塵飲一小盞投之
不過重作乃愈

二黃丸

出肘後方

治腸風瀉血

黃耆

黃連

等分

右為末麵糊丸菜豆大每服三十九米飲下

治遠年近月腸風下血不止

枳殼

燒灰存性五錢

羊脰炭

為末三錢

右和用濃米飲一盞調下空心服五更初一服如人行五里再服當見效忌油膩毒物等

治腸風入胃下血疼痛不可忍

鬱金

五个大者

牛黃

一皂子大另研

右同為末每服用醋漿水一盞煎三沸溫服

治腸風下血

出肘後方

枳實

半斤麩炒去穰一方作枳殼

黃耆

半斤洗剉

右為末非時下二錢若難服糊丸湯下三五十丸

治便血紅

荊芥

燒存性

百藥煎

等分

右用麩糊丸米湯下又熟煮木耳食之

阿膠丸

聖惠方

治腸風瀉血不時腹內疼痛

阿膠

燥炒

刺蝟皮

炙

當歸

剉

地榆

龍骨

研

訶梨勒

煨去核

黃耆

剉

赤石脂

研各一兩

枳殼

炙炒去穰

惡實

炒各三分

黃

牛角鯁

二兩煨灰

槐實

炒三兩

右為末軟飯丸梧桐子大每服三十九米飲空心食

前服

治被通中內留腹滿

生地黃汁

升一

白芒硝

三兩

右相和火上令熱通口頻服即血便息

治腸風臟毒下血不止