

欽定四庫全書

子部

三因極一病証方論卷十八



南京中医药大学图书馆版权所有

大正西曆一千九百一十一年

三因極一病証方論卷一

勞傷証

因產里下
口瘡
痛
汗
散
體
急

宋 陳言 撰

勞心力致膚羸喘乏寒
嗽痰逆腹中利痛名曰

石三治法

三因極一病証方論

猪腎

一對去脂膜四破

香豉

當歸

白芍

粳米

葱

白

右剉散分兩劑用水三升煮一小碗去滓分三服

脫陰証治

婦人趣產勞力努喚太過致陰下脫若脫肛狀及陰下挺出逼迫腫痛舉重房勞皆能發作清水續續小便淋露

硫黃散

治產後蓐勞陰脫

硫黃 烏賊魚骨各五錢 五味子一分

為末糝患處

當歸散 治陰下脫

當歸 黃芩各二兩 芍藥一兩 蛻皮五錢燒存性 牡蠣二兩半

為末每服二錢酒米湯任下忌登高舉重

熨法

蛇床子 一味炒熟布裏熨患處亦治產後陰痛

桃仁膏 治產後陰痛腫妨悶

桃仁 枯礬 五倍子 各等分以下二味為末

研桃仁膏拌勻敷之

硫黃湯 治產勞玉門開而不閉

硫黃_兩 吳茱萸 兔絲子 蛇床子_{各一兩半}

右剉散每服四錢煎數沸濾滓洗玉門日再洗

下乳治法

產婦有兩種乳脉不行有氣血盛而壅閉不行者有血少氣弱滯而不行者虛當補之盛當疎之盛者常用通

草漏蘆土瓜根輩虛者當用鍾乳猪蹄鯽魚之屬概可
見矣

漏蘆散 治產婦氣脉壅滯乳汁不行及經絡凝滯乳
內脹痛留蓄針毒或作癰腫藥服之後自然內消乳
汁通行

漏蘆 二兩 蛇蛻 十條 瓜萋 十枚急 橘葉 煨存性

為末溫酒調下二錢

鍾乳散 治乳婦氣少血衰脉蘊不行乳汁絕少

鍾乳粉

研細

濃煎漏蘆湯調下

母猪蹄湯 治如前

猪蹄

一隻通草四兩

青桑膏 治乳硬作痛

嫩桑葉

生採研細末

米飲調攤紙花貼患處千金云凡

患乳癰四十已下可治五十已上不可治治則死

不治自得終其天年

惡露証治

產後兒枕不散及血瘀堅聚按之攢手日晡增劇疼痛
淋露不快上攻心胸困頓狼狽宜服黑龍丹當歸湯奪
命丹治之

黑龍丹 治產後一切血疾垂死者但灌藥無有不效
神驗不可言

當歸 五靈脂 良薑 生地 川芎 各一兩

並細剉入砂盆內赤石脂泥封紙筋鹽泥固濟封盆
炭火十觔煅通紅去火候冷開取盒子看成黑糟乃

取出細研入後藥

百草霜

五兩

硫黃

乳香

各一錢五分

花蕊石

琥珀

各一

錢

為末米醋和丸如彈子大每服一九炭火燒紅生薑

自然汁與無灰酒各一合小便半盞研開頓服立效

當歸湯 治產後敗血不散兒枕硬痛或發或止及新

產乘虛風寒搏結惡露不快臍腹堅脹

當歸

鬼箭

取羽用

紅花

各一兩

每服三錢調煎七分

奪命丹

方見前
第三論

虛煩証治

產蓐最難調理所以忌問男女及不許見穢汚者皆古人預防其妄念也每見婦人以得男則喜得女則憂憂喜太早致心虛煩悶多自此始蓋去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱內熱則虛煩其証心胸煩滿呼吸短氣頭痛悶亂骨節疼痛晡時徹甚與大病後虛煩相類人參當歸湯治產虛煩不安

人參 當歸 麥冬 生地 肉桂 各一兩 白芍 二兩

右剉散每服四錢水二盞粳米一合竹葉十片煎至

一半去米葉入藥併棗三枚煎七分

蒲黃散 治產後虛煩必效

蒲黃 紙上炒 每服一錢東流水調下無時

虛渴証治

產後去血過多津液不固腎氣虛弱多使人煩渴引飲無度雖非三消其証頗同治之當養血通氣回津補腎

方效

熟地黃湯 治產後虛渴不止少氣脚弱眼昏頭眩飲

食無味

熟地

一兩

人參

三兩

麥冬

二兩

花粉

四兩

甘草

五錢

右呔咀每服四錢水二盞元米一撮薑三片棗三枚

煎七分

六氣經緯丸

川芎

白芎

當歸

白朮

茯苓

澤瀉

淋悶証治

諸治產前後淋閉其治不同產前當安胎產後當去血其如冷石膏熱氣淋等為治則一但量其虛實而用之瞿麥蒲黃最為產後要藥惟當尋其所因則不失其機要矣

茅根湯 治產後諸淋無問冷熱石膏結氣悉主之

白茅根八兩 瞿麥 茯苓 蒲黃 桃膠 滑石

炙草各一兩 子貝十箇 冬葵子 人參各二兩 石首魚

腦骨

二十箇煨

右剉散每服四錢加薑三片燈心二十莖煎七分

亦可為末煎木香湯調下二錢如氣壅閉木通陳皮

湯調下

產後雜病治法

當歸養血丸 治產後惡血不散發渴疼痛及惡露不

快臍腹堅脹兼室女經候不勻赤白帶下心腹腰痛

當歸

肉桂各一兩

赤芍

丹皮

玄胡索

各二兩

右為末蜜丸桐子大溫酒米飲下三五丸痛極細嚼

嚥下

四神散 治產後留血不消積聚作塊急切疼痛猶如
遁尸心腹絞痛下利

當歸 芍藥 川芎 炮薑 各等分

為末溫酒調下二錢

丁香散 治產後咳逆

石蓮肉 十箇去心炒 丁香 十枚 為末水煎服

當歸黃芪湯 治產後腰足疼痛不可轉側壯熱自汗
身體強氣短

黃芪 芍藥 各二兩 當歸 三兩 每服四錢加薑三片

竹葉湯 治產後傷風發熱面赤喘而頭痛

乾葛 三分 防風 桔梗 桂心 人參 炙草 各一分

附子 五錢

每服四錢加薑五片棗三枚竹葉十片煎七分嘔者
加半夏

神授散 治婦人產後一切疾病不問大小以致危篤

丹皮 白芍 桂心 陳皮 青皮各五錢 當歸

百合 川芎 炙草 炮薑各一兩 人參 神麴

麥芽各三錢 紅花一錢半

為末每服二錢薑棗湯煎七分 孕婦勿服

調補法

產後血氣既衰五臟俱損唯得將補不可轉利雖惡血未盡亦不可便服補藥須候七日外臍下塊散方可投