

欽定四庫全書

子部
名醫類案卷四



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

醫學類書卷四

齊民要術

皇朝醫書

明江瓊編

亂為

亂症吐瀉轉筋足冷多

劇江診之左右寸關皆

伏無礙
戶音杜微口
渴欲飲冷水
足冷囊縮似屬厥陰

欽定四庫全書

名醫類案

口渴亦似少陰引水自救何以辨之曰直中陰經
無有上吐轉筋多汗症若少陰頭有汗則死矣 乃

以五苓散與之覺稍定向午猶渴以五苓加麥冬五

味子滑石投之

足冷囊縮似宜急溫然口渴飲冷又當清既非傷寒故如此治五苓妙

加藥尤妙

更以黃連香薷飲冷進一服次早脉稍出按之

無根人脫形且吃忒手足厥冷

即當溫

飲食不入則

吐大便稍不禁為灸丹田八九壯囊縮稍舒手足稍

溫當以理中湯二三服渴猶甚咽疼熱不解時或昏

沉乃以竹葉石膏湯投之而愈

用藥圓轉當熟玩之所謂見病治病

江應宿治一婦人六月中旬病癰亂吐瀉轉筋一醫投
藿香正氣散加煩躁面赤揭衣臥地予診視脉虛無
力身熱引飲此得之傷暑宜辛甘大寒之劑瀉其火
熱以五苓散加滑石石膏吐瀉定再與桂苓甘露飲
而愈

凡治霍亂俱要
辛熱寒涼並用

一僕夫燕京人縱酒飲食無節病癰亂吐瀉轉筋煩渴
幾殆時六七月淋雨晝夜飲簷溜水數升而愈千金
方云輕者水瘥此偶合古方予目擊其事後路途中

及六合縣見一人服新汲井花水飲之良愈

一人病癰亂欲吐不吐欲瀉不瀉心腹絞痛脉之沈伏

如無此乾癰亂也急令鹽湯探吐宿食痰涎碗許遂

瀉

非吐瀉則死並針刺手足眉心出血為度

與六和湯而愈

瀉

琇按內傷外感俱能作瀉惟虛寒者可溫補餘則隨症施治不可執一

東垣治一人一日大便三四次澹而不多

胃瀉

有時作瀉

腹中鳴小便黃以黃芪柴胡歸身益智陳皮各三分

升麻六分炙甘草二錢

先生得手處在此

紅花少許

紅花少用入心

養血補火以生土引經妙

作一服名曰黃芪補胃湯水二盞煎一

盞稍熱食前服之

一人五更初曉時必溏泄一次此名腎泄以五味子二

兩吳萸半兩

即二神丸

用細粒綠色者二味炒香熟為度

細末之每服二錢陳米飲下數服而愈內經曰腎者

胃之關也關門不利故聚水而生病也

東垣云予病脾胃久衰視聽半失此陰盛乘陽加之氣

短精神不足此言弦脉令虛多言之過陽氣衰弱不能舒伸伏匿於陰中耳又值淫雨陰寒時人多病泄利此溼多成五泄故也一曰體重肢痛大便泄并下者三而小便秘濇思其治法按經云大小便不利無問標本先分利之又云治溼不利小便非其治也皆當利其小便必用淡味滲泄之劑利之是其法也噫聖人之法雖布在方策其不盡者可以意求耳今客邪寒溼之淫從外而入裏以暴加之若從已上法

度用淡滲之劑病雖即已是降之又降是益其陰而重竭其陽則陽氣愈削而精神愈短矣是陰重強陽重衰反助其邪也故必用升陽風藥以羌活獨活柴胡升麻各一錢防風根半錢炙甘草半錢煎稍熱服大法云寒溼之勝助風以平之又曰下者舉之得陽氣升騰而去矣又云客者除之是因曲而為之直也夫聖人之法可以類推舉一而知百也若不達升降

浮沉之理而概施治其愈者幸也

為後學廣開方便之門

子和治一人瀉利不止如傾衆以為寒治近二十載

非虛

寒可知

脉之兩寸皆滑子和不以為寒所以寒者水也

以茶調散湧寒水五七升又以無憂散瀉水數十行

當有所去下乃愈

次以淡劑利水道後愈此通因通用法也

一僧藏腑不調三年不愈此洞瀉也以謀慮不決而致

肝主謀慮甚則乘脾脾溼下行乃上湧痰半盆又以

舟車丸濬川散下數行仍使澡浴出汗自是日勝一

日又常以胃風湯白朮散調之

郝允治夏英公病泄太醫皆為中虛郝曰風客於胃則

泄名殆藁本湯證也夏駭曰吾服金石等藥無數泄

不止其敢飲藁本乎郝強進之泄止

邵氏聞見錄

丹溪治一老人右手風攣多年

積痰見症

九月內患泄瀉百

藥不效右手脉浮大洪數此太陰經有積痰肺氣壅

遏不能下降大腸虛而作瀉當治上焦

治上用焦妙

用蘿蔔

子搗治漿水蜜探之而吐大塊膠痰碗許隨安

一富兒面黃善啖易飢非肉不食泄瀉一月脉大以為

溼熱當脾困而食少今反形健而多食不渴此必疳蟲也驗其大便果有虵令其治蟲而愈至次年夏初復瀉不痛而口乾朱曰昔治蟲而不治疳故也以去疳熱之藥白朮湯下三日而愈後用白朮為君芍藥為臣川芎陳皮黃連胡黃連入蘆薈為丸白朮湯下禁肉與甜瓜防其再舉

一老人味厚傷脾常脾泄芍藥酒炒一兩白朮炒二兩神曲一兩山查一兩五錢黃芩五錢炒半夏一兩湯

泡為末荷葉飯丸

一老人稟厚形瘦夏末患泄瀉至秋深治不愈神不悴

溺澁少不赤脉澁頗弦膈微悶食減

前案因手風掌見浮大洪數之

脉以吐而愈瀉此案脉濡頗弦因膈微悶而用吐可見不憑在脉

因悟曰必多年沉

積癖在腸胃詢之嗜鯉魚三年無一日缺朱曰此痰積在肺肺為大腸之藏宜大腸之不固也當澄其源而流自清以茱萸陳皮青葱鹿苜根生薑濃煎和沙糖飲一碗探吐痰半升如膠利減半次早又飲之又

吐半升利止與平胃散加白朮黃連調理旬日而安

一人性狡躁素患下疳瘡或作或止夏初患自利膈微

悶醫與理中湯悶厥而甦脉濡重取畧弦而數朱曰

此下疳之深重者與當歸龍會丸去麝四貼而利減

又與小柴胡去半夏加黃連白芍川芎生薑數貼而

愈

脉與前案同濡弦僅多數耳外症膈微悶亦同而治法各別宜細玩之

一人暴氣脫而虛頓渴不知人口眼俱閉呼吸甚微殆

欲死急灸氣海飲人參膏十餘觔而愈

琅按此案疑誤入此

呂滄洲治一人病下利完穀衆醫咸謂洞泄寒中日服
四逆理中等彌劇診其脉兩尺寸俱弦長右關浮於
左關一倍脾入逆肝其目外皆如草滋脉浮色青非風而何蓋知肝
風傳脾因成飧泄非藏寒所致飲以小續命湯減麻
黃加白朮三五升痢止續命非止痢藥飲不終劑而
痢止者以從本治故也

一夫人病飧泄彌年醫以休息利治之苦堅辛燥之劑
弗效時秋半脉雙弦而浮浮弦為風曰夫人之病蓋病驚

風非飲食勞倦所致也肝主驚故虛風自甚因乘脾而成泄今金氣正隆尚爾至明春病益加法當平木之太過扶土之不及而泄自止夫人曰儂寓南閩時平章燕公以銅符密授因失心懼由是疾作公言信然以黃牓牛肝和以攻風健脾之劑服之踰月泄止滑伯仁治一人暑月患中滿泄瀉小便赤四肢痠困不欲舉自汗微熱口渴且素羸瘠衆醫以虛勞將峻補之伯仁診視六脉虛微曰此東垣所謂夏月中暑飲

食勞倦法宜服清暑益氣湯投三劑而病如失

項彥章治南臺治書郭公久患泄瀉惡寒見風輒仆日臥密室以氈蒙其首熾炭助之出語咿咿如嬰兒諸醫作沉寒痼冷治屢進丹附不時驗項診其脉告曰此脾伏火邪溼熱下流非寒也法當升陽散火以逐其溼熱乃煮升麻澤瀉柴胡羌活等劑而繼以神芎丸郭曰予苦久泄今復利之恐非治也項曰公之六脉浮濡而弱且微數濡者溼也數者脾有伏火也病

由溼熱而且加之以熱劑非苦寒逐之不可法曰通
因通用吾有所試矣頃之利如木屑者三四出即去
羶及炭病旋已

黃子厚治一富翁病泄瀉彌年禮致子厚診療浹旬不
效子厚曰予未得其說求歸一日讀易至乾卦天行
健朱子有曰天之氣運行不息故閣得地在中間如
人弄碗珠只運動不住故在空中不墜少有息則墜
矣因悟向者富翁之病乃氣不能舉為下脫也又作