

# 欽定四庫全書

子部

景岳全書卷十九



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

景岳全書卷之九

氣血論

欽叔

經義

論血氣

論血氣

肺之合也皮也其氣以從其合也其寒飲

張介賓撰

岐伯對曰五臟六腑

其狀岐伯曰皮毛者

欽定四庫全書

景岳全書

食入胃從肺脉上至於肺則肺寒肺寒則外內合邪  
因而客之則為肺欬五臟各以其時受病非其時各  
傳以與之人與天地相參故五臟各以治時感於寒  
則受病微則為欬甚則為泄為痛乘秋則肺先受邪  
乘春則肝先受之乘夏則心先受之乘至陰則脾先  
受之乘冬則腎先受之○肺欬之狀欬而喘息有音  
甚則唾血○心欬之狀欬則心痛喉中介介如梗狀  
甚則咽痛喉痺○肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不

可以轉轉則兩肱下滿○脾欬之狀欬則右脇下痛  
陰陰引肩背甚則不可以動動則欬劇○腎欬之狀  
欬則腰背相引而痛甚則欬涎○帝曰六腑之欬奈  
何安所受病岐伯曰五臟之久欬乃移於六腑○脾  
欬不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長蟲出  
○肝欬不已則膽受之膽欬之狀欬嘔膽汁○肺欬  
不已則大腸受之大腸欬狀欬而遺矢○心欬不已  
則小腸受之小腸欬狀欬而失氣氣與欬俱失○腎

欬不已則膀胱受之膀胱欬狀欬而遺溺○久欬不  
已則三焦受之三焦欬狀欬而腹滿不欲飲食○此  
皆聚於胃關於肺使人多嘔唾而面浮腫氣逆也○  
帝曰治之奈何岐伯曰治臟者治其俞治腑者治其  
合浮腫者治其經帝曰善

生氣通天論曰秋傷於濕上逆而欬

陰陽應象大論曰秋傷於濕冬生欬嗽

示從容論曰欬嗽煩冤者是腎氣之逆也○喘欬者是

木氣并陽明也

脉解篇曰少陰所謂嘔欬上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從故嘔欬上氣喘也

陰陽別論曰一陽發病少氣善欬善泄

五臟生成篇曰欬嗽上氣厥在胸中過在手陽明太陰玉機真藏論曰秋脉不及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下聞病音

刺禁論曰刺中肺三日死其動為欬

評熱病論曰勞風法在肺下

詳後論  
證條中

氣交變大論凡歲火太過○歲金太過○歲水太過○  
歲木不及等年俱有欬證

五常政大論凡審平之紀○從革之紀○堅成之紀○  
少陽司天等年俱有欬證

至真要大論凡少陰司天○太陰司天○少陽司天○  
陽明司天○陽明之勝○少陰之復○太陰之復○  
少陽之復○陽明之復○厥陰司天客勝○少陽司

天主勝○太陽司天客勝等年俱有欬證

五邪篇曰邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬動  
肩背

繆刺論曰邪客於足少陽之絡令人脇痛不得息欬而  
汗出

論證共四條

欬嗽一證竊見諸家立論太繁皆不得其要多致後人  
臨證莫知所從所以治難得效以余觀之則欬嗽之

要止惟二證何為二證一曰外感一曰內傷而盡之  
矣夫外感之邪必由皮毛而入蓋皮毛為肺之合而  
凡外邪襲之則必先入於肺久而不愈則必自肺而  
傳於五臟也內傷之嗽必起於陰分蓋肺屬燥金為  
水之母陰損於下則陽孤於上水涸金枯肺苦於燥  
肺燥則癢癢則欬不能已也總之欬證雖多無非肺  
病而肺之為病亦無非此二者而已但於二者之中  
當分陰陽當分虛實耳蓋外感之欬陽邪也陽邪自

外而入故治宜辛溫邪得溫而自散也內傷之欬陰  
病也陰氣受傷於內故治宜甘平養陰陰氣復而嗽  
自愈也然外感之邪多有餘若實中有虛則宜兼補  
以散之內傷之病多不足若虛中挾實亦當兼清以  
潤之大都欬嗽之因無出於此於此求之自得其本  
得其本則治之無不應手又何有巢氏之十欬證陳  
氏之三因證徒致亂人心目而不得其際也畱心者  
其熟味此意經云肺之令人欬又曰五臟六腑皆令

人欬非獨肺也又曰皮毛先受邪氣邪氣以從其合也又曰五臟各以其時受病非其時各傳以與之然則五臟之欬由肺所傳則肺為主臟而五臟其兼者也故五臟六腑各有其證正以辨其兼證耳既有兼證則亦當有兼治雖有兼治然無非以肺為主也是固然矣然愚則猶有說焉則謂外感之欬與內傷之欬其所本不同而所治亦異蓋外感之欬其來在肺故必由肺以及臟此肺為本而臟為標也內傷之欬先

因傷臟故必由臟以及肺此臟為本而肺為標也凡  
治內傷者使不知治臟而單治肺則真陰何由以復  
陰不復則欬終不愈治外感者使不知治陽而妄治  
陰則邪氣何由以解邪不解則嗽終不寧經曰治病  
必求其本何今人之不能察也

一勞風證內經評熱病論曰勞風法在肺下其為病使  
人強上冥視唾出若涕惡風而振寒此為勞風之病  
巨陽引精者三日中年者五日不精者七日欬出青

黃涕其狀如濃大如彈丸從口中若鼻中出不出則傷肺傷肺則死矣

賁按此勞風之證即勞力傷風證也蓋人之勞者必毛竅開而汗液出所以風邪易入凡今人之患傷風者多有此證故輕者惟三四日重者五七日必欬出濁痰如涕而愈者此即勞風之屬也但以外感之法治之自無不愈其有勞之甚者或內搖其精或外勞其形勞傷既甚精血必虧故邪不能散而痰不能出

此即勞損乾嗽之類也所以多不可治

一外感有嗽內傷亦有嗽此一實一虛治當有辨也蓋外感之嗽必因偶受風寒故或為寒熱或為氣急或為鼻塞聲重頭痛吐痰和輕者脉亦和緩和甚者脉或弦洪微數但其素無積勞虛損等證而陡然欬嗽者即外感證也○若內傷之嗽則其病來有漸或因酒色或因勞傷必先有微嗽而日漸以甚其證則或為夜熱潮熱或為形容瘦減或兩顴常赤或氣短喉

乾其脉輕者亦必微數重者必細數絃緊蓋外感之  
嗽其來暴內傷之嗽其來徐外感之嗽因於寒和內  
傷之嗽因於陰虛外感之嗽可溫可散其治易內傷  
之嗽宜補宜和其治難此固其辨也然或其脉證素  
弱而忽病外感者有之或其形體素強而病致內傷  
者亦有之此中疑似但於病因脉色中細加權察自  
有聲應可證若或認之不真而互謬其治則吉凶攸  
係不淺也最宜慎之

外感嗽證治共五條

一外感之嗽無論四時必皆因於寒邪蓋寒隨時氣入客肺中所以治嗽但治以辛溫其邪自散惟六安煎加生薑為最妙凡屬外感悉宜先以此湯加減主之○若肺脘燥澁痰氣不利或年老血衰欬嗽費力者於本方加當歸二三錢○若寒氣太盛或中寒肺氣不溫和不能解者於此方加北細辛七八分或一錢若冬月寒盛氣閉邪不易散者即麻黃桂枝俱可加

用或用小青龍湯○若傷風見寒或傷寒見風而往來寒熱欬嗽不止者宜柴陳煎主之○若寒邪不甚痰氣不多者但以二陳湯加減主之則無有不愈

一外感之嗽凡屬陰虛血少或脾肺虛寒之輩則最易感和但察其脉體稍弱胸膈無滯或腎氣不足水泛為痰或心膈嘔惡饑不欲食或年及中衰血氣漸弱而欬嗽不能愈者悉宜金水六君煎加減主之足稱神劑○若魚陽分氣虛而脉微神困懶言多汗者必