

大麻瘋針灸特效療法補充版

生眉膏 患者希望眉毛重生的迫切；文字難以形容出來，以前均是聽其自然發生，最近應患者希望，製成此膏，用之有效。

皂角刺炭一兩（將皂角刺燒成炭存性，不要燒得太過，以碗覆之使火息，冷後研細末）。

兔絲子一兩晒乾研細末，旱蓮草一兩晒乾研末，三味共研細過羅，外用豬板油約四兩，並去渣，入煎藥末，下鍋即起，勿久煎，冷後成膏聽用。

用法：血色已好轉，面部皮色已如常，有生眉之可能時，每天用膏畫成眉，助其速生，如面部核未淨，血濁而黑，用之無益。

刺針 要粗，要硬，要圓，粗硬便利使用，圓則針孔易合，組織不致破壞，因為常常要刺，如用三稜針，針孔有痂迹，用粗針出血後無迹，並可深入提插捻轉等用。

指力 沒有指力，不但無效，而且感痛，用粗針刺過之後，二三天尤痛，甚或赤腫，要使不痛不腫，要有指力。

面部刺法 撥竹——刺眉毛根下透過魚腰。絲竹空——刺眉毛根下，透過魚腰。魚腰——

——向上刺。額部——刺入數分，復提起向上下左右刺。迎香——向上刺，針尖向鼻方向。刺面部各穴時，用左手拇指食指，將穴位之肉捏緊，使凸起，易刺入，可減痛，刺入數分或寸餘，強力捻轉十幾下，用力急拔出，使內部水血易出，每穴刺畢，用雙手擠出其水與血，腫易消，小核可化。

手部刺法 尺澤——先用帶將尺澤上方扎緊，使靜脈露出，在露出部直入數分，並強力捻轉幾下，急拔出，尺澤上下左右有青筋俱可刺二三針，不一定在尺澤穴上，刺畢上下用力推趕其出血出水。

八邪——即手指合縫處，刺出血，手掌腫及乾燥不仁瘡疥等，俱可用之。

足部刺法 委中——刺入寸餘，強力捻轉數十下，或提插幾下，用力急拔出，委中之上下左右有青筋俱可出血，膝以下大多腫而色黑，肉腐，亂刺出血出水。

冲陽出血投幽冥之說不忌，該處腫亂刺出血縱多毫無異狀發生。

足趾合縫處出血，有消腫恢復神經等功用。

灸 純用直接灸，感覺銳敏之處，初數壯極小後漸加大，無感覺處宜大炷。

不仁處灸法 某部失知覺太甚，經過若干次針灸而不能恢復者，非破壞組織不能恢復，用龍眼大炷，每炷相距寸餘，各炷灸三四壯後，再上化腐丹，使其潰爛，三天灸爛一次，初幾次毫不知覺，多幾次僅感覺有些熱氣，又幾次乃感覺疼，停灸上生肌丹。

結核大者，刺之難消，用上法灸去其核，注意，膝以下腫而肉腐或結硬者，灸潰後不易

收口，流水不止，不必求急切，針之刺之緩緩恢復。此症到了足掌厚皮恢復的時間，可算完全成功。

大麻瘋治愈詳記驗案

前言、後表列刺字，即包括「攢竹、絲竹空、魚腰、顴髻、迎香、尺澤、委中、」七穴，不再書穴名。灸字即包括，「曲池、合谷、膈俞、風市、血海、」五穴，不再書穴名。除隨病狀取穴。後列二人，係照診療日記錄出，決非虛構，欲使讀者知其經過實際。病態記述不詳，原因如下。

一、血色與成分變化：係由黑色漸次減退，水分漸次減少而復正常，時間經過多少不等。血復正常，為愈病主要條件。但無科學方法檢查其變化經過，文字不易判然表示。

二、癩癩之消沒：漸次脫去，脫後復生，生後復脫，如是漸次減小其範圍，由大而小，由餅形而粒形，漸至於無。

三、腫核之消沒：腫漸次減退，退後亦有復腫者，足踝骨以下腫硬最難消。結核成餅及高凸者，非灸潰爛不能消，消後即不再起。

四、皮膚柔潤：癩癩脫去，或厚燥皮剝脫，能出汗乃可復常，出汗亦為愈病主要條件。

五、感覺恢復：最初大部，或數部無感覺，經過若干次針灸，乃能漸次恢復，無感覺部刺了針灸知疼，即獲大效。

大麻瘋鍼灸特效療法 補充版

四

六、眉毛趾甲重生：眉毛生出一二月時間，望之不可見，須近病者傍側視，乃可發見細毫，再經一二月，乃能遠遠望見。趾甲由甲根變潤色長出，將原來壞趾甲沖出完，即復正常。

以上六項，均是慢慢變化而來的，不知不覺的，無形無影的，在變化時間，很不容易考查清楚，並且是長久麻煩工作，故未詳細記錄。

(一)病者 李大成，男，十三歲，陝西洋縣龍溪鄉周家店。

病狀：二三年以來，腹慢疼，身痠困，倦怠無力，食慾不振，今年各關節麻木，皮膚發癢，肌肉內如虫行，如風刺，(部位不定)眉癢甚，摸之即落，眉外半節已落淨，全身皮膚乾燥，四肢無汗，手足掌內外皮厚而裂，面部項部肩背，起白瑣癬餅。

治療經過表

數次	月 日		治 療	病 態	變 化
	月	日			
1	三十七年	冬月初三	曲池、合谷、內關、風市、陽陵、三陰	針後腹疼即止，以後未發。	
2	初五		刺、曲池、合谷、陽陵、風市、三陰	刺出血色俱黑。	

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
十九	十六	十三	初九	臘月初四	廿九	廿六	廿三	十九	十六	十二	初九
刺·肩髃、曲池、風市、陽陵、	灸·	刺·面紅處亂刺出血。	灸·	刺·風池、內關、通里、湧泉、	灸·	刺·通里、湧泉、三陰交、三里、	灸·	刺·面紅部亂刺出血	灸·	刺·肩髃、曲池、環跳、陽陵、太谿、 、崑崙、	灸·直接灸每穴十餘壯後同
面已不燒不紅。	面燒發紅，俱減輕。		風刺虫行俱未發生。		已不覺麻。	麻時間每大一二次，以前十餘次	眉癢減輕。	虫行風刺已止，面發紅發燒。	麻癢稍減輕		

大麻瘋鍼灸特效療法 補充版

25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15
初十	初六	二月初二	廿七	廿二	十八	十三	初十	初六	廿七	廿三
灸。	刺・三里、陽陵、三陰交、太谿、	灸。	刺・肩髃、曲池、環跳、陽陵、	灸。	刺・三陰交、太谿、復溜、太冲、	灸。	刺・手足扯縫出血太谿、崑崙、	刺・肩髃、曲池、環跳、陽陵、三里	刺・肩髃、曲池、環跳、陽陵、三里	灸・脾俞、
		手足粗皮漸潤。	麻癢極微。		血漸呈紅色。		有精神，不倦怠。		食慾大增。	

大麻瘋鍼灸特效療法 補充版

36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26
廿四	二十	十五	初八	初四	三月初二	廿八	廿四	廿一	十七	十四
刺。	灸。	刺。	灸。	刺。	騎馬灸。	刺。	騎馬灸約三十壯全身俱麻。	刺。	灸。	刺。
血復正常。			痲脫淨。	痲痿全止，手足心俱出汗。	痿止皮膚潤出汗痲癩全消。	血又稍見異色。				各部俱呈好轉。

大麻瘋鍼灸特效療法 補充版

八

37	廿八	灸·	
38	四月初八	騎馬灸·	眉尾細毫近視可見，皮膚全潤。
39	十五	騎馬灸·	
40	廿五	灸·曲池、膈俞、血海、	
41	五月二十	灸·曲池、膈俞、脾俞、血海、	
42	六月十二	刺·尺澤、委中、	血正常，全身俱出汗。
43	七月初四	刺·尺澤、委中、	血正常。
44	又七月初五	刺·尺澤、委中、	血正常，眉一望即見。

自此即停止，最後幾次，刺血，他是來看血色有沒有轉變，目的是來檢查的，其人容貌，全改舊觀。

(二)病者 紹法，男，二十歲，陝西南鄭武鄉區紹家灣。

病狀：眉落，望之不見，僅存十分二三，黃而彎屈，眉癢，眼胞腫，面色眊亮，手足癩

癩成餅，腹背癬疥滿佈，體無完膚，手足無汗，皮膚乾燥，手足踝骨以下，腫厚黑色，肌肉內如蟲行風刺，麻不甚，右膝部全無知覺。飲食行動如常。

治療經過表

次	月 日	治	療	病 態 變 化
1	一九五〇臘月二十	刺・主穴、肩髃、曲池、合谷、環跳、風市、陽陵、太泚針、	血極黑。	
2	廿五	灸・主穴		
3	廿九	刺・三里、三陰交、復溜、太谿、針		
4	一九五一年正月 初五	刺・手足腫處亂刺、	癢輕，虫行止。	
5	初十	刺・手足腫處亂刺、		
6	十七	灸・		
7	廿一	刺・風府、風池、手足各穴均針、	血黑色漸減。	

大麻瘋鍼灸特效療法 補九版

18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8
廿七	廿四	二十	十八	十四	十三	初八	初六	二月初三	廿九	廿五
灸・	刺・同九	灸・	刺・同九	灸・	刺・同九	灸・	刺・同九	灸・	刺・腫處亂刺、手足各穴俱針。	灸・
痲癩復脫。	血色漸紅。	痲癩又起，但不聯接有間隙。	各處腫漸消。	痲癩落。	後流出血色稍紅。	痲癩落後復起。	痲癩漸落。			

29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19
初十	初六	四月初二	廿八	廿四	二十	十六	十二	初九	初五	三月初二
刺·右膝灸後上敷化腐丹。	灸·右膝不仁處灸潰上敷化腐丹。	刺·	灸·	刺·	灸·	刺·	灸·	刺·	灸·	刺·同九
		眉細毫已發生，側視可見。		虫行、麻、許久未見發生。	手足仍起疥性瘡，背腹已消淨。	疥性瘡脫痂。		痂癩脫後又起小疥性瘡，不成餅。		

大麻瘋鍼灸特效療法 補充版

一一一

38	十六	灸。	
37	十一	刺。	皮膚生毛可見，任灸某穴俱極疹。
36	初六	灸。	血復正常，手足疥已淨。
35	五月初三	刺。上生肌丹。	右膝結痂，全身俱能出汗。
34	廿九	灸。膝部已知疹，上生肌丹。	眉毛一望可見。
33	廿五	刺。膝灸，各部均針。	膝已知疹。
32	二十	灸。膝灸，上敷化腐丹。	
31	十七	刺。膝灸，足部各穴針。	趾甲重生，甲潤有色氣。
30	十三	灸。右膝灸後上敷化腐丹。	右膝稍知有熱氣。

附：此人仍在治療中，已達到十分之九治效，全愈毫無疑義，只待全身之黑暈脫淨，成完人。其他尚有十餘人，均在治療中，一俟全愈再呈。
 紹法病勢進步好轉甚速，中途未發生阻礙。以上兩人內一概未服藥，只外敷。