

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百四十七



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院院使_臣張肇基

編修_臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷一百四十七

周王朱楠撰

痼疾門

總論

人身之氣海聚焉而為
腎所繫為真氣之所居
而為風寒所乘而為
水結不散又與氣搏是
小腸氣曰膀胱氣皆是

物也其傳不物外則心腹作痛或攻刺于腰脇或遊走

欽定四庫全書

普濟方

于背脊或冷氣搶心心下痛滿或手足厥冷自汗嘔逆
痛遶臍膀或脇之左右如盃或臍之上下如臂或腹中
累累如桃李或胃脘間覆大如盤有壯熱惡寒者有洒
淅寒熱者有不得大小便者有裏急而下泄者自汗出
者有不欲食者其於陰間則卵有大小伸縮而上下不
常囊有腫脹急痛而發歇無定挾冷觸怒則塊物逼上
囊根或攻腹之脇時和心平則塊物自循脣系歸入囊
中凡此皆謂之腎氣治法綱領風則散之寒則溫之暑

則解其熱濕則滲其水七情所發調其心氣水與氣搏
行其小便其間以主治腎氣之劑參之然總治之法大
要以流行踈利為先毋曰腎虛得病不敢踈泄蓋腎為
邪氣所干若非逐去病何由愈儻或姑息畏虛妄以剛
劑兜住使大小腑秘而不通邪氣入腹衝心危殆必矣
然腎氣發則固以腎虛得之然虛中有冷虛中有熱又
有冷熱不調尤當詳審冷者脇邊及外腎清冷小便清
而多遇寒即發是也熱者內挾暑氣或積毒或服暖藥

於前外腎與小腹俱熱肛門間糞後赤熱小便數澀遇
熱則甚是也冷熱不調者小便外腎乍冷乍熱大便小
便或秘或利用藥溫涼當隨証而權度之但所謂流行
疎導常常運轉於其中矣其若大小便流利之後或更
有掌刺引疼或氣遊注於肌膚之間此則腎虛血虛氣
不還元當加潤養人參當歸川芎芍藥桑螵蛸葫蘆巴
革又不可無惟是逆氣長虛中脘停酸燥悶擾甚而至
於嘔吐最為惡候何則天一生水腎實主之中筋系於

陰陰器惟藉陽明以養之今脾土不濟腎水上乘必為
酸汁為必涎飲荏苒踰時遂成暴吐醫家執劑之始皆
知腎經惡燥如蒼朮白朮良薑之類誠不敢用及其嘔
吐大作薑朮輩用之而不顧若猶未也則吳株萸輩撥
剛燥等劑又加多焉雖附子亦用之而救急矣病勢至
此脾土未強腎水已為之涸腎水既涸脾土又為之焦
往往陰陽不升降榮衛不流行大小二便關隔澀閉而
腎汁皆自其口出也如此者大抵不救臨病須當識病

預與病家言之夫心火下降則腎水不患其不溫真陽
不行則腎氣不患其不和安有所謂木強者哉惟夫嗜
慾內戕腎氣虛憊故陽陰不相交水火不相劑而沉寒
涸冷凝滯其間脹大作疼頑痺結硬勢所必至矣執劑
之法不可純用燥熱當溫利以逐其邪邪氣內消榮衛
流轉蓋如寒谷逢春有不戒而速不行而至者矣外此
又有一種升高墜下外腎跌傷驚起與敗血交攻亦有
木強脹疼之証治法大要則同於中更為之消瘀○大

抵諸疝之脉脉當弦緊蓋弦者寒也緊者痛也疝有七
証厥疝癰疝寒疝氣疝盤疝附疝狼疝是也何以言之
厥疝則心痛足冷食已則吐癰疝腹中氣乍滿滿氣
積如臂寒疝因寒飲食卒然脇下腹中痛氣疝腹中
乍滿減而痛盤疝腹中痛盤疝腹中痛引臍膀附疝腹
痛連臍下有積聚狼疝小腹與陰相引而痛諸疝不愈
邪氣留滯及成積聚其脉厥而緊浮而牢皆積聚之脉
也但牢強急者生虛弱急者不可治

儒門事親書云寒
疝名水疝律科王

敏之病寒疝臍下結聚如黃芪每發遶腰間痛急不能
忍戴人先以舟車及猪腎散下四五行覺藥繞病三五
次而下其瀉皆水也猪腎甘遂皆苦寒經言以寒治寒
萬幸萬全但下後忌飲冷水及寒物宜食乾物以寒疝
本是水故也即日病減八分食進一倍又數日以舟車
丸百餘粒通經散四五錢服之利下俟三四日又服舟
車丸七十八粒猪腰散三錢乃行步如常矣又一僧疝
病發作冷氣上實齒下貫腎緊若繩挽兩辜時腫時冷
戴人稱兩手脉細而弱斷之曰秋脉也此因金氣在上
下伐肝木水畏金木伸故病如是肝氣壅薄而能下榮
故辜丸故其寒實非寒木受金制傳之胃土胃為陽明
故上實齒病非齒之病肝木者心火之母也母既不伸
子亦屈伏故下冷而水化乘經曰木鬱則達之土鬱則
泄之令涌四次果覺氣和辜丸痒而暖戴人曰氣已入
辜中矣以茴香木茂之藥劑以服首尾一月而愈瀉療
方云治疝氣發作痛不可忍真科五苓散一貼連根葱

白一寸燈心七莖煎湯吞下青鹽木香九五十粒即效
又法青木香九二百粒斑猫七枚去頭翅為粗末用瓦
鉞於文武火上同炒令木香微香却以磁碟蓋藥鉞放
冷處少時去斑猫取木香九二服空心茴香酒吞下累
試之有
驗也

論云厥陰脉滑則病狐疝少陰脉滑則病肺風疝太
陰脉滑則病脾風疝陽明脉滑則病心風疝也太
陽脉滑則病腎風疝少陽脉滑則病肝風疝靈樞
經云心脉微滑為心疝引臍少腹鳴肝脉滑甚為
癰疝。夫滑脉關已上見者為大熱蓋陽與陽併

也故大熱脉滑尺脉見為大寒生癰疽滑脉者命門胞絡之名也為丙丁熱火併于下蓋丙丁不勝壬癸從寒水之化也故生癰疽寸口脉弦而緊弦即衛氣不行衛氣不行即惡寒緊則不欲飲食弦緊相搏即為寒跗陽脉浮而遲即為寒疽凡瘦人繞臍痛必為風冷穀氣不行而反下之其氣必衝心不則否。夫陰癰屬肝係宗筋胃陽明養之世多不識謂之外腎非特名義差錯亦使內臟不分其可不

辨古方四証但曰腸癰氣癰水癰卵脹殊不別其所因如腸癰則因房室過度元臟虛冷腸邊繫不收墜入癰中上下無定謂之腸癰不內外因病者久蓄憂思恐怒兼并隨臟氣下墜陰癰腫脹急痛名曰氣癰屬內所因病者久坐冷濕濕氣下襲致陰腫脹名曰水癰屬外所病者勞役無節及跨馬坐車致卵核腫脹或偏有大小上下無常者名曰卵脹亦屬不內外因有小兒生來便如此者乃宿疾也卵脹腸癰皆難治氣癰水癰治之

易愈又寒疝下注入于癰中名為狐疝亦屬癰病世人
因此病以癰病為疝氣不審之甚婦人陰門挺出亦稱
癰病名義不分有如此者凡癰唯腸癰無問貴賤多有
之有睡卧背系延入脇下者有隊入囊中者或遇疲勞
及天色變動逼上囊根腫急作痛過於寒疝得暖則下
其如外脹有作熱生膿為癰潰爛者比比有之

前陰分
大寒大

熱囊垂縮陰陽別証云三陽為病發寒為癰腫不為痿
厥喘瘖其傳為索畢其傳為癰疝夫熱在外寒在內則
累乖此九夏之氣也寒在外熱在內則邪縮此三冬之
氣也足太陽膀胱之脉逆上通手太陽小腸之脉下行

至足厥陰肝之脉不得伸其任脉並厥陰之脉逆則如
巨川之水治陽氣下墜是風寒濕熱下出囊中至兩畢
腫大謂之曰大甚則為癰足厥陰肝之經與太陽膀胱
寒水之脉同至前陰之來傷寒家說足厥陰肝經為痛
滿囊縮急下之宜大承氣湯以瀉大熱靈樞經曰足厥
陰肝經經脉中以為寒則筋攣外縮為大寒前說囊為
大熱此說囊縮寒此說囊縮垂畢下引癰疽脚氣大寒
風濕盛下垂為寒與上二說不同以平康不病人論之
夏暑大熱囊外累垂冬天大寒急縮上次與三說又大
不同何也是相乖邪不相乖邪答曰傷寒家囊外縮大
熱在內宜承氣湯急下之與筋經說囊外縮大寒在外
亦是在內與傷同故再引平康之人以証之也冬天陽
氣在內陰氣在外人亦應之故寒在外則皮急而囊氣縮
夏月陰氣在內陽氣在外人亦應之故熱在內則皮暖
皮暖則垂囊此癰疽之相也三說
文殊皆亦理也用藥詳而審之

諸疝 附論

疝病有七厥逆心痛足寒飲食則吐者名厥疝腹中氣滿心下盡痛氣積如臂者名堅疝寒飲則脇下腹盡痛者名寒疝腹中乍滿乍寒而痛者名氣疝腹中痛在臍膀者名盤疝腹中乍痛在臍下有積聚者名附疝小腹與陰相引而痛大便難者名狐疝凡此七疝皆寒由血氣凝澁不得通利冷劇則痛故皆謂之疝難經曰任之為病其內若結男子為七疝女為瘕聚蓋明此也

方

敵金散

指出直指方

治疝氣外腎腫脹極大或生瘡出黃水其

痛遶腸寒熱往來

荊三棱 蓬莪茂 木猪苓 白附子 蘿蔔子

赤芍藥 黑牽牛 川棟肉 山茵陳 青木

香 陳橘皮 五靈芝 姜黃 茴香 南木

香 丁香 澤瀉 海藻 海浮石

半兩

一分

一兩半

已

酒浸一宿焙乾

一

兩

兩

米醋浸火煨紅淬醋又川山甲 熟火灰煨 青皮 白

煨淬如此七次黑為度

川山甲

熟火灰煨

焦各一兩

白

白

白

白