


南宁市藥物志

第二輯



南宁市中藥研究所編印

1960年8月

前 言

党的第八届全国代表大会关于发展国民经济的第二个五年计划，明确指出应当“认真地进行中医中药的整理研究工作”。这对我们中医药工作者来说，是起着非常积极的鼓舞作用。

由于中草药彼此之间，有着极为密切的联系，它是随着中医的发展而发展的，反过来它又丰富了中医的内容，促进中医的发展，因此，发掘整理和研究祖国药物宝藏，在现阶段来说，是有其重大意义的。

我市人民，也同全国人民一样，在长期和疾病作斗争的实践过程中，对药物的生产应用等方面，都积累了不少丰富的经验，特别是对于草药的扩大利用方面，更具有传统的广泛性。

去年我们编印“南宁市药物志”第一辑时，是本着边发掘、边整理、边研究、边运用的原则来进行的。当时我们觉得它的质量，距离党的要求还很远，但是当我们接到远如北京、南京等地的兄弟单位来函索取时，就给我们以莫大鼓舞，更给我们编印第二辑的勇气和决心。

大家知道，南宁地处亚热带，同时也是我自治区中药材主要产地之一，未见记载于文献的民间草药，极为繁多。而这些草药，过去都是憑耳傳口授的流傳下来的。所以每种药物，每多科属不分，同物异名，同名异物，一物多名等，致使真假难分，其中张冠李戴，以讹传讹者就不少。因此，我们深深的接受第一辑的编印经验，除了利用中西结合，通过临床观察和实验研究来进行各种综合整理，和不断派员深入产地，作采集，调查新老品种药物外，还随时召集或拜访有一定水平的中草药医药人员来多方征询他们的治疗经验，再经我们研究鉴定之后，然后付印的，这对丰富祖国医学科学，更全面地继承和发扬祖国医药遗产，和对开发我市药材资源，发展国民经济，可能有一定的用处。

但是由于我们的科学知識水平低，加以编繪能力受到各种条件的限制，其中缺点和错误之处，一定是不不少的。因此，我们希望各地中西医药卫生界的先进者，多多的提出宝贵的意见，以便今后改进。

本辑在编写过程中，仍得区卫生厅药检所、区中医药研究所和市中草药医药人员的协助，做好审定工作，并此致谢。

南宁市中医药研究所

南 宁 藥 物 誌 第 二 輯 目 录

二 画

201. 入地金牛..... (1)
202. 八角枫..... (2)
203. 刀 豆..... (3)
204. 九龙藤..... (4)
205. 九层楼..... (5)

三 画

206. 土通草..... (6)
207. 土党参..... (7)
208. 土防风..... (8)
209. 土萆薢..... (9)
210. 土山药..... (10)
211. 土桔梗..... (11)
212. 土牛膝..... (12)
213. 土茯苓..... (13)
214. 大瓜石斛..... (14)
215. 大石仙桃..... (15)
216. 大浮萍..... (16)
217. 大叶半夏..... (17)
218. 大金花草..... (18)
219. 大红花..... (19)
220. 山 梗..... (20)
221. 山芭蕉..... (21)
222. 山苦瓜..... (22)
223. 大羊角菜..... (23)
224. 小连翘..... (24)
225. 千日红..... (25)
226. 千槿榔..... (26)
227. 万寿果..... (27)

228. 万寿菊..... (28)
229. 三角泡..... (29)
230. 土荆芥..... (30)

画 画

231. 水瓜子菜..... (31)
232. 水 瓜..... (32)
233. 木 贼..... (33)
234. 木碎补..... (34)
235. 木万年青..... (35)
236. 毛罗伞..... (36)
237. 毛 茄..... (37)
238. 毛竹叶菜..... (38)
239. 天門冬..... (39)
240. 五爪龙..... (40)
241. 月月红..... (41)
242. 牛耳枫..... (42)
243. 火炭狼..... (43)
244. 水拖木..... (44)
245. 水芦荻..... (45)

五 画

246. 白花草..... (46)
247. 古银菜..... (47)
248. 白牡丹..... (48)
249. 白背藤..... (49)
250. 白威灵仙..... (50)
251. 白毛鸡草..... (51)
252. 白龙船..... (52)
253. 白扁豆..... (53)
254. 玉带根..... (54)

255. 百合	(55)
256. 冬瓜子	(56)
257. 米仔花	(57)
258. 瓦 葶	(58)
259. 白相公	(59)
260. 串时花	(60)
261. 盐肤木	(61)
262. 四方草	(62)
263. 四叶菜	(63)
264. 无花果	(64)
265. 石 斛	(65)
266. 白花甜金香炉	(66)
267. 四方瓣面	(67)

六 画

268. 羊吊钟	(68)
269. 吊竹草	(69)
270. 灯笼草	(70)
271. 老虎须	(71)
272. 老虎耳	(72)
273. 光棍草	(73)

七 画

274. 沙 姜	(74)
275. 豆 榆	(75)
276. 谷沙树	(76)
277. 苏 木	(77)
278. 车前草	(78)
279. 芒 果	(79)
280. 杉	(80)
281. 扶 桑	(81)
282. 串心草	(82)
283. 伸筋藤	(83)
284. 吹云草	(84)
285. 鹿 角	(85)

286. 夹竹桃	(86)
287. 佛 手	(87)
288. 佛甲草	(88)
289. 沙虫药	(89)

八 画

290. 狗胆木	(90)
291. 金边吊兰	(91)
292. 金星凤尾草	(92)
293. 金边龙舌兰	(93)
294. 宵诒子	(94)
295. 青天葵	(95)
296. 含羞草	(96)
297. 芦 根	(97)
298. 枇杷叶	(98)
299. 拔酸蒸	(99)
300. 狗尾花	(100)
301. 狗肝菜	(101)
302. 狗骨霸	(102)
303. 观音兰	(103)

九 画

304. 红叶姜	(104)
305. 苦毛茛	(105)
306. 柚寄生	(106)
307. 苦楝树	(107)
308. 环 草	(108)
309. 卷 柏	(109)
310. 首 乌	(110)
311. 茅 根	(111)
312. 南柴胡	(112)
313. 姜 黄	(113)
314. 红花柴	(114)
315. 冠果蕨	(115)
316. 美人蕉	(116)

317. 紅金櫻	(117)
318. 香附	(118)
319. 枸杞	(119)
320. 相思豆	(120)
321. 独脚烏白	(121)
322. 紅絲綫	(122)
323. 李薔果	(123)

十 画

324. 酒筒木	(124)
325. 臭花根	(125)
326. 臭草	(126)
327. 荔枝象	(127)
328. 栝 桐	(128)
329. 草豆叩	(129)
330. 頂心風	(130)
331. 胭脂花	(131)
332. 側 柏	(132)
333. 益母艾	(133)
334. 烏飯叶	(134)
335. 馬尾松	(135)
336. 射 干	(136)
337. 梅	(137)
338. 桑	(138)
339. 酒餅	(139)

十 一 画

340. 細榕樹	(140)
341. 細骨風	(141)
342. 細假藍	(142)
343. 黃花柴胡	(143)
344. 黃飯花	(144)
345. 黃 藤	(145)
346. 黃 精	(146)
347. 黃 澤	(147)

348. 寶皮樹	(148)
349. 假連翹	(149)
350. 假桐油	(150)
351. 假刀豆	(151)
352. 假高麗	(152)
353. 假砂仁	(153)
354. 紫 苏	(154)
355. 紫 姜	(155)
356. 接骨草	(156)
357. 野薔薇	(157)
358. 假葡萄	(158)
359. 紅花路边青	(159)
360. 黑血藤	(160)
361. 旋复花	(161)
362. 透骨龍	(162)
363. 淡竹叶	(163)

十 二 画

364. 楊 桃	(164)
365. 散血丹	(165)
366. 薄 荷	(166)
367. 胡芦茶	(167)
368. 番石榴	(168)
369. 絨球馬鞭草	(169)

十 三 画

370. 暖叶根	(170)
371. 鉄 寬 葉	(171)
372. 鉄 綫 蕨	(172)
373. 鷄 爪 蘭	(173)
374. 鷄 屎 香	(174)
375. 钻 地 風	(175)
376. 蜈 蚣 草	(176)
377. 慶 魚 風	(177)
378. 落 地 生 根	(178)

379. 楠木.....(179)

380. 絲瓜絡.....(180)

十四画

381. 稻尾草.....(181)

十五画

382. 樟 檫.....(182)

382. 樟檫枝.....(183)

384. 蝴蝶草.....(184)

385. 虾钳草.....(185)

386. 锯齿草.....(186)

387. 綠 豆.....(187)

388. 樟 树.....(188)

十六画

389. 鴨脚柴.....(189)

390. 鴨杆菜.....(190)

391. 龙眼果.....(191)

392. 龙珠果.....(192)

393. 糙米花.....(192)

394. 澤 兰.....(194)

395. 薤 白.....(195)

十七画

396. 歛血草.....(196)

397. 整 姜.....(197)

十八画

398. 藤 菜.....(198)

399. 鴉脚木.....(199)

十九画

400. 麒麟尾.....(200)

201. 入地金牛 (假胡椒、細叶三叉虎)

科属: 芸香科

产地: 市郊区村边及山野间

形态: 为常绿藤状亚灌木, 高约4—6尺, 根、茎、枝、叶, 均有强烈香气。根圆柱形, 金黄色。茎圆形, 密生坚硬钩刺, 嫩时被短柔毛, 老则脱落。枝互生, 亦有硬钩刺。叶为互生的指状3小叶, 叶柄被柔毛, 柄长约4—5分; 叶片椭圆状披针形, 长约1.5—2寸, 宽约5—7分, 前端渐尖, 基部楔形, 边全缘, 或微呈波状形。主脉于叶背呈浅伏隆起, 侧脉微凹, 叶面绿色, 有腺点, 叶背淡绿色。花期春季, 腋生, 为聚伞花序, 花小, 萼4片, 绿色, 花瓣5枚, 淡黄色, 雄蕊3—5枚, 柱头头状, 子房上位。果为核果, 扁圆形, 熟时黄色; 有胡椒气味, 故名假胡椒。



入地金牛

采制时间及方法: 四时均可采其根, 晒干切短备用。

性味: 辛温无毒

功效: 有行气散瘀止痛作用, 根内服, 发表治胃痛, 叶生用捣烂外敷治跌打散骨, 治阴疮。

用量: 4—10公分, 外用不拘。


禁忌: 孕妇忌

202. 八角枫 (八角王、毛八角枫)

科属：八角枫科

产地：市郊各乡村

形态：为灌木，或亚乔木，高约5—20尺。小枝圆柱形，幼时被黄色柔毛，后变秃净。叶互生，膜质，阔卵形，至卵状椭圆形，常不等边，或有掌状，或不规则分裂，先端渐尖，长约4—5寸，宽2—4寸，边全缘，基部斜截头形，或心形，叶面微披柔毛，或近秃净，深绿色，叶背有短柔毛，浅绿色，主脉自基部五出，各达大裂片尖端，并从主脉分出侧脉，直达小裂片尖端，主侧脉均隆起明显，细脉网状，叶柄长约1—2寸。春夏于叶腋抽出聚伞花序，有花5—10朵，花序柄长0.5—1.5寸，花瓣5—7瓣，白色，瓣形，雄蕊5—6枚，花药黄色，花丝白色，雌蕊白色，子房上位。夏秋结果，椭圆形，成熟时紫色。



八角枫

采制时间及方法：四时可采其根皮切片晒干。

性味：辛温无毒。

功效：散瘀止痛。治跌打骨断，暗伤瘀积痛；外洗虚寒浮肿；跌打接骨即用鲜叶。

用量：5—10公分。

禁忌：孕妇忌。

203. 刀 豆

科属：蝶形科

产地：市郊区家种

形态：为缠绕或半直立草本。主根通常横走地面，亦有垂直地面者；支根颇多，褐色，均粗壮。茎长约1.5—3.4丈，全体无毛。叶为羽状三小叶，卵形或椭圆形，基部宽楔形，顶端短尖，叶脉网状，边缘微呈波状，具长柄。花期夏季，紫色，腋生，总状花序，下垂，花柄短，花萼二，唇形，上唇比下唇长，下唇具三短齿，旗瓣反卷，翼瓣狭而分离，龙骨瓣弯，花柱亦弯，柱头小，雄蕊十枚，分成二体。果为荚果，形如尖刀，故名，内藏种子10颗左右。

采制时间及方法：深秋采集其果壳，晒干供药用。

功效：根茎消炎行血通经，治风湿性腰膝痛，经闭，久痢，牙痛，外用治杨梅疮，仁，止呃逆。

用量：内服6—18公分，外用适量。

禁忌：根，孕妇忌



刀 豆

204. 九龙藤 (龙须藤、乌须、燕子尾)

科属: 桑木科

产地: 市郊区山谷及石山中。


形态: 为常绿木质藤本植物, 高5—40尺。根木质, 外面黑褐色。茎攀援, 圆柱形, 老干坚韧有弹性, 黄褐色, 横断面有梅花纹, 幼枝浅黄色, 被锈黄色皮孔。叶单一互生, 卵圆形或心脏形, 半革质, 前端二裂如燕尾, 基部圆形或微心脏形, 边全缘, 叶面深绿色, 秃净, 叶背绿色, 被黄色短茸毛, 长约2—3寸, 宽约1.5—2寸, 基出脉5—7条, 隆起, 叶柄长约1—1.5寸, 两端膨大, 有时具卷鬚。花期夏秋, 顶生或腋生, 排列成总状花序, 长约3—5寸, 花40—80朵, 萼筒5裂, 三角状, 开时向后反, 绿绿色, 花瓣5枚, 白色, 瓣形, 长约1分, 宽约半分, 离生, 雄蕊10枚, 花药椭圆形, 雌蕊被短茸毛, 子房上位。果为蒴果, 表面被网状纹, 长约2寸余, 宽约6—10分。种子黑色, 扁圆形。

采制时间及方法: 随时可以采其茎, 切片晒干备用。

性味: 苦辛平无毒。

功效: 祛风去痹止痛, 治风湿骨痛, 跌打接骨, 叶煎洗患膜。

用量: 6—15公分。



九龙藤

205. 九层楼 (野薄荷、山薄荷)

科属: 唇形科

产地: 市郊区山野间。

形态: 为多年生常绿草本。茎直立,近四方形,高约1.5—3尺,密被灰色短柔毛,有香气,形似薄荷,故有野薄荷之名。叶革一对生,卵形或卵状矩圆形,长约寸余,宽约6—7分,先端钝或短尖,基部浑圆或楔形,边缘有锯齿,两面均有灰色短柔毛;叶面绿色,叶背淡绿色,叶柄长约二分余,主侧脉于叶背作线状隆起,侧脉7—8对。花期夏秋,节节腋上有轮生的聚伞花序,由上至下约有5—9层,故又有九层楼之名。花梗短,花萼钟状,淡绿色,上部5浅裂,下部联合,花冠唇形,白色,雄蕊4枚,花丝白色,伸出冠外,花药蓝色。果为小坚果,生于萼的基部,种子黑色。

采制时间及方法: 秋季采其全株,晒干切短备用。

性味: 辛温,无毒。

功效: 有发汗及祛风湿作用,内服治伤风感冒,痞积,煎水外洗治风湿骨痛及皮肤痒疹。

用量: 4—6公分,外用不拘。



九层楼

206. 土通草 (假通草、夜关门、水通柳)

科属: 蝶形科

产地: 市郊区溪边塘边荒坡潮湿地方。

形态: 为一年生亚灌木状草本。主根直伸, 圆锥形, 外皮淡褐色, 内面白色, 倒根须状。茎直立, 扁形, 中空质轻松或白柔。高约3—5尺, 近根部份木质化, 茎皮灰绿色, 分枝颇多, 中空。叶为互生的偶数羽状复叶, 叶轴长约2—3寸; 有对生紧接排列的小叶20—30对, 线状椭圆形, 长约2分, 宽约一分余, 两端皆钝, 边全缘, 主脉明显, 侧脉不现, 叶面绿色, 叶背淡绿色, 小叶柄很短, 托叶披针形, 长约一分余。花期夏季, 总状花序, 腋生, 一梗有花1—4朵, 有总苞, 具小齿, 苞片一枚; 花萼五裂, 花冠蝶形, 淡黄色, 雄蕊的花丝合生成一鞘状分裂为2束; 子房上位, 花柱钝形。果为荚果, 扁平稍弯曲, 长约寸余, 宽约1.5分, 上缝直, 下缝有齿缺, 有荚节4—7个, 每节有种一枚。

采收时间及方法: 秋季采其根, 剥去外皮, 切短晒干备用。

性味: 淡平无毒。

功效: 有清心降热及通利小便之功, 治肺热咳嗽及小儿疳积及外洗疳积。

用量: 4—10公分。

禁忌: 孕妇忌。



土通草

207. 土党参 (土参, 土人参)

科属: 桔梗科。

产地: 市郊区石山地带或坨山杂木丛中。

形态: 为多年生草本植物。地下根，圆锥形，侧根甚少，形似人样。茎有节，细弱，匍匐地下或缠绕杂物，不具攀缘器官，节间有隆起棱，表面密披短绒毛，茎长达1.2—2.5丈。叶对生，心形，膜质，叶宽1.2—2寸，叶长1.4—2.4寸，主脉自基部直达先端，侧脉网状，叶面青绿色，叶背青浅绿色，边缘具粗锯齿。花腋生，黄紫色，钟状下垂，萼五片，披针形，冠管五裂，呈三角形，雄蕊五枚，柱头呈喇叭状，果为蒴果，种子黄白色。

采制时间及方法: 秋后采其地下根洗净，蒸晒后供药用。

性味: 甘平无毒。

功效: 补气健脾生津液，有强健身体之功。

用量: 6—20公分。

附注: 可代党参用。



土党参

208. 土防风

科属：伞形科

产地：市郊区半石半土山中。

形态：为根宿存，草一年枯死的草本植物。根圆形，稍卷曲，表皮淡黄褐色，内面

黄色。茎直立，圆柱形，高约1—1.6尺，表皮青绿色，有细纵纹，内面白色，实心。叶根生者为簇生，茎生叶为互生，或同生于一侧，均为两回羽状复叶，与水芹菜的叶有些相似，小叶片的边缘有不规则的缺刻和锯齿，叶面青绿色，并密布凹陷花紋样的网状脉，叶背淡绿色，并有凸起的主侧脉和细脉。叶柄基部扩大抱茎，小叶柄自上至下逐渐增长。秋季叶丛中抽出顶端分枝的茎，枝稍着生复伞形花序，花萼杯状，绿色，花瓣四枚白色。果为小胞果，圆形。



土防风

采制时间及方法：秋季采其根，晒干切片备用。

性味：微辛温无毒。

功效：有驱风发汗作用，治伤风感冒、头痛及风湿痛。

用量：6—8公分。

209. 土草薺 (細金剛)

科屬：蓼科

產地：市郊区山野間，疏灌林或草叢中。


形態：多年生草質藤本。根為結節伏臥莖，橫走深入土中，並有多數側根，外皮灰褐色，硬堅或有粗隆突刺。莖圓柱狀，綠色，光滑無毛，長5—10余尺，分枝頗多，節上常有卷須攀援他物而上升，節的下部有鱗片退化小葉片附著。葉：單一互生，長橢圓形，短圓狀橢圓形，革質，長2—2.5寸，寬1.5—2寸，柄長3—4分，全綠，先端漸尖，基部圓形，葉面深綠色，光澤無毛，葉背淺綠色，主脈掌狀，5—7條，自基部達尖端，常3條最顯明，細脈網狀。春夏于葉腋開傘形花序，雌雄異株，雄花萼3枚，綠色，卵形，花瓣3枚，與萼等長，黃綠色，或稍紫色，雄蕊6枚，花藥黃色，雌花形态色澤與雄花相同，有退化雄花絲，柱頭3裂。秋冬結球形漿果，熟時紅色。

採制時間及方法：四季採挖塊根洗淨，去蘗根，切片备用。

性味：平淡無毒。

功效：有利尿去濕作用，治淋濁水腫；風濕瘡毒等症。

用量：10—15公分。



土草薺

210. 土山藥 (山藥、薯蕷)

科屬：薯蕷科

產地：市郊区山野間。

形態：為多年生蔓性草本。地下莖肥厚，圓柱形，長達1—3尺，多直向地下着生，表皮淡褐黃色，並有多數須狀根，內白色。莖蔓生，常纏繞他物上升，青色。葉互生，長約1—2.5寸，嫩葉披針形，老葉箭形，先端急尖，基部心形，長約2—3寸，寬約1—2.5寸，全緣，葉脈自基部出，5—7條，細脈網狀。花期夏季，自葉腋間着生白色小花，呈穗狀花序，雌雄異株。

採制時間及方法：四季均可掘取，冬月掘取為佳，擇其年久肥大者，去泥沙晒乾，依法泡制。

性味：甘平無毒。

功效：健脾去濕，生津液，瀉精止帶，理瀉治病，虛勞羸瘦。

用量：10—20公分。



土山藥

211. 土桔梗

科属：桔梗科

产地：市郊区山野丘陵丛中湿润肥沃、阳光充足土地。

形态：为多年生宿根草本，高1—2尺。地下根基肥厚，肉质状圆锥形，长约1.5—

4寸，直径3—5分，表皮淡黄色，内白色，侧根很少，如人参状，支根须状，均圆柱形，表面淡黄色，地上茎，一年枯死，冬末春初于宿根抽生圆柱形茎，微被柔毛，后则脱落，老茎多变为方形，茎的中部，有时分枝三出。单叶轮生，偶有互生，短柄几无柄，近基部的为卵圆形，椭圆形，中部以上，多披针形，长0.8—1.6寸，宽4—8分，纸质至亚革质，先端渐尖或钝，边缘有锯齿，基部广披针形，叶面深绿色，叶背浅绿色，主脉自基部直达先端，两侧脉6—8对，细脉网状，均为显明，全叶微披柔毛。秋季于枝端抽单朵或2—3朵的总状花序，花柄长7—9分，萼管状与子房合生，绿色，宿存，花冠合瓣，钟形，端5裂，蓝色，雄蕊5枚，花丝片状，花药黄色，花丝长，雌蕊棕色。冬结蒴果。



土桔梗

采制时间及方法：夏秋采地下基洗净晒干或生用。

性味：甘平无毒。

功效：顺气化痰，生津止渴，治喉痛咳嗽。

用量：2.5—5公分

禁忌：寒咳禁用