

幼科準繩 五之二

痘疹中

落痂

發熱

渴

煩躁

譫妄

驚搐

中風

自汗

失血

不能食

落痂證治

癩赤黑萬瘡痂落後其面癩或赤或黑者用四白滅
癩散臨睡以清蜜水調搽面上至曉以水滌去之自
然白瑩脫去更宜愛護不得早見風日經年不滅如
瘡癩突起成凸者此熱毒未盡解毒防風湯主之形見
發熱外更用蜆子內水摩之如陷下成凹者此脾胃虛
不能長肌肉也人參白朮散痘渴加黃耆主之
四白滅癩散

白芷

白附子

白僵蠶

鷹矢白

蜜陀僧

各等分

共研極細末以水調搽面黥神効

韶粉散 治痘瘡纔愈毒氣未盡瘡痂雖落其瘢猶

黯或凸凹肉起當用此藥塗之

韶粉

壹兩

輕粉

壹錢

右研細末豬骨髓熬熟調成膏薄塗瘡瘢上如痘
疹欲落當滅瘢痕一名滅瘢散

瘢黑暗凡瘡瘢頭面渾身竝黑暗者未可便說無事
猶恐日前未甚作膿收靨太急此倒靨歸腎也但察
其表裏如壯熱大渴未除煩悶昏睡少食或大便不
通或自利此真倒靨歸腎也若身溫煖爽快食漸加

大小便調者此瘡癰本色無慮也

痂不脫萬痘瘡收後其痂自脫者佳不脫以百花膏潤之令其速脫稍遲則乾硬深入肌肉經久方脫遂成癰痕然久而不脫者脾胃虛也人參白朮散加黃耆官桂主之不可擣搗剥去若不禁手反傷皮膚復灌作瘡番覆潰爛一時難愈其後多成疥癩也黃痘瘡黏著皮肉不肯脫落此表虛也尤當禁忌以防異變用調元固表湯主之

調元固表湯

黃耆

人參

當歸

甘草

蟬退

人參固肌湯

治痘表發太過致肌肉不密痘痂粘

肉久不落者

人參

黃耆

甘草

當歸

蟬蛻

各等分

糯米

壹撮

右用水煎服

人參清神湯

治痘痂不落昏迷沉睡者

人參

黃耆

甘草

當歸

白朮

土炒

麥門冬

陳皮

酸棗仁

黃連

酒炒

茯苓

右各等分加棗子糯米水煎服

馬齒莧散

治痘痂不落成癰痕者

馬齒莧

搗汁

豬脂膏

石蜜

三味共熬成膏塗腫處

凡瘡痂日久當脫不脫者胸背手足無妨惟面上不脫必成癰陷未脫者以百花膏潤之

收靨

令其易脫

脫盡之後癰痕黑黯者以四白滅癰散塗之

羊髓骨髓

治痘痂欲落不落癰痕

羊髓骨髓壹兩煉入輕粉壹錢研成膏塗之

如收靨既遲瘡痂不落昏昏喜睡者此邪氣已退正氣未復脾胃虛弱宜調元湯即參耆飲見大法加麥門冬合安神丸痘煩躁或只用酸棗仁湯煩躁緩緩調理待氣血平復榮衛和暢而安矣

癰腫成膿痘瘡收靨之後痂皮盡脫曾見癰痕凸起復作膿窠依舊結一層痂子者或因收靨太驟毒氣未盡或因誤服溫補之藥多啖肥甘之物飲酒喜食煎炒辛熱或因出風太早榮衛鬱而不通皆能復成此證亦與前日一般但無苦耳若此者毒邪外散決無留毒之患 痘瘡遍身潰爛不結痂者倒靨也或

三五處腫灌潰爛不結痂者疳蝕瘡也若已正靨痂
起自脫或面上或手足或片結硬瘡頭雖焦中畜膿
漿者此是原出瘡子之初其處太密糊塗成片無復
顆粒所以毒壅於裏不能起發作膿結痂也但用滅
癰救苦散收靨和百花膏收靨塗之待膿盡痂起自
愈或手足腕膝之間瘡窠連串作大一塊膿化作水
停蓄於中恰如囊袋皮不破水不去日久只如是者
此裏面肌肉已好原曰瘡皮剩於外也宜用鍼決去
其水自乾脫矣

能食不能食瘡痂既落中氣羸虛多不能食必藉

人參白朮散去葛根加陳皮木香以調養之其間或有瘡痂起而能食者是胃中宿有蘊熱故也蓋胃熱則消穀所以能食其人必大便秘或大便秘當用三黃丸利之否則恐胃熱不去鬱爲口臭齒腐生風之證流散四肢則發爲癰疽腫毒然有一等脾胃素壯實者平素能食大便亦不至有秘結之患此又不可一概論也

癰痕赤白痘痕赤白各有所因治法亦異凡痕赤而作癢血虛而有熱也用四味牡丹皮赤而作痛餘熱也用四君連翹金銀花若發熱而大便調和者脾胃

虛熱也用五味異功散若發熱而大便秘結者腸胃
內熱也用聖濟犀角地黄湯若母有肝火用加味逍
遙散若母有鬱怒用加味歸脾湯佐以加味逍遙散
治之 白者 屬氣虛而血衰也宜固元氣爲本癢
而作渴者氣血俱虛也十全大補湯之類乳食減少
四肢倦怠者中氣虛也五味異功散之類氣虛發熱
者補中益氣湯之類血虛發熱者當歸補血湯之類
須參兼變之證治之此證若服藥而漸紅活者可治
色不轉者不治雖經年後多患瀉利而死若妄投攻
伐禍在反掌 一小兒痘瘡如期而愈痕赤如赭余

謂此乳母有熱也診之果有肝脾鬱火先用加味道遙散四劑與母服之子各飲少許而竝愈 一小兒痘痕色赤作痛熱渴喜冷大便不利先用前胡枳殼散便利渴止再用聖濟犀角地黄湯而安又用芹菜汁而靨 一小兒十六歲痘痕白用獨參湯數斤色漸如舊又用地黃丸大補湯而安

禁忌痘瘡新差之後氣血未復視之未靨尤加調護可也蓋痂皮起落肌肉新嫩不宜澡洗增減衣服則表已虛寒暑之氣易襲也瘡毒內作臟腑俱傷毒雖外散腸胃已弱不宜飲冷傷飢過飽則裏氣虛飲食

之物易傷也時俗不知此理謂之已痊再無他變怠玩縱弛致生後災一旦病生悔之晚矣

檇机痘袁按孫氏揭檇机痘以垂世而不註解其詳迨黃石峯盡註明白且痘澄膿結痂自頭抵足靨已脫矣又身發火熱舊靨盆處重出一番痘竦囊聚膿痛愈加甚服藥調護庶免天亡倘飲食不節風寒不避邪氣感迫囊破潰爛肚腹漸脹陰陽不分死在旦夕矣若起於頭面者須防陋井湧泉

陋井腮頰穿陋湧泉眼沿陋

之患起於背腹者應慮蜂螫沉石之慮

蜂螫遍身刺痛也沉石皮

內四

爛也起於手足者不免有罄筆之懼起於陽球者預

宜防脫囊之害玉函云天花結果慶奇全檣杙歸門
痘倒顛不是渠塘沓洶浪便教關節結癰纏爲父母
者庶幾慎之

發熱

瘡疹發熱與傷寒相似但傷寒只見一經形證若瘡疹則面燥腮赤呵欠頓悶乍涼乍熱多睡咳嗽噴嚏驚悸吐利手足稍冷骭涼耳涼也然發熱者瘡疹常候也不可盡除之但熱微毒亦微熱甚毒亦甚

初

初發熱時精神清爽唇鼻滋潤更無他證者此熱在表其瘡必疎不須施治 初發熱時渾身壯熱熛熛

然不渴清便自調此邪在表拂鬱於皮膚之間宜以輕揚之劑發之升麻葛根湯主之 初熱甚則羌活湯

主之

本條

初發熱時其熱烙手目赤鼻乾唇燥小便

言

發熱

方科五

五十四

石經堂

赤大便秘煩悶不安此表裏俱熱毒氣壅遏宜發表

攻裏雙解散主之

初熱

初發熱時表不大熱其人煩

躁不安此熱在裏也以三黃丸微利之

本條

初發熱

時或乘疫癘之氣人參敗毒散主之

初熱

初發熱時

或爲風寒所襲出不快者桂枝葛根湯羌活湯雙解

散去大黃主之

三方俱見初熱

申

痘瘡之證其初不免於發熱者未出毒邪在裏煎熬

氣血薰蒸臟腑而然瘡既現形則毒洩而熱解所以

瘡出熱退者瘡本必疎若瘡已出熱不少減此毒蘊

於中其勢方張其瘡必密宜急解其毒連翹升麻湯

見形加防風荆芥穗地骨皮或解毒防風湯大法加

升麻或東垣鼠粘子湯見形兼服代天宣化丸預防

服藥之後瘡或不出或再出其熱頓減者爲氣和也

熱若不減瘡漸加多再消詳大小便何如大便不通

七物升麻丸初熱小便不利連翹湯小便不利小大便俱

不通八正散小便不利自利者黃芩湯自利加白頭翁酒

黃連調赤石脂末裏氣和毒解矣如更加渴煩躁不

已或譫妄或腹脹滿氣促或自利不止手足厥冷此

逆證勿治如瘡已出但微發熱不須治之蓋瘡疹

屬火非熱不能成就也以上見形而熱

錢氏云有大熱則當利小便小熱當解毒大熱謂身熱脉實大小便秘津液燥而渴懼其變生他疾故利小便八正散通關散大便潤者連翹湯三方俱見導

赤散心加人參麥門冬使心火有所導引則雖不用

冷藥熱亦自減去矣瘡痘不至熱過不爲冷誤甚爲

良法小熱解毒之說謂小熱不解大熱必生利其小

便則慮損氣故但可解毒而已甘桔湯咽喉加牛蒡

子荆芥穗以上起發而熱

如瘡漿膿已成毒氣已盡又復發熱者俗呼爲乾漿

不須施治