

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷四十一



欽定四庫全書

證治準繩卷四十一

傷寒

太陽病

發熱

惡寒

惡風

頭痛

強項

身體痛

經曰太陽之為病頭項強痛而惡風寒不傳經者固

有之然而傳者多矣如經言傷寒一日太陽受之脉若

靜者為不傳頗欲吐及煩燥脉數急者為傳也又曰傷寒二三日陽明少陽證不見者為不傳也太陽經治法有汗吐下溫和解調併刺俱有之蓋太陽所感非一傳變多端故也雖發汗解肌一法證有輕重脉有浮沈用藥必宜隨脉證用之庶造仲景之深意如發熱惡寒脉浮緊麻黃湯自汗惡風脉浮緩桂枝湯此脉證相應之定法也又如項背強几几反汗出惡風桂枝加葛根脉微而惡寒桂枝麻黃各半湯發熱惡寒熱多寒少脉微

弱者桂枝二越婢一湯脉浮緊自汗出小便數心煩微
惡寒脚攣急桂枝加附子湯又如汗後復宜汗者發汗
遂漏不止惡風小便難四肢微急難以屈伸桂枝加附
子湯服桂枝大汗出脉洪大者與桂枝如前法若如瘡
狀日再發宜桂枝二麻黃一湯仲景汗劑二十七湯所
治五十九證大宜精別如何而用青龍湯如何而用五
苓散如何而用茯苓甘草湯之類蓋病有輕重治有急
緩故也清碧杜先生曰傷寒陽熱之證傳經之邪變態

不一辨之不精則汗吐下三法之治一差死生反掌矣
非比陰寒之邪中在一經不復傳變易於治也不過隨
寒邪輕重用溫藥治之一定之法耳今之庸工好用熱
劑而不知涼藥之妙且難也

汗

桂枝湯

桂枝加葛根湯

桂枝加厚朴杏子湯

桂枝加附子湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍

藥加附子湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二越婢

一湯 桂枝二麻黃一湯 桂枝去桂加茯苓白

朮湯 葛根湯 葛根加半夏湯 葛根黃連黃

芩湯 麻黃湯 大青龍湯 小青龍湯 桂枝

加芍藥人參新加湯 麻黃杏仁甘草石膏湯

五苓散 桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝加桂湯 桂枝甘草龍骨牡蠣湯 桂枝

附子湯 茯苓甘草湯 文蛤散 去桂加白朮

湯 甘草附子湯

吐

梔子豉湯 梔子甘草豉湯 梔子生薑豉湯

梔子厚朴湯 梔子乾薑湯 瓜蒂散

下

調胃承氣湯 大柴胡湯 承氣湯 柴胡加芒

硝湯 桃仁承氣湯 抵當丸 大陷胃湯 抵

當湯 大陷胃丸 白散十棗湯 大黃黃連瀉

心湯 附子瀉心湯

溫

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

四逆湯

乾薑附

子湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

厚朴生薑甘草

半夏人參湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘

草附子湯

茯苓四逆湯

桂枝甘草湯

真武

湯

小建中湯

炙甘草湯

和解

小柴胡湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

小陷胸湯

柴胡桂枝乾薑湯 半夏瀉心湯 生薑瀉心湯

甘草瀉心湯 柴胡桂枝湯 桂枝人參湯

白虎湯 白虎加人參湯 黃芩湯 黃芩加半

夏生薑湯

調

赤石脂禹餘糧湯 旅復代赭石湯 黃連湯

刺

縱橫刺期門 服桂枝刺風池風府 太少併病

刺期門 熱入血室刺期門 太少併病刺大根

肺俞 太陽之為病脉浮頭項强痛而惡寒成經曰尺

寸俱浮者太陽受病太陽主表為諸陽主氣脉浮頭項强痛而惡寒者太陽表病也。但有一毫頭

痛即為在表 太陽病發熱汗出惡風脉緩者名為中

風 太陽病上條所揭云云者是也後皆倣此。成風陽也寒陰也風則傷衛發熱汗出惡風者衛

中風也榮病則發熱無汗不惡風而惡寒衛病則發熱汗出不惡寒而惡風以衛為陽衛外者也病

則不能衛固其外而皮腠疎故汗出而惡風也傷寒脉緊傷風脉緩者寒性勁急而風性解緩故也

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲

救邪風者宜桂枝湯

成太陽中風風併於衛則衛實而榮虛榮者陰也衛者陽

也發熱汗出陰弱陽強也內經曰陰虛者陽必湊之故少氣時熱而汗出與桂枝湯解散風邪調和

榮衛

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱

者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾

嘔者桂枝湯主之

成陽以候衛陰以候榮陽脉浮者衛中風也陰脉弱者榮氣弱

也風并於衛則衛實而榮虛故發熱汗自出也經曰太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強者是也嗇嗇者不足也惡寒之貌也淅淅者灑淅也惡風之貌也衛虛則惡風榮虛則惡寒榮弱衛強惡寒復

惡風者以自汗出則皮膚緩理疎是亦惡風也翕
翕者煖煖然而熱也若合羽所復言熱在表也鼻
鳴乾嘔者風擁而氣道也與桂枝湯和榮衛而散風邪也

病人藏無他病時

發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發

汗則愈宜桂枝湯主之

時發熱自汗出謂有時而發熱自汗出有時而止惟

其時作時止故病留連而不愈也當其發熱自汗
之時不可與藥當先其時作候其時止而後與之
故曰先其時也素問曰當其盛而必毀因其衰也
事必大昌其是之謂歟

桂枝湯方

桂枝

三兩
去皮

芍藥

三兩

甘草

二兩
炙

生薑

三兩
切

大棗

十二
枚擘

右五味㕮咀以水柒升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須臾歠熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許偏身熱熱微似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麵五

辛酒酪鼻惡等物

小促宋板作少從容

成經云桂枝本為解肌若脉浮緊發熱汗不出者不可與之常須識此勿令誤也蓋桂枝湯本專主太陽中風必也皮膚疎湊又自汗風邪干於衛氣者乃可投之也仲景以解肌為輕以發汗為重故發汗吐下後身疼不休者津液內耗也雖有表邪而止可解肌故須桂枝湯少和之也桂味辛熱用之為君桂猶圭也宣導諸藥為之先聘是謂辛甘發散為陽之意蓋

發散風邪必以辛為主內經所謂風淫所勝平以辛
佐以苦以甘緩之以酸收之是以芍藥為臣而甘草
為佐也內經曰風淫於內以甘緩之以辛散之生薑
味辛溫大棗味甘溫是用以為使而此又不特專於
發散以脾主為胃行其津液薑棗之用專行脾之津
液而和榮衛者也麻黃湯不用薑棗者謂專於發汗
不待行化而津液得通矣

龐凡桂枝湯病證者常自汗出小便不數手足溫和

或手足指稍露之則微冷覆之則溫渾身熱微煩而
又憎寒始可行之若病者無汗小便數或手足逆身
冷不惡寒反惡熱或飲酒後慎不可行桂枝湯也脉
緊必無汗設有汗不可誤作桂枝證

許有人病發熱惡寒自汗脉微弱而浮三服湯而愈
此方在仲景一百十三方內獨冠其首今人全不用
何也仲景云太陽中風陽浮而陰弱陽浮者云云至
翕翕發熱宜桂枝湯此脉與證仲景說得甚明後人

看不透所以不敢用也 假令寸口脉微名曰陽不足陰氣上入陽中則灑淅惡寒也尺脉弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發汗也此謂元氣受病而然也又曰陽微則惡寒陰微則發熱醫既汗之使陽氣微又大下之令陰氣弱此謂醫所使也大抵陰不足陽往從之故內陷而發熱陽不足陰往乘之故陰上入陽中則惡寒舉此二端明白易曉何憚而不用桂枝湯哉