

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷十五



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

薛氏醫學

明 薛己 撰

此陰中之陰其道遠其
亦罕到中年後尤慮此
固根本為主若瘡硬

作痛者形氣虛而邪氣實也用托裏消毒散主之微瘰
微痛者形氣病氣俱虛也用托裏散補之欲作膿用托
裏羌活湯若痛甚用仙方活命飲大勢既退亦用托裏
消毒散若脾虛不能消散或不潰不斂者六君子加芎
歸黃芪若陰虛不能消散或作渴便淋者六味丸加五
味子若陽虛不能潰或膿清不能斂者用補中益氣湯
氣血俱虛者十全大補湯若瘰硬未成膿者用隔蒜灸
活命飲潰後豆豉餅補中益氣十全大補二湯若灸後

大勢已退餘毒未消頻用葱熨以補其氣以消餘毒為善

治驗

巡撫陳和峯脾胃不健常服消導之劑左腿股及臀患
瘰余曰此脾氣虛而下注非瘡毒也當用補中益氣倍
加白朮彼惑於衆論云白朮能潰膿乃專以散毒消毒
為主而瘰益甚體益倦余用白朮一味煎飲而消

儒者楊啟元左臀患此敷貼涼藥腫徹內股服連翹消
毒散左體皆痛余以為足三陰虧損用補中益氣湯以

補脾肺用六味丸加五味以補肝腎股內消而臀間潰
又用十全大補湯而瘡口斂

一儒者瘡焮痛甚此邪毒壅滯用活命飲隔蒜灸而消
後因飲食勞倦瘡痛仍作寒熱頭疼此元氣虛而未能
復也與補中益氣湯頻用葱熨法兩月而愈

一男子漫瘡而色不變脉滑數而無力膿將成矣余用
托裏而欲針彼畏針而欲內消誤用攻伐之藥頓加惡
寒發熱自汗等症余用十全大補湯數劑瘡起色赤仍

外針內補而愈

崑庠吳輔之父患此內潰癰脹發熱口乾飲食少思此脾胃虛弱也先用六君加芎歸芪數劑而潰又用十全大補湯倍加參芪五十餘劑而愈

南濠沈克章子年三十脉如屋漏雀啄腫硬七天膿水清稀誤服敗毒之藥余曰此足三陰虧損而藥復傷也余用六君加歸芪附子一錢二劑癰潰色赤又減附子五分数劑元氣復而瘡愈

一男子硬痛發熱此膀胱氣虛而濕熱壅滯用內托羌活湯二劑熱痛悉退後用托裏消毒散而潰又用托裏散四十餘劑而斂

平湖袁上舍患痔外敷寒涼內服消毒攻潰於臀膿水清稀脉洪大而數寒熱作渴余辭不治後果歿此足三陰虧損之症失滋化源以致真氣益虛邪氣愈甚矣不死何俟

囊癰 謂陰囊患癰

囊癰屬肝腎二經陰虛濕熱下注若小便瀉滯者先分利以泄其毒繼補陰以令其自消若濕熱退而仍癰痛宜補陰托裏以速其膿膿炊而便穢者熱毒壅閉也先用托裏消毒散後用針以泄之膿去即解若膿去而癰痛不減者熱毒未解也用清肝養榮湯口乾而小便數者腎經虛熱也六味丸內熱晡熱者肝經血虛也四物加參朮體倦食少者脾氣虛熱也補中益氣湯膿水清稀者氣血俱虛也十全大補湯此症雖大潰而罨丸懸

露治得其法旬日肉漸生而愈若專攻其瘡陰道始虛則瘡者不能潰潰者不能斂少壯者多成涸疾老弱者多致不起亦有患痔漏久而串及於囊者當無治其痔切忌寒藥尅伐虧損胃氣

治驗

給事陸貞山瘡赤脹痛小便瀉滯寒熱作渴此肝腎陰虛濕熱下注也當清肝火除濕毒遂用柴胡炒龍膽吳茱萸炒黃連當歸銀花皂角刺赤芍藥防風木通甘草

節一劑癰痛漸退少加防風木通川芎茯苓作飲下滋
腎丸以補陰其熱癰俱退但內有一條筋不消此肝經
血氣虛損也當滋腎水用六味丸料去茯苓加五味二
劑再用補中益氣加茯苓作飲送滋腎丸筋頓消而愈
京兆朱二峯陰囊脹痛彼以為疝余診其脉數而滑此
囊癰也因肝腎二經陰虛濕熱所致膿已成矣服活命
飲一劑而潰更用補陰托裏而斂

知州王汝道先晡熱發熱肢體倦怠入房則腿足酸軟

足心熱至腿膝六脉洪數兩尺為甚余以足三陰虛欲滋補化源彼反服苦寒降火之劑後陰囊腫脹用治疝之藥腫脹益甚形氣愈虛服溫補之劑腫痛上攻小便不利兩尺脉洪滑按之虛甚余曰此囊癰也因氣血虛而不能潰先用補中益氣湯加山藥山茱萸車前子柴胡山梔一劑腫脹頓消隨用六味丸料加車前牛膝柴胡山梔一劑小便漸通乃用活命飲與前二藥消息兼用至二十餘劑囊裂出穢膿甚多乃用托裏消毒散六

劑膿穢清又用托裏散數劑膿水漸少更用補陰托裏散及十全大補五十餘劑而痊

儒者陳時用考試不利一夕飲燒酒入房妻不納翌日陰囊腫脹焮痛遣人求治余以除濕熱清肝火之劑城門夜閉不及歸服翌早報云夜來陰囊悉腐玉莖下面貼囊者亦腐此肝火挾酒毒而濕熱熾盛也仍以前藥加參芪歸朮四劑腐肉盡脫羖丸懸掛用大補氣血并塗當歸膏囊莖全復而愈

一膏粱之客陰囊腫脹小便不利此中焦積熱乘虛下
注先用龍膽瀉肝湯加黃柏知母黃連牛膝四劑漸愈
後用補陰八珍湯加柴胡山梔而愈後不守禁忌前症
復作仍用補陰八珍湯補中益氣湯六味丸而痊又因
勞發熱自用四物黃柏知母之類虛症悉具瘡口開大
余謂五臟氣血俱虛也朝用補中益氣夕用六君子加
當歸各五十餘劑瘡口漸斂又用六味丸調補全愈
府庠李達卿素腎虛發熱久服黃柏知母之類形體漸

瘦遺精白濁晡熱唾痰余曰此腎水虧損虛火內熾用
補中益氣之類加五味麥門前症將愈又別用清熱涼
血之劑飲食少思唾痰不止余以為脾肺復虛不能攝
涎歸源仍用前湯加茯苓半夏而愈後入房頭暈吐痰
腰骨作痛大小便道牽痛余曰此精已耗而復竭所致
危殆之症也遂朝用前湯加麥門五味夕用六味九料
加五味子萆薢五十餘劑諸症頓退後又入房陰囊陰
莖作痛別用淡滲之劑陰囊內潰余用補陰托裏之劑

出膿甚多喜癰消痛止竟不善調養以致大便不通小便如淋痰涎上湧余曰腎虛之症復作矣誠為可慮有保其可生者用礞石滾痰丸牛黃清心丸之類吐痰愈加余曰非惟無以保其生而反促其危矣固辭不治後果歿

一男子醉而入房陰囊腫脹大如斗小腹脹悶小水淋赤發熱口乾痰涎壅甚此膀胱陰虛酒毒所乘也用六味丸料加車前牛膝作飲下滋腎丸諸症頓退再加五

味麥門二劑而愈却以補中益氣加麥門五味調理而康若用淡滲復損真陰決致不起

懸癰

懸癰謂瘡生於玉莖之後穀道之前屬足三陰虧損之症輕則為漏瀝盡氣血而亡重則內潰而即殞若初起濕熱壅滯未成膿而作痛或小便瀦滯用龍膽瀉肝湯腫焮痛甚仙方活命飲並以製甘草佐之如此雖患亦輕雖潰亦淺若不能成膿或膿成不潰者八珍散補之